Analysis I/II/III
Wintersemester 1993/94
Sommersemester 1994
Wintersemester 1994/1995

nach der Vorlesung von
Prof. Dr. N. Steinmetz
Universität Dortmund
Lehrstuhl Mathematik IX

14. Februar 2006

In $\text{\LaTeX}$ gesetzt von
Thomas Leineweber

Zusammenfassung

Dieses Skript ist aus meinen persönlichen Mitschriften in den Vorlesungen ANALYSIS I bis ANALYSIS III vom Wintersemester 1993/94 bis zum Wintersemester 1994/95 bei Prof. Steinmetz entstanden. Ich habe mir große Mühe gegeben, alles richtig wiederzugeben. Dennoch gebe ich keine Garantie, daß dieses alle Sachverhalte richtig wiedergibt. Ebenfalls übernehme ich keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Benutzung dieses Skriptes entstanden sind oder entstehen werden (Klausur und Prüfungen!).

Für einen freundlichen Hinweis über Fehler oder Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit dankbar. Dabei sollte jedesmal die Version des entsprechenden Kapitels mit angegeben werden, die jeweils in einer Fußnote auf der ersten Seite aller Kapitel steht.

Dieses Skript darf nur umsonst bzw. zum Selbstkostenpreis weitergegeben werden. Es ist weder eine offizielle noch eine autorisierte Version von Prof. Steinmetz. Deshalb ist bei Fehlern zuerst davon auszugehen, daß sie von mir stammen. Die jeweils aktuelle Version ist unter <http://analysis.tleine.de/> zu finden.

Thomas Leineweber
e-mail: analysis@tleine.de

©1994–1999, 2002, 2004–2006 für diese Version bei Thomas Leineweber. Die Vorlesung selber stammt von Prof. Steinmetz.

Datum dieser Gesamtversion: 14. Februar 2006

Inhaltsverzeichnis

0	Mathematische Notationen	1
0.1	Mengen	1
0.1.1	Naive Mengendefinition	1
0.1.2	Mengenschreibweisen	1
0.1.3	Mengenrelationen	1
0.1.4	Mengenoperationen	1
0.2	Abbildungen	2
0.2.1	Naive Abbildungsdefinition	2
0.2.2	Graph von f	2
0.2.3	Komposition	2
0.2.4	Definitions- und Wertebereich	3
0.2.5	Bild und Urbild	3
0.2.6	injektiv, surjektiv, bijektiv	3
0.2.7	Umkehrfunktion	3
0.3	Elementare Logik	3
1	Die reellen Zahlen	5
1.1	Der Körper $\mathbb{R}$	5
1.1.1	Definition: $\mathbb{R}$	5
1.1.2	Bemerkungen	5
1.2	Anordnung von $\mathbb{R}$	5
1.2.1	Definition	5
1.2.2	Bemerkungen	6
1.2.3	Regeln	6
1.3	Die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$	6
1.3.1	Definition	6
1.3.2	Bemerkung	6
1.3.3	Beispiel	7
1.3.4	Vollständigkeitsaxiom	7
1.3.5	Beispiel	7
1.3.6	Existenz des Infimums	7
1.3.7	Archimedische Eigenschaft	8
1.3.8	Folgerung	8
1.3.9	Satz	8
1.3.10	Satz	8
1.4	Absolutbetrag	9
1.4.1	Definition	9
1.4.2	Dreiecksungleichung	9
1.4.3	Intervalle	9
1.4.4	Bemerkung	9
1.4.5	Definition	10
1.4.6	Satz	10

1.4.7	Erweiterungsmöglichkeiten	10
1.5	Vollständige Induktion	11
1.5.1	Induktionsprinzip	11
1.5.2	Beispiel	11
1.5.3	Induktive Definition von Summe und Produkt	11
1.5.4	Binomialkoeffizienten	12
1.5.5	Pascalsches Dreieck	12
1.5.6	Binomischer Lehrsatz	12
1.5.7	Nachtrag	14
1.5.8	Bernoullische Ungleichung	14
1.6	Wurzeln	14
1.6.1	Beispiel	14
1.6.2	Satz	14
1.6.3	Fundamentaler Schluß der Analysis	15
1.6.4	Bemerkung	15
1.6.5	Nachtrag	15
1.6.6	Allgemeine Potenz	15
1.6.7	Regeln für Potenzen	16
1.6.8	Ungleichung zwischen dem arithmetischen und geometrischen Mittel (AGM)	16
1.6.9	Hilfssatz	16
1.6.10	Beispiel	17
2	Folgen und Reihen	19
2.1	Konvergente Folgen	19
2.1.1	Definition: Folge	19
2.1.2	Bemerkungen	19
2.1.3	Rechenregeln für konvergente Folgen	19
2.1.4	Beispiele	22
2.2	Monotone Folgen	22
2.2.1	Definition	22
2.2.2	Monotoniekriterium	23
2.2.3	Aufgabe	23
2.2.4	3 Beispiele	23
2.3	Teilfolgen	25
2.3.1	Definition	25
2.3.2	Beispiele	25
2.3.3	Satz von Bolzano-Weierstraß	26
2.3.4	Cauchysches Konvergenzkriterium	26
2.3.5	Definition: Limes superior, Limes inferior	27
2.3.6	Bemerkungen	27
2.3.7	Beispiel	28
2.3.8	Rechenregeln	28
2.3.9	Ergänzungen	28
2.3.10	Satz	29
2.4	Unendliche Reihen	29
2.4.1	Definition	29
2.4.2	Beispiel: Die geometrische Reihe	30
2.4.3	Beispiel: Teleskopsumme	30
2.4.4	Beispiel: erweiterte Teleskopsumme	30
2.4.5	Satz über den Reihenrest	31

2.4.6	Cauchy Kriterium	31
2.4.7	Beispiel: Die harmonische Reihe	31
2.4.8	Hilfssatz: Abelsche partielle Summation	32
2.4.9	Dirichlet-Kriterium	32
2.4.10	Leibniz-Kriterium	33
2.4.11	Die alternierende harmonische Reihe (1)	33
2.4.12	Rechenregeln für konvergente Reihen	33
2.4.13	Die alternierende harmonische Reihe (2)	33
2.5	Absolute Konvergenz	34
2.5.1	Definition	34
2.5.2	Satz	34
2.5.3	Majorantenkriterium	34
2.5.4	Wurzelkriterium	34
2.5.5	Quotientenkriterium	35
2.5.6	Beispiele	35
2.5.7	Satz	36
2.5.8	Satz	37
2.6	Mehrfachreihen	38
2.6.1	Definition	38
2.6.2	Beispiel	38
2.6.3	Folgerung	39
2.6.4	Umordnungssatz	39
2.6.5	Hilfssatz	40
2.6.6	Definition	41
2.6.7	Großer Umordnungssatz	41
2.6.8	Spezialfall: Doppelreihensatz	41
2.6.9	Beispiele	42
2.6.10	Reihenmultiplikation/Cauchyprodukt	43
2.6.11	Beispiel	44
3	Grenzwert und Stetigkeit	45
3.1	Grenzwerte bei Funktionen	45
3.1.1	Definition	45
3.1.2	Bemerkungen	45
3.1.3	Folgenkriterium	45
3.1.4	Rechenregeln	46
3.1.5	Beispiele	46
3.1.6	Einseitige Grenzwerte	47
3.1.7	Satz	47
3.1.8	Monotone Funktionen	47
3.1.9	Satz	47
3.1.10	Cauchy Kriterium	47
3.2	Stetigkeit	48
3.2.1	Definition	48
3.2.2	Rechenregeln	48
3.2.3	Beispiele	48
3.2.4	Satz vom Minimum und Maximum	49
3.2.5	Nullstellensatz	49
3.2.6	Zwischenwertsatz	49
3.2.7	Bemerkung:	49

3.2.8	Beispiele	50
3.2.9	Satz über die Umkehrfunktion	50
3.2.10	Definition: gleichmäßige Stetigkeit	50
3.2.11	Bemerkungen und Beispiele	51
3.2.12	Satz von Heine	51
3.3	Gleichmäßige Konvergenz	52
3.3.1	Def.: Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen	52
3.3.2	Beispiele	52
3.3.3	Satz	53
3.3.4	Satz	53
3.3.5	Cauchy Kriterium	53
3.3.6	Majorantenkriterium	54
3.3.7	Beispiele	54
3.4	Potenzreihen	55
3.4.1	Definition: Potenzreihe	55
3.4.2	Satz, Konvergenzradius	56
3.4.3	Satz	56
3.4.4	Bemerkungen und Beispiele	56
3.4.5	Satz: Summe und Produkt von Potenzreihen	57
3.4.6	Identitätssatz	58
3.4.7	Beispiele	59
3.4.8	Satz über die Verknüpfung von Potenzreihen	59
3.4.9	Beispiel	59
3.4.10	Satz über das Reziproke einer Potenzreihe	60
3.4.11	Beispiel	60
3.4.12	Umentwickeln von Potenzreihen	61
3.4.13	Beispiel	61
3.4.14	Abelscher Grenzwertsatz	62
3.5	Exponentialfunktion und Logarithmus	62
3.5.1	Definition der Exponentialfunktion $\exp(x)$	62
3.5.2	Satz: Eigenschaften der Exponentialfunktion	62
3.5.3	Definition des Logarithmus $\log x$	63
3.5.4	Satz	63
3.5.5	Bemerkung	64
3.5.6	Definition von e^x für $x \in \mathbb{R}$	65
3.5.7	Hyperbolische Funktionen	65
3.6	Die trigonometrischen Funktionen	65
3.6.1	Definitionen und Satz	65
3.6.2	Hilfssatz	67
3.6.3	Die Zahl π	67
3.6.4	Einfache Eigenschaften von Sinus und Cosinus	67
4	Differentialrechnung	69
4.1	Differenzierbare Funktionen	69
4.1.1	Definition	69
4.1.2	Bemerkungen und Beispiele	69
4.1.3	Differentiationsregeln	70
4.1.4	Umformung der Definition	71
4.1.5	Kettenregel	71
4.1.6	Beispiele	72

4.1.7	Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion	72
4.1.8	Beispiele	73
4.1.9	Höhere Ableitungen	73
4.1.10	Leibnizregel	73
4.2	Die Mittelwertsätze der Differentialrechnung	73
4.2.1	Definition: Minimum, Maximum	73
4.2.2	Bemerkung	73
4.2.3	Satz von Rolle	74
4.2.4	Mittelwertsatz der Differentialrechnung	74
4.2.5	Beispiele	74
4.2.6	Satz	75
4.2.7	Satz	75
4.2.8	Aufgabe	75
4.2.9	Verallgemeinerter Mittelwertsatz	75
4.2.10	Regel von de l'Hôpital	76
4.2.11	Beispiele	77
4.3	Anwendungen der Differentialrechnung	77
A	Monotone Funktionen	77
4.3.1	Satz	77
4.3.2	Beispiel: $f(x) = x \cdot \log x$	78
B	Konvexe Funktionen	78
4.3.3	Definition: konvex	78
4.3.4	Satz	78
4.3.5	Satz	79
C	Die Arcusfunktionen	79
4.3.6	Arcustangens	79
4.3.7	Arcuscotangens	80
4.3.8	Arcussinus	80
4.3.9	Arcuscosinus	81
D	Differentiation und gleichmäßige Konvergenz	82
4.3.10	Beispiel	82
4.3.11	Satz	82
4.3.12	Folgerungen	83
4.3.13	Beispiele	84
4.4	Der Satz von Taylor	85
4.4.1	Beispiele	85
4.4.2	Hilfssatz	86
4.4.3	Definition: Das Taylorpolynom	87
4.4.4	Bemerkung	87
4.4.5	Satz von Taylor	87
4.4.6	Beispiele	88
4.5	Extremwertrechnung	89
4.5.1	Definition: relatives Minimum/Maximum	89
4.5.2	Satz	89
4.5.3	Satz	90
4.5.4	Beispiele	90

5	Das Riemannsche Integral	93
5.1	Darboux'sche Summen	93
5.1.1	Definition: Darboux'sche Ober- und Untersumme	93
5.1.2	Hilfssatz	93
5.1.3	Definition: Unteres und oberes Integral	94
5.1.4	Definition: Integrierbar, Riemannintegral	94
5.1.5	Riemann'sches Integrabilitätskriterium	94
5.1.6	Satz: Monotone Funktionen sind integrierbar	95
5.1.7	Beispiele	95
5.1.8	Hilfssatz	96
5.1.9	Satz: Stetige Funktionen sind integrierbar	98
5.1.10	Satz	98
5.2	Riemann'sche Summen	99
5.2.1	Definition: Riemann'sche Zwischensumme	99
5.2.2	Hilfssatz	99
5.2.3	Satz	99
5.2.4	Satz	100
5.2.5	Hilfssatz	100
5.2.6	Beweis für 5.2.4	101
5.2.7	Regeln für Riemann-integrierbare Funktionen	101
5.2.8	Satz	103
5.3	Hauptsatz der Diff.- und Integralrechnung	103
5.3.1	Mittelwertsatz der Integralrechnung	103
5.3.2	Definition: Stammfunktion, unbestimmtes Integral	104
5.3.3	Hauptsatz der Diff.- und Integralrechnung	104
5.3.4	Beispiel	105
5.3.5	Partielle Integration	105
5.3.6	Substitutionsregel	105
5.3.7	Beispiel	107
5.3.8	Satz von Taylor mit Integralrestglied	107
5.3.9	Satz von Bernstein	108
5.3.10	Beispiel	109
5.4	Integration von rationalen Funktionen	110
5.4.1	Problem	110
5.4.2	Prinzip	110
5.4.3	Beispiele	111
5.4.4	Allgemeines zum 4. Schritt	112
5.4.5	Auf rationale Funktionen zurückführbare Integrale	114
5.5	Uneigentliche Integrale	118
5.5.1	Definition	118
5.5.2	Bemerkungen	118
5.5.3	Beispiele	119
5.5.4	Cauchy-kriterium	120
5.5.5	Dirichlet-kriterium	120
5.5.6	Beispiele	121
5.5.7	Definition: Absolute Konvergenz	122
5.5.8	Majorantenkriterium	122
5.5.9	Nützliche Majoranten	122
5.5.10	Satz über die majorisierte Konvergenz	123
5.5.11	Beispiel: Die Gammafunktion	123

5.5.12	Integralkriterium für Reihen	125
6	Komplexe Zahlen und Funktionen	127
6.1	Komplexe Zahlen	127
6.1.1	Einführung	127
6.1.2	Bezeichnungen	127
6.1.3	Dreiecksungleichung	128
6.2	Folgen und Reihen	128
6.2.1	Definition: Komplexe Folge	128
6.2.2	Beispiel	129
6.2.3	Vererbung der Grenzwertregeln	129
6.2.4	Definition: Komplexe Reihe	129
6.2.5	Beispiel: Die geometrische Reihe	129
6.2.6	Cauchy Kriterium	130
6.2.7	Satz von Bolzano-Weierstraß	130
6.2.8	Dirichletkriterium	130
6.2.9	Definition: Absolute Konvergenz	130
6.2.10	Regeln	130
6.2.11	Beispiele	131
6.3	Konvergenz und Stetigkeit	131
6.3.1	Definition: Stetigkeit	131
6.3.2	Beispiel	132
6.3.3	Definition: Gleichmäßige Konvergenz	132
6.3.4	Satz	132
6.3.5	Definition: Potenzreihe	132
6.3.6	Die Exponentialfunktion	133
6.3.7	Eulersche Formel	133
6.3.8	Bemerkungen	133
6.3.9	Additionstheoreme von Sinus und Cosinus	133
6.3.10	Polarkoordinaten	134
6.3.11	Potenzen	134
6.3.12	Wurzeln	134
6.3.13	Polynome	135
6.3.14	Fundamentalsatz der Algebra	135
6.3.15	Folgerungen	136
6.3.16	Satz über die Partialbruchzerlegung	137
6.3.17	Hilfssatz 1	137
6.3.18	Hilfssatz 2	137
6.3.19	Beweis der Partialbruchzerlegung	138
6.4	Trigonometrische Reihen	139
6.4.1	Definition: Trigonometrische Reihe	139
6.4.2	Bemerkung	139
6.4.3	Beispiel	139
6.4.4	Integration von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$	140
6.4.5	Integrationsregeln	140
6.4.6	Beispiel	141
6.5	Fourierreihen	141
6.5.1	Definition	141
6.5.2	Bemerkung	141
6.5.3	Beispiel	142

6.5.4	Satz	142
6.5.5	Beispiel	143
6.5.6	Besselsche Ungleichung	144
6.5.7	Satz von Riemann-Lebesgue	145
6.5.8	Der Dirichletkern	146
6.5.9	Riemannscher Lokalisationsatz	147
6.6	Konvergenz- und Approximationssätze	148
6.6.1	Satz	148
6.6.2	Beispiele	148
6.6.3	Beweis von 6.6.1	149
6.6.4	Beispiele	150
6.6.5	Satz	150
6.6.6	Satz	151
6.6.7	Satz	151
6.6.8	Beispiel	152
6.6.9	Satz von Fejer	153
6.6.10	Approximationssatz von Weierstraß	154
6.6.11	Satz	155
7	Metrische Räume	157
7.1	Der euklidische Raum	157
7.1.1	Definition von $\mathbb{R}^n$	157
7.1.2	Definition des Skalarproduktes und der euklidischen Norm	157
7.1.3	Eigenschaften des Skalarproduktes	157
7.1.4	Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung	158
7.1.5	Eigenschaften der Euklidnorm	158
7.1.6	Satz des Pythagoras	159
7.1.7	Definition: Norm, Normierter Raum	159
7.1.8	Beispiele	159
7.1.9	Definition: Skalarprodukt	160
7.1.10	Satz	160
7.1.11	Beispiele	160
7.2	Topologische Grundbegriffe	161
7.2.1	Definition: Metrik, metrischer Raum	161
7.2.2	Beispiele	162
A	Offene Mengen	162
7.2.3	Definition: Offene Kugel	162
7.2.4	Beispiel	162
7.2.5	Definition: Innerer Punkt, Inneres, offen	163
7.2.6	Beispiel	163
7.2.7	Satz	163
7.2.8	Bemerkung	164
B	Folgen	164
7.2.9	Definition: Folge	164
7.2.10	Eigenschaften	164
7.2.11	Beispiel	165
7.2.12	Satz	165
7.2.13	Regeln	165
C	Abgeschlossene Mengen	166
7.2.14	Definition: Rand, abgeschlossen, Häufungspkt., abgeschl. Hülle	166

7.2.15	Beispiel	166
7.2.16	Aufgabe	167
7.2.17	Satz	167
7.3	Kompakte und vollständige Räume	168
7.3.1	Definition: Kompakt	168
7.3.2	Satz	168
7.3.3	Beispiel	168
7.3.4	Satz von Bolzano-Weierstraß	169
7.3.5	Definition: Cauchyfolge, vollständig, Banachraum	169
7.3.6	Beispiele/Bemerkungen	170
7.4	Stetige Funktionen	171
7.4.1	Definition: Stetigkeit	171
7.4.2	Bemerkungen	171
7.4.3	Beispiel	172
7.4.4	Komposition	172
7.4.5	Satz	172
7.4.6	Regeln für Funktionen vom Typ $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	173
7.4.7	Satz	173
7.4.8	Satz vom Minimum und Maximum	173
7.4.9	Definition: Äquivalenz von Normen	173
7.4.10	Beispiel	174
7.4.11	Satz	174
7.4.12	Bemerkung	174
7.4.13	Beispiel	175
7.5	Mehr über stetige Funktionen	175
7.5.1	Satz von Heine	175
7.5.2	Satz über die Umkehrfunktion	176
7.5.3	Definition	176
7.5.4	Satz	176
7.5.5	Banachscher Fixpunktsatz	176
7.5.6	Beispiel: Fredholmsche Integralgleichung	177
7.5.7	Beispiel: Der Satz von Picard-Lindelöf	179
7.5.8	Konkretes Beispiel für den Satz von Picard-Lindelöf	181
7.5.9	Definition	181
7.5.10	Beispiel	181
7.5.11	Satz von Heine-Borel	182
7.6	Zusammenhang	183
7.6.1	Definition: Partition, zusammenhängend	183
7.6.2	Anschauliche Beispiele	183
7.6.3	Bemerkung	184
7.6.4	Definition: Gebiet	184
7.6.5	Satz	184
7.6.6	Zwischenwertsatz	185
7.6.7	Satz	186
7.6.8	Hilfssatz	186
7.6.9	Beispiel	186
7.6.10	Satz	187
7.6.11	Bemerkung	187
7.6.12	Zusatz	188
7.6.13	Testbeispiel	189

7.6.14	Definition: Weg	189
7.6.15	Beispiel	189
7.6.16	Definition: Wegzusammenhang	189
7.6.17	Beispiel	189
7.6.18	Satz	189
7.6.19	Beispiel/Aufgabe	190
7.6.20	Satz	190
7.7	Gleichgradige Stetigkeit	190
7.7.1	Definition: gleichgradig stetig	190
7.7.2	Beispiele	191
7.7.3	Satz von Arzela-Ascoli	191
7.7.4	Beispiel: Existenzsatz von Peano	192
7.7.5	Beispiel für den Existenzsatz von Peano	193
8	Mehrdimensionale Differentialrechnung	195
8.1	Matrizen und quadratische Formen	195
8.1.1	Definition: Matrizen	195
8.1.2	Rechenregeln für Matrizen	195
8.1.3	Transponierte Matrizen	195
8.1.4	Skalarprodukt	196
8.1.5	Matrizennorm	196
8.1.6	Beispiele	196
8.1.7	Definition: Quadratische Formen	197
8.1.8	Bemerkung	197
8.1.9	Definition: positiv/negativ (semi-)definit	198
8.1.10	Bemerkungen	198
8.1.11	Beispiele	198
8.1.12	Definition: Landau-Symbole	199
8.1.13	Beispiele	199
8.1.14	Regeln für Landau-Symbole	200
8.1.15	Beispiel	200
8.2	Differenzierbare Funktionen	200
8.2.1	Definition: Differenzierbarkeit	200
8.2.2	Bemerkungen	201
8.2.3	Beispiele	201
8.2.4	Satz	201
8.2.5	Satz: Die Ableitung ist eindeutig	202
8.2.6	Regeln für differenzierbare Funktionen	203
8.2.7	Kettenregel für differenzierbare Funktionen	203
8.2.8	Mittelwertsatz I	204
8.2.9	Mittelwertsatz II	204
8.2.10	Definition: Integrierbarkeit von Matrizen	204
8.2.11	Mittelwertsatz III	204
8.2.12	Satz	205
8.3	Partielle Ableitungen	205
8.3.1	Vorüberlegungen	205
8.3.2	Definition: Partielle Ableitung, Gradient	206
8.3.3	Satz	206
8.3.4	Definition: Richtungsableitung	206
8.3.5	Satz	206

8.3.6	Satz	207
8.3.7	Beispiele	207
8.3.8	Satz	208
8.3.9	Bemerkungen	209
8.4	Höhere Ableitungen	209
8.4.1	Definition: Stetig differenzierbar	209
8.4.2	Definition: Mehrfach stetig differenzierbar	209
8.4.3	Beispiele	209
8.4.4	Satz von H. A. Schwarz (1. Version)	210
8.4.5	Satz von H. A. Schwarz (2. Version)	210
8.4.6	Definition und Regeln: Multiindex	210
8.4.7	Definition: Polynom, Taylorpolynom	211
8.4.8	Satz von Taylor	211
8.4.9	Spezialfall für den Satz von Taylor	213
8.4.10	Definition: Hesse-Matrix	213
8.4.11	Definition: Extremum	213
8.4.12	Satz	213
8.4.13	Satz	214
8.4.14	Beispiele	214
8.5	Implizite Funktionen und Umkehrfunktionen	215
8.5.1	Beispiel	215
8.5.2	Schreibweisen	215
8.5.3	Satz über implizit definierte Funktionen	215
8.5.4	Beispiel	218
8.5.5	Satz über die Umkehrfunktion	218
8.5.6	Definition: Diffeomorphismus	219
8.5.7	Satz über die Gebietstreue	219
8.6	Extrema mit Nebenbedingungen	219
8.6.1	Allgemeines Problem	219
8.6.2	Konkrete Probleme	219
8.6.3	Lagrangesche Multiplikationsregel	220
8.6.4	Beispiel	220
8.6.5	Praktisches Vorgehen	221
8.6.6	Beispiele	222
8.6.7	Satz	223
9	Kurvenintegrale	225
9.1	Riemann-Stieltjes Integrale	225
9.1.1	Feste Bezeichnungen, Riemann-Stieltjes-Summe	225
9.1.2	Definition: Riemann-Stieltjes-Integral	225
9.1.3	Bemerkung	225
9.1.4	Beispiel	225
9.1.5	Cauchy Kriterium	226
9.1.6	Eigenschaften des RS-Integrales	226
9.1.7	Partielle Integration	227
9.1.8	Zusammenhang zwischen RS- und R-Integralen	228
9.1.9	Satz: Existenz des RS-Integrales	229
9.2	Funktionen von endlicher Variation	229
9.2.1	Definition: Variation	229
9.2.2	Beispiele	230

9.2.3	Satz	231
9.2.4	Zerlegungssatz	232
9.2.5	Satz	233
9.2.6	Folgerung aus dem Zerlegungssatz	234
9.2.7	Mittelwertsatz	234
9.2.8	Beispiel zum RS-Integral	234
9.3	Wege und Weglängen	235
9.3.1	Definition: Weg	235
9.3.2	Definition: rektifizierbarer Weg, Länge	235
9.3.3	Satz	235
9.3.4	Satz	236
9.3.5	Beispiele	237
9.3.6	Definition: Äquivalenz von 2 Wegen	238
9.3.7	Beispiel	238
9.3.8	Satz und Definition: Kurve, Parameterdarstellung	238
9.3.9	Satz: Eigenschaften äquivalenter Wege	239
9.3.10	Umorientierung von Wegen	239
9.3.11	Aneinanderhängen von Wegen	239
9.3.12	Definition: Jordanweg/-bogen	239
9.3.13	Satz: Äquivalenz von Jordanbögen	240
9.3.14	Definition: geschlossene Kurve, Jordankurve	240
9.3.15	Jordanscher Kurvensatz	240
9.3.16	Tangente an eine Kurve	240
9.3.17	Definition: C^1 -Kurve, glatte Kurve	240
9.3.18	Beispiel	240
9.3.19	Definition: stückweise C^1 /glatt	240
9.3.20	Satz	241
9.3.21	Parametrisierung nach der Bogenlänge	241
9.3.22	Satz	241
9.4	Kurvenintegral	241
9.4.1	Definition	241
9.4.2	Bemerkungen	242
9.4.3	Beispiel im $\mathbb{R}^2$	243
9.4.4	Eigenschaften der Kurvenintegrale	244
9.5	Kurvenintegrale und Stammfunktionen	246
9.5.1	Definition: Vektorfeld, Potential	246
9.5.2	Bemerkung	246
9.5.3	Beispiel	246
9.5.4	Satz	247
9.5.5	Bemerkungen	248
9.5.6	Lemma von Poincaré	249
9.5.7	Hilfssatz	250
9.5.8	Praktische Berechnung einer Stammfunktion	250
9.5.9	Beispiele	251
10	Das Lebesgue-Integral	253
10.1	Nullmengen und Treppenfunktionen	253
10.1.1	Definition: Intervall im $\mathbb{R}^n$	253
10.1.2	Definition: Nullmenge	253
10.1.3	Beispiele und Bemerkungen	253

10.1.4	Satz	254
10.1.5	Sprechweise: fast überall	255
10.1.6	Beispiel	255
10.1.7	Definition: Treppenfunktion	255
10.1.8	Satz	255
10.1.9	Bemerkung	255
10.1.10	Definition: Lebesgue-Integral bei Treppenfunktionen	255
10.1.11	Bemerkung	255
10.1.12	Satz: Eigenschaften des Lebesgue-Integrals	256
10.1.13	Lemma A	256
10.1.14	Lemma B	257
10.2	Meßbare und integrierbare Funktionen	258
10.2.1	Definition: meßbar, L^+	258
10.2.2	Bemerkungen und Beispiele	258
10.2.3	Beispiel	260
10.2.4	Satz	260
10.2.5	Definition: L	261
10.2.6	Bemerkung	261
10.2.7	Aufgabe	262
10.2.8	Satz	262
10.2.9	Beispiel	263
10.3	Konvergenzsätze	263
10.3.1	Satz von Beppo Levi	263
10.3.2	Satz von Beppo Levi für Reihen	265
10.3.3	Beispiel: Charakteristische Funktion	266
10.3.4	Integrabilitätskriterium von Riemann-Lebesgue	266
10.3.5	Bemerkung	267
10.3.6	Satz von Lebesgue über majorisierte Konvergenz	267
10.3.7	Folgerungen	268
10.3.8	Hilfsüberlegung	269
10.3.9	Lemma von Fatou	269
10.4	Der Satz von Fubini	270
10.4.1	Vorbemerkungen	270
10.4.2	Satz von Fubini	271
10.4.3	Beispiele	271
10.4.4	Hilfssatz zum Beweis des Satzes von Fubini	272
10.4.5	Beweis des Satzes von Fubini	273
10.4.6	Beispiel	275
10.4.7	Satz von Tonelli	275
10.4.8	Beispiel	276
10.5	Meßbare Mengen	276
10.5.1	Def.: Charakteristische Funktion, Meßbarkeit	276
10.5.2	Bemerkungen	276
10.5.3	Satz	277
10.5.4	Prinzip von Cavalieri	277
10.5.5	Definition: Integrierbarkeit über E	278
10.5.6	Definition: Ordinatenmengen	278
10.5.7	Satz	278
10.5.8	Folgerung	279
10.5.9	Bemerkung	280

10.5.10	Beispiel: Maß der n -dimensionalen Kugel	280
10.5.11	Rotationskörper im $\mathbb{R}^3$	281
10.5.12	Satz	281
10.5.13	Satz	282
10.5.14	Beispiel einer nicht meßbaren Menge in $\mathbb{R}$	283
10.5.15	Satz, absolute Stetigkeit des L-Integrals	284
10.6	Die Transformationsformel	285
10.6.1	Motivation	285
10.6.2	Die Transformationsformel	285
10.6.3	Satz (Spezialfall von 10.6.2)	285
10.6.4	Hilfssatz 1	288
10.6.5	Hilfssatz 2	289
10.6.6	Hilfssatz 3	290
10.6.7	Hilfssatz 4	291
10.6.8	Beweis der Transformationsformel	292
10.6.9	Spezielle Transformationen	293
10.6.10	Beispiele	296
10.7	Parameterintegrale	297
10.7.1	Feste Bezeichnungen	297
10.7.2	Satz über die Stetigkeit	297
10.7.3	Differenzierbarkeit von Parameterintegralen	298
10.7.4	Beispiel	299
10.7.5	Beispiel: Das Newton-Potential	300
10.8	Das eindimensionale Lebesgue-Integral	302
10.8.1	Satz	302
10.8.2	Hilfssatz (Sunrise-Lemma)	303
10.8.3	Beweis zu 10.8.1	303
10.8.4	Beispiel	306
10.8.5	Beispiel einer stetigen, streng wachsenden Funktion mit Ableitung 0	307
10.8.6	Satz	308
10.8.7	Definition: absolute Stetigkeit	309
10.8.8	Beispiele und Bemerkungen	309
10.8.9	Hauptsatz	311
10.8.10	Folgerungen aus dem Hauptsatz	313
11	Vektoranalysis	315
11.1	Der Gaußsche Integralsatz im $\mathbb{R}^2$	315
11.1.1	Definition: Normalbereich	315
11.1.2	Integralsatz von Gauß	315
11.1.3	Bemerkungen	316
11.1.4	Folgerung: Fläche eines Normalbereiches	317
11.1.5	Beispiel: Fläche einer Ellipse	317
11.1.6	Leibnizsche Sektorformel	317
11.1.7	Beispiel zu Gauß	318
11.1.8	Die Greenschen Formeln	319
11.1.9	Definition: harmonisch, Potentialfunktion	320
11.1.10	Gaußsche Mittelwertformel	320
11.1.11	Minimum- Maximum-Prinzip	321
11.2	Flächen im $\mathbb{R}^3$	321
11.2.1	Definition: Vektorprodukt	321

11.2.2	Bemerkungen/Regeln	322
11.2.3	Def.: Parameterdarstellung eines Flächenstücks	322
11.2.4	Explizite Fläche	323
11.2.5	Mantelfläche	323
11.2.6	Rotationsfläche	323
11.2.7	Satz	324
11.2.8	Zusatz	324
11.2.9	Definition: Flächenintegral, Oberfläche	325
11.2.10	Satz	325
11.2.11	Beispiele	326
11.2.12	Bemerkungen	327
11.3	Integralsätze (Gauß, Stokes) im $\mathbb{R}^3$	328
11.3.1	Definition/Motivation	328
11.3.2	Integralsatz von Gauß im $\mathbb{R}^3$	329
11.3.3	Bemerkung	329
11.3.4	Bezeichnungen der Vektoranalysis	329
11.3.5	Regeln	330
11.3.6	Satz: Lemma von Poincaré	330
11.3.7	Integralsatz von Stokes im $\mathbb{R}^3$	330
11.4	Differentialformen	332
11.4.1	Definition: multilinear, alternierend, p -Form	332
11.4.2	Beispiele	333
11.4.3	Grundformen	333
11.4.4	Beispiel	333
11.4.5	Darstellungssatz	334
11.4.6	Beispiele im $\mathbb{R}^3$	334
11.4.7	Beweis des Darstellungssatzes (11.4.5)	334
11.4.8	Definition: Ableitung von p -Formen	335
11.4.9	Multiplikation von Formen	335
11.4.10	Regeln zur Differenzierung von Formen	335
11.4.11	Beispiele	335
11.4.12	Satz	336
11.4.13	Bemerkungen	337
11.4.14	Definition: Stammform, geschlossen	337
11.4.15	Beispiele/Bemerkungen	338
11.4.16	Definition	339
11.4.17	Bemerkung	339
11.4.18	Hilfssatz	340
11.4.19	Lemma von Poincaré	341
11.4.20	Beispiel	342
11.4.21	Zurückholen von Differentialformen	342
11.4.22	Beispiel	343
11.4.23	Regeln	343
11.4.24	Satz	343
11.5	Flächen und Mannigfaltigkeiten	345
11.5.1	Definition: p -Flächenstück	345
11.5.2	Beispiel	345
11.5.3	Definition: Verträglichkeit von Flächenstücken	346
11.5.4	Bemerkungen	346
11.5.5	Definition: Tangentialraum	346

11.5.6	Bemerkungen	346
11.5.7	Definition: gleichorientierte Flächenstücke	347
11.5.8	Definition	347
11.5.9	Beispiele	347
11.5.10	Satz	348
11.5.11	Bemerkung	348
11.5.12	Definition: Flächenstück mit Rand	349
11.5.13	Bemerkung	349
11.5.14	Beispiele	349
11.5.15	Definition: p -Mannigfaltigkeit, p -Fläche	350
11.5.16	Beispiel	350
11.5.17	Bemerkung	350
11.5.18	Zerlegung der Eins	351
11.5.19	Def.: Integral von p -Form über p -Mannigfaltigkeit	352
11.5.20	Satz	352
11.6	Der Integralsatz von Stokes	353
11.6.1	Integralsatz von Stokes	353
11.6.2	Bemerkungen	353
11.6.3	Beweis zum Integralsatz von Stokes, 11.6.1	354
11.7	Oberflächenmaße	356
11.7.1	Definition: Gram'sche Matrix und Determinante	356
11.7.2	Bemerkungen/Beispiele	356
11.7.3	Hilfssatz	357
11.7.4	Definition: Oberflächenintegral	357
11.7.5	Bemerkungen	358
11.7.6	Beispiel: Inhalt der n -dimensionalen Einheitskugel	359
11.7.7	Gaußscher Integralsatz oder Divergenzsatz [klassische Form]	360
12	Fourierreihen und -Transformationen	361
12.1	L^p -Räume	361
12.1.1	Vorbemerkungen	361
12.1.2	Definition: Der L^p -Raum	361
12.1.3	Bemerkungen und Beispiele	361
12.1.4	Höldersche und Minkowskische Ungleichung	362
12.1.5	Bemerkung	364
12.1.6	Satz: L^p ist ein Vektorraum	364
12.1.7	Bemerkung	364
12.1.8	Definition: Konvergenz im L^p	364
12.1.9	Satz von Riesz-Fischer	364
12.1.10	Zusatz	365
12.1.11	Beispiel	365
12.1.12	Approximation durch stetige Funktionen	367
12.1.13	Erinnerung an Analysis I	367
12.1.14	Definition	368
12.1.15	Bemerkung	368
12.1.16	Satz	369
12.1.17	Bemerkung	370
12.2	Die Fouriertransformation	370
12.2.1	Definition	370
12.2.2	Beispiele	370

12.2.3	Einfache Eigenschaften der Fouriertransformation	372
12.2.4	Satz von Plancherel	372
12.2.5	Satz: Stetigkeit und Differenzierbarkeit von $\hat{f}$	373
12.2.6	Satz	374
12.2.7	Hilfssatz	374
12.2.8	Beweis von 12.2.6	375
12.2.9	Ziel: Die Umkehrformel	375
12.2.10	Definition: Faltung	375
12.2.11	Satz: Einfache Eigenschaften der Faltung	375
12.2.12	Beispiel 1	376
12.2.13	Beispiel 2	377
12.2.14	Umkehrsatz	378
12.2.15	Bemerkungen	380
12.2.16	Satz	380
12.2.17	Hilfssatz	381
12.2.18	Die Wärmeleitungsgleichung	382
12.2.19	Bisherige Eigenschaften der Fouriertransformation	383
12.2.20	Hilfssatz	383
12.2.21	Satz, Parsevalsche Gleichung	384

0 Mathematische Notationen¹

0.1 Mengen

0.1.1 Naive Mengendefinition

Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten und wohlunterschiedenen Objekten.

Es gelten die folgenden Aussagen:

$x \in M$: x ist Element von M , x gehört zur Menge M („ x aus M “).

$x \notin M$: x ist nicht Element von M , x gehört nicht zur Menge M .

0.1.2 Mengenschreibweisen

Es gibt die aufzählende und die beschreibende Mengenschreibweise:

aufzählend: $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

Bsp.: $M = \{\text{Merkur, Venus, Erde, Mars}\}$

beschreibend: $M = \{x: x \text{ hat die Eigenschaft } \varepsilon\}$

Bsp.: $M = \{x: x \text{ ist innerer Planet}\}$

0.1.3 Mengenrelationen

$A \subseteq B$ ist eine Teilmengenrelation und bedeutet: A ist Teilmenge von B , A ist Untermenge von B oder B ist Obermenge von A . D. h. jedes $x \in A$ gehört auch zu B .

$B \supseteq A$ bedeutet genau das gleiche wie $A \subseteq B$.

$A = B$ bedeutet: $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$.

$\emptyset$ ist die Menge, die kein Element enthält. $\emptyset$ heißt leere Menge. Für jede Menge A ist $\emptyset \subseteq A$.

$P(M) := \{A: A \subseteq M\}$ ist die Potenzmenge von M . Für $M = \{a, b, c\}$ ist

$$P(M) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

die Potenzmenge. Für alle Mengen M gilt insbesondere $M \subseteq P(M)$.

0.1.4 Mengenoperationen

Vereinigung:

$$A \cup B = \{x: x \in A \text{ oder } x \in B\}$$

Durchschnitt:

$$A \cap B = \{x: x \in A \text{ und } x \in B\}$$

Für Durchschnitt und Vereinigung gelten folgende Aussagen:

$$A \cap B \subseteq A, B \text{ und } A, B \subseteq A \cup B.$$

Differenz:

$$A \setminus B = \{x: x \in A, x \notin B\}$$

---

¹Version 190 vom 13. Februar 2006

kartesisches Produkt:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$$

Für jedes Paar (a, b) gilt:

$$(a, b) = (a_1, b_1) \Leftrightarrow a = a_1, b = b_1.$$

Sei nun $\Lambda \neq \emptyset$ und zu jedem Element $\lambda \in \Lambda$ sei M_λ Menge. Dann setzt man

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda = \{x : x \in M_\lambda \text{ für ein } \lambda \in \Lambda\},$$

die Vereinigung der Mengen M_λ und

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda = \{x : x \in M_\lambda \text{ für jedes } \lambda \in \Lambda\},$$

der Durchschnitt der Mengen M_λ

Bereits bekannte Mengen von Zahlen

Zeichen	Name	Beschreibung
$\mathbb{N}$	Menge der natürlichen Zahlen	$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	Menge der ganzen Zahlen	$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	Menge der rationalen Zahlen	$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$

0.2 Abbildungen

Seien A, B Mengen.

0.2.1 Naive Abbildungsdefinition

Eine *Abbildung* oder *Funktion* f von A nach B ist eine Vorschrift, die jedem $a \in A$ ein eindeutig bestimmtes $b \in B$ zuordnet.

Schreibweise:

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

0.2.2 Graph von f

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung. Dann ist

$$\text{graph } f = \{(a, f(a)) : a \in A\} \subseteq A \times B$$

der *Graph* von f .

0.2.3 Komposition

Sind $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ Abbildungen. Dann heißt

$$g \circ f : A \rightarrow C, (g \circ f)(a) = g(f(a))$$

die *Komposition* „ g nach f “

0.2.4 Definitions- und Wertebereich

Sei $f: A \rightarrow B$ eine Abbildung. Dann heißt A der *Definitionsbereich* und B der *Werte-/Zielbereich* von f .

0.2.5 Bild und Urbild

Für $A_1 \subseteq A$ heißt

$$f(A_1) := \{f(a) : a \in A_1\} \subseteq B$$

Bild von A_1 unter f . Insbesondere ist $f(A)$ das Bild von f .

Für $B_1 \subseteq B$ heißt

$$f^{-1}(B_1) := \{a : f(a) \in B_1\} \subseteq A$$

Urbild von B_1 unter f .

0.2.6 injektiv, surjektiv, bijektiv

Die Funktion $f : A \rightarrow B$ heißt

surjektiv: $f(A) = B$

injektiv: für beliebige $x, y \in A$, $x \neq y$ gilt: $f(x) \neq f(y)$

bijektiv: f ist injektiv und surjektiv

0.2.7 Umkehrfunktion

Ist $f : A \rightarrow B$ injektiv, so gibt es eine Funktion/Abbildung $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$ mit $f^{-1}(f(x)) = x$. f^{-1} heißt Umkehrfunktion von f auf $f(A)$. f^{-1} existiert genau dann auf B , wenn f bijektiv ist.

0.3 Elementare Logik

A und B seien Aussagen, wahr oder falsch.

$A \Rightarrow B$ bedeutet: „aus A folgt B “

aus der Gültigkeit der Aussage A

folgt die Gültigkeit von B

A ist *hinreichend* für B

B ist *notwendig* für A

$B \Leftarrow A$ hat genau die gleiche Bedeutung

$A \Leftrightarrow B$ bedeutet: „genau dann“, A und B sind äquivalent

A und B sind zugleich richtig oder falsch

gleichbedeutend: $A \Rightarrow B$, und $A \Leftarrow B$

1 Die reellen Zahlen¹

1.1 Der Körper $\mathbb{R}$

1.1.1 Definition: $\mathbb{R}$

Es gibt eine Menge $\mathbb{R}$ — die Menge der reellen Zahlen — und darauf sind eine Addition $x + y$ und eine Multiplikation $x \cdot y$ erklärt, so daß folgende Regeln (Axiome) erfüllt sind:

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$ beliebig

1. Assoziativitätsgesetz:

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

2. Kommutativgesetz:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

3. Existenz von 0 und 1

$$\text{Es gibt } 0 \in \mathbb{R} \text{ mit } 0 + x = x$$

$$\text{Es gibt } 1 \in \mathbb{R} \text{ mit } 1 \cdot x = x$$

4. Existenz der Inversen:

$$\text{Zu jedem } x \in \mathbb{R} \text{ gibt es ein } (-x) \in \mathbb{R} \text{ mit } x + (-x) = 0$$

$$\text{Zu jedem } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ gibt es ein } x^{-1} \in \mathbb{R} \text{ mit } x \cdot x^{-1} = 1$$

5. Distributivgesetz: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

1.1.2 Bemerkungen

(1) Jede Menge, in der eine Addition und eine Multiplikation erklärt sind, so daß 1–5 gelten, heißt Körper.

(2) z.B. ist $\mathbb{Q}$ ein Körper.

(3) Statt $x + (-y)$ schreibt man $x - y$.

Statt x^{-1} schreibt man $\frac{1}{x}$.

Statt $x \cdot y^{-1}$ schreibt man $\frac{x}{y}$.

1.2 Anordnung von $\mathbb{R}$

1.2.1 Definition

$\mathbb{R}$ ist angeordnet, d. h. es gibt eine Menge $P \subseteq \mathbb{R}$ mit:

1.) Für ein beliebiges $x \in \mathbb{R}$ ist $x = 0$ oder $x \in P$ oder $-x \in P$.

---

¹Version 190 vom 13. Februar 2006

1 Die reellen Zahlen

2.) Für $x, y \in P$ ist $x + y \in P$.

3.) Für $x, y \in P$ ist $x \cdot y \in P$.

P ist die Menge der positiven reellen Zahlen. Statt $x \in P$ schreibt man auch $x > 0$ oder $0 < x$.
 $x < y \Leftrightarrow y - x \in P$, d. h. $y - x > 0 \Leftrightarrow y > x$

1.2.2 Bemerkungen

(a) $x \in P$ heißt: x ist positiv, $-x \in P$ heißt: x ist negativ.

(b) Jeder Körper mit den Eigenschaften 1.), 2.), 3.) heißt *angeordneter Körper*, z. B. ist $\mathbb{Q}$ angeordnet mit $P = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N} \right\}$

(c) $\mathbb{R}$ wird geometrisch gedeutet als Zahlengerade.

1.2.3 Regeln

Seien $x, y, z, t, u, v \in \mathbb{R}$:

(1) $x < y \Rightarrow x + z < y + z$

(2) $x < y$ und $y < z \Rightarrow x < z$

(3) $x < y$ und $u < v \Rightarrow x + u < y + v$

(4) $x < y$ und $z > 0$ [$z < 0$] $\Rightarrow xz < yz$ [$xz > yz$]

(5) $x \neq 0 \Rightarrow x^2 = x \cdot x > 0$. Insbesondere ist $1 > 0$

(6) $x < y$ und $0 < t < 1 \Rightarrow x < tx + (1 - t)y < y$. Insbesondere gilt $x < \frac{x+y}{2} < y$

(7) $0 < x < y \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$

1.3 Die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

1.3.1 Definition

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$, $\xi \in \mathbb{R}$

(a) ξ heißt *obere* bzw. *untere* Schranke von M , wenn für alle $x \in M$ gilt: $x \leq \xi$ bzw. $x \geq \xi$.

(b) Gibt es eine obere bzw. untere Schranke, so heißt M *nach oben* bzw. *nach unten* beschränkt. Existieren beide Schranken, so heißt M *beschränkt*.

(c) Ist ξ obere bzw. untere Schranke mit $\xi \in M$, so heißt ξ das Maximum $\max M$ bzw. das Minimum $\min M$ von M .

1.3.2 Bemerkung

1. Sei ξ untere Schranke von M .

Dann ist jede Zahl $\xi' \in \mathbb{R}$ mit $\xi' < \xi$ ebenfalls untere Schranke von M .

2. Sei ξ obere Schranke von M .

Dann ist jede Zahl $\xi' \in \mathbb{R}$ mit $\xi' > \xi$ ebenfalls obere Schranke von M .

1.3.3 Beispiel

Sei $M = \{x : 0 \leq x < 1\}$. Es ist $0 = \min M$ und 1 ist obere Schranke von M , aber $1 \notin M$. $\Rightarrow \max M$ existiert nicht.

1.3.4 Vollständigkeitsaxiom

Jede nach oben beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt eine kleinste obere Schranke, das Supremum von M : $\sup M$. Genauso besitzt jede nach unten beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ eine größte untere Schranke, das Infimum von M : $\inf M$.

Für $\sup M$ bzw. $\inf M$ gilt:

- (a) s ist obere bzw. untere Schranke
- (b) $\xi < s$ bzw. $\xi > s \Rightarrow$ es existiert $x \in M$ mit $x > \xi$ bzw. $x < \xi$.

Gelten (a) und (b) dann ist $s = \sup M$. bzw. $s = \inf M$.

Beweis: s ist obere Schranke (a)

$\xi < s \implies \xi$ ist keine obere Schranke
(b)

$\Rightarrow s$ ist kleinste obere Schranke, also $s = \sup M$.

1.3.5 Beispiel

Sei

$$M = \left\{ \frac{x-y}{x+y} : 0 < y < 1, 0 < x < y^2 \right\}$$

Es ist

$$\begin{aligned} x+y > 0 \text{ und } x-y &< y^2 - y = y(y-1) < 0 \\ \implies \frac{x-y}{x+y} &< 0 = \text{obere Schranke} \end{aligned}$$

Behauptung: $\sup M = 0$

Beweis:

- (a) $s = 0$ ist obere Schranke.
- (b) Sei $-\frac{1}{3} < \xi < 0$, $y = 1 + \xi$ und $x = 1 + 2\xi \implies 0 < \frac{2}{3} < y < 1$
 $0 < \frac{1}{3} < x = 1 + 2\xi < 1 + 2\xi + \xi^2 = y^2$

Gilt nun

$$\frac{x-y}{x+y} = \frac{\xi}{2+3\xi} > \xi?$$

Es ist

$$2+3\xi > 2+3\left(-\frac{1}{3}\right) = 1 \implies \frac{1}{2+3\xi} > 1 \implies \frac{\xi}{2+3\xi} > \xi$$

(b) ist erfüllt

$\implies \sup M = 0 \notin M$

1.3.6 Existenz des Infimums

Jede nach unten beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt immer eine größte untere Schranke, das Infimum von M : $\inf M$.

Beweis: Sei M nach unten beschränkt, $N := \{-x \mid x \in M\}$ $\sup N = -\inf M$

1.3.7 Archimedische Eigenschaft

$\mathbb{N}$ ist nicht nach oben beschränkt.

Beweis: (Indirekter Beweis)

Annahme: $\mathbb{N}$ ist nach oben beschränkt. Damit existiert $\sup \mathbb{N} = s$.

$\Rightarrow s-1$ ist keine obere Schranke. D. h. es gibt $n \in \mathbb{N}$, so daß $n > s-1$ ist. $\Rightarrow n+1 > s$. Widerspruch zu $\sup \mathbb{N} = s$.

1.3.8 Folgerung

$$\inf \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = 0$$

Beweis: Das Infimum ist ≥ 0 , weil $\frac{1}{n} > 0$ ist für alle $n \in \mathbb{N}$.

(a) 0 ist untere Schranke

(b) Sei $\xi > 0$.

Dann gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > \frac{1}{\xi}$. $\Rightarrow \frac{1}{n} < \xi \in \{\dots\} \Rightarrow \inf\{\dots\} = 0$

1.3.9 Satz

Gilt $M \subseteq N$ und ist N nach oben bzw. unten beschränkt, so gilt:

$$\sup M \leq \sup N \text{ bzw. } \inf M \geq \inf N.$$

Beweis: $s = \sup N$ ist insbesondere obere Schranke für N , also auch für M .

$\Rightarrow \sup M \leq s$. Für das Infimum genauso.

1.3.10 Satz

Seien $M, N \subseteq \mathbb{R}$. Setze $-M := \{-x : x \in M\}$ und $M + N := \{x + y : x \in M, y \in N\}$. Dann gilt:

1. $\sup(M + N) = \sup M + \sup N$, falls M und N nach oben beschränkt sind.
2. $\inf(M + N) = \inf M + \inf N$, falls M und N nach unten beschränkt sind.
3. $\sup(-M) = -\inf M$, falls M nach unten beschränkt ist.
4. $\inf(-M) = -\sup M$, falls M nach oben beschränkt ist.

Beweis: von (2):

Setze $m := \inf M$ und $n := \inf N$

$x \in M, y \in N \Rightarrow x \geq m, y \geq n$

$\Rightarrow x + y \geq m + n$, also ist $m + n$ untere Schranke für $M + N$.

Wähle $\xi > m + n$.

Dann existieren Zahlen $x \in M$ und $y \in N$ mit $x + y < \xi$ ($\xi = \xi_1 + \xi_2, \xi_1 > m, \xi_2 > n$).

Finde $x \in M$ und $y \in N$, so daß $x < \xi_1$ und $y < \xi_2$ ist. $\Rightarrow m + n = \inf(M + N)$.

1.4 Absolutbetrag

1.4.1 Definition

Für $x \in \mathbb{R}$ heißt

$$|x| := \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

absoluter Betrag und

$$\text{sign}(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Vorzeichen von x .

Es gelten:

$$x \leq |x|, \quad -x \leq |x|, \quad |x| = \max\{x, -x\}$$

$$x = \text{sign}(x) \cdot |x|, \quad |x| = \text{sign}(x) \cdot x$$

$$|x| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x < \varepsilon$$

$$|x| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$$

1.4.2 Dreiecksungleichung

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn $x \cdot y \geq 0$ ist.

Beweis:

$$\left. \begin{array}{l} (1) \quad x + y \leq |x| + |y| \\ (2) \quad -(x + y) = -x - y \leq |x| + |y| \end{array} \right\} |x + y| \leq |x| + |y|$$

Gleichheit genau dann, wenn in (1) oder (2) Gleichheit ist.

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \Rightarrow |x| - |y| \leq |x - y|$$

$|y| - |x|$ genauso.

1.4.3 Intervalle

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Setze

$$\begin{aligned} (a, b) &= \{x: a < x < b\} && \text{offenes Intervall} \\ [a, b] &= \{x: a \leq x \leq b\} && \text{abgeschlossenes Intervall} \\ [a, b) &= \{x: a \leq x < b\} && \text{halboffene Intervalle} \\ (a, b] &= \{x: a < x \leq b\} && \end{aligned}$$

1.4.4 Bemerkung

Für jedes dieser Intervalle I ist $\sup I = b$, $\inf I = a$.

Beweis: b ist obere Schranke für I .

$$\begin{aligned} & \xi < b, a < \xi < b : x = \frac{b + \xi}{2} \\ \Rightarrow & \xi < x < b \\ \Rightarrow & x \in I \\ \Rightarrow & \xi \text{ ist nicht obere Schranke} \end{aligned}$$

1.4.5 Definition

Für $x \in \mathbb{R}$ heißt $[x]$ die größte ganze Zahl $\leq x$, d. h. $[x] = \sup\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\}$. Es gilt $[x] \leq x < [x] + 1$.

1.4.6 Satz

In jedem Intervall (a, b) gibt es ein $r \in \mathbb{Q}$ und $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. („ $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ liegen dicht in $\mathbb{R}$ “)

Beweis: Für $r \in \mathbb{Q}$ (später in 1.6.5 auf Seite 15 für $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$).

- Zunächst: $b - a > 1$
Setze $r = \begin{cases} [b] & \text{für } b \notin \mathbb{Z} \\ [b] - 1 & \text{sonst} \end{cases}$
- Allgemein: Wähle $q \in \mathbb{N}$ so, daß $q(b - a) > 1$ ist (archimed. Eigenschaft).
Das Intervall (qa, qb) enthält $p \in \mathbb{Z}$. $\Rightarrow (a, b)$ enthält $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$,
denn: $qa < p < qb \Rightarrow a < \frac{p}{q} < b \Rightarrow \frac{p}{q} \in (a, b)$

1.4.7 Erweiterungsmöglichkeiten

Erweiterung von $\mathbb{R}$: Man setzt $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ ($-\infty, \infty$ sind keine Zahlen).

Sinnvolle Relationen und Operationen:

$$-\infty < x < \infty \text{ für alle } x \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} x + \infty &= \infty \\ x - \infty &= -\infty \end{aligned} \right\} \text{ für alle } x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} x \cdot \infty &= \infty, x \cdot (-\infty) = -\infty & \text{für } x > 0 \\ x \cdot \infty &= -\infty, x \cdot (-\infty) = \infty & \text{für } x < 0 \end{aligned}$$

$$\frac{x}{\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0 \text{ für } x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{x}{0} = \infty \text{ für } x > 0, \frac{x}{0} = -\infty \text{ für } x < 0$$

Erweiterung des Intervallbegriffs: $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$.

Analog sind $(-\infty, b), [a, \infty), (a, \infty), (-\infty, \infty)$

Erweiterung des Supremum-/Infimum-Begriffs:

Ist $M \subseteq \mathbb{R}$, $M \neq \emptyset$ nicht nach oben bzw. unten beschränkt,
so setzt man $\sup M = \infty$ bzw. $\inf M = -\infty$.

1.5 Vollständige Induktion

1.5.1 Induktionsprinzip

Gegeben seien $A(n)$, Aussagen für $n \in \mathbb{N}$.

(1) [Induktionsverankerung/-voraussetzung] $A(1)$ sei wahr.

(2) [Induktionsschritt] Aus der Gültigkeit von $A(n)$ folgt die Gültigkeit von $A(n+1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Dann sind alle $A(n)$ wahr.

Beweis: Sei $M = \{n: A(n) \text{ falsch}\}$, $1 \notin M$.

$\inf M = m = \min M \Rightarrow A(m)$ ist falsch, $A(m-1)$ ist richtig. Widerspruch zu (2)!

1.5.2 Beispiel

Es ist $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis:

I.A.: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$

I.S.: $1 + 2 + \dots + n + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

1.5.3 Induktive Definition von Summe und Produkt

Seien $m, n \in \mathbb{Z}$, $a_\nu \in \mathbb{R}$

$$\sum_{\nu=m}^n a_\nu = \begin{cases} 0 & \text{falls } n < m \text{ (leere Summe)} \\ \left(\sum_{\nu=m}^{n-1} a_\nu \right) + a_n & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\prod_{\nu=m}^n a_\nu = \begin{cases} 1 & \text{falls } n < m \text{ (leeres Produkt)} \\ \left(\prod_{\nu=m}^{n-1} a_\nu \right) \cdot a_n & \text{sonst} \end{cases}$$

Für $m < n$ gilt:

$$\sum_{\nu=m}^n a_\nu =: a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

$$\prod_{\nu=m}^n a_\nu =: a_m \cdot a_{m+1} \dots a_n$$

Potenz ($a \in \mathbb{R}$): $a^n := \prod_{\nu=1}^n a = \underbrace{a \cdot a \dots a}_{n\text{-mal}}$ für $n \in \mathbb{N}$

$a^0 = 1$ und $[a^n = \frac{1}{a^{-n}}$ für $-n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0]$

Fakultät: $n! := \prod_{\nu=1}^n \nu = 1 \cdot 2 \dots n$ für $n \in \mathbb{N}$, $0! := 1$.

$$2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0 \text{ für } n \geq 1$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (x+1)^n$$

Beweis: Induktion nach n .

- $n = 0$:

$$(a+b)^0 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^k b^{0-k}$$

$$1 = 1$$

- $n = 1$:

$$(a+b)^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^k b^{1-k}$$

$$a+b = \binom{1}{0} a^0 b^1 + \binom{1}{1} a^1 b^0$$

$$a+b = b+a$$

- $n \mapsto n+1$:

$$\begin{aligned}
 (a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
 &= (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n-k+1} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k+1} \\
 &= \binom{n}{n+1-1} a^{n+1} b^{n-n-1+1} \\
 &\quad + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^k b^{n-k+1} \\
 &\quad + \binom{n}{0} a^0 b^{n+1} \\
 &= \binom{n}{n} a^{n+1} b^0 \\
 &\quad + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^k b^{n-k+1} + \binom{n}{0} b^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \quad \text{q.e.d.}
 \end{aligned}$$

1.5.7 Nachtrag

$\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$, falls $n \geq k$, $n, k \in \mathbb{N}_0$

Beweis: Induktion nach n :

$$n = 0 : \binom{0}{0} = 1 \in \mathbb{N}$$

$$n \mapsto n + 1 : \binom{n+1}{0} = 1 = \binom{n+1}{n+1}$$

$$1 \leq k \leq n : \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Nach I.V. werden 2 ganze Zahlen addiert, die eine ganze Zahl ergeben.

1.5.8 Bernoullische Ungleichung

Für $n \in \mathbb{N}$ und $x \geq -1$ gilt:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

Gleichheit gilt genau in folgenden Fällen: $n = 1$, $x \geq -1$, bzw. $n > 1$, $x = 0$

Beweis:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \underset{\substack{\geq \\ \text{falls } x \geq 0}}{\geq} \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} x^k = 1+nx$$

Induktionsbeweis für $x \geq -1$:

$$\begin{aligned} n = 1 : \quad (1+x)^1 &= 1+1x \\ n \mapsto n+1 : \quad (1+x)^{n+1} &= \underbrace{(1+x)}_{\geq 0} \underbrace{(1+x)^n}_{\geq 1+nx} \\ &\geq (1+x)(1+nx) \\ &= 1+nx+x+\underbrace{nx^2}_{\geq 0} \\ &\geq 1+(n+1)x \end{aligned}$$

1.6 Wurzeln

1.6.1 Beispiel

Für $r \in \mathbb{Q}$ ist $r^2 \neq 2$.

Beweis: Annahme: $r = \frac{m}{n}$ erfüllt $r^2 = 2$ (m, n ohne gemeinsamen Teiler, $m, n \in \mathbb{N}$). Es ist dann $m^2 = 2n^2$, also ist $m = 2p$, m ist gerade.

$\Rightarrow 4p^2 = 2n^2 \Rightarrow 2p^2 = n^2 \Rightarrow n = 2q$ ist gerade. Widerspruch!

1.6.2 Satz

Zu jedem $a \geq 0$, $a \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gibt es genau ein $\xi \in \mathbb{R}$, $\xi \geq 0$ mit $\xi^n = a$.

Schreibweise: $\xi = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

Beweis der Eindeutigkeit: Sei $0 \leq x < y \Rightarrow x^2 < y^2$, mit Induktion $x^n < y^n$, d. h. $x^n = a$ und $y^n = a$ unmöglich.

Beweis der Existenz: Für $a = 0, \xi = 0 \implies$ o.k.

Ab jetzt sei $a > 0$. Sei $M = \{x : x \geq 0, x^n \leq a\}$.

$M \neq \emptyset$, da $0 \in M$. Außerdem ist M nach oben beschränkt durch $s = a + 1$, denn für $x > s = a + 1$ gilt: $x^n > (a + 1)^n > a$, d. h. $x \notin M$.

Behauptung: $\xi = \sup M$. Zeige $\xi^n = a$.

Beweis: Sei $1 > \varepsilon > 0$ beliebig. Dann existiert ein $x \in M, x > \xi - \varepsilon$
 $|a - \xi^n| < \varepsilon(s + 1)^n \implies a = \xi^n$.

1. $1 > \varepsilon > 0$ beliebig.

Dann existiert ein $x \in M, x > \xi - \varepsilon$

$$\begin{aligned} \xi^n < (x + \varepsilon)^n &= \underbrace{x^n}_{\leq a} + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} \varepsilon^j x^{n-j} \\ &\leq a + \varepsilon \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} s^{n-1} \\ &< a + \varepsilon(s + 1)^n \\ \implies \xi^n - a &\leq \varepsilon(s + 1)^n \end{aligned}$$

2. $1 > \varepsilon > 0$ beliebig: $x = \xi + \varepsilon \notin M, \xi + \varepsilon > 0$

$$\implies a < (\xi + \varepsilon)^n \leq \dots \leq \xi^n + \varepsilon(s + 1)$$

$$\implies a - \xi^n \leq \varepsilon(s - 1)^n$$

Aus 1.) und 2.) folgt: $|\xi^n - a| \leq \varepsilon(s + 1)^n, \varepsilon > 0$ beliebig
 $\implies |\xi^n - a| \leq 0$, also $\xi^n = a$.

1.6.3 Fundamentaler Schluß der Analysis

Ist $b \in \mathbb{R}$ und gilt für jedes (hinreichend kleine) $\varepsilon: b \leq \varepsilon \implies b \leq 0$

Beweis: indirekt, Annahme $b > 0$: Wähle $\varepsilon \leq \frac{b}{2}, \varepsilon > 0: b \leq \varepsilon \leq \frac{\varepsilon}{2}$ W!

1.6.4 Bemerkung

$\mathbb{Q}$ ist nicht vollständig

Beweis: Wenn $\mathbb{Q}$ vollständig wäre, so ex. $\xi = \sup\{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0, x^2 \leq 2\}$ in $\mathbb{Q}$. $\implies$ wie oben $\xi^2 = 2, \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Widerspruch!

1.6.5 Nachtrag

Jedes Intervall (a, b) enthält ein $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Beweis: (a, b) enthält $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}, r_1 < r_2$.

$(\sqrt{2} \cdot r_1, \sqrt{2} \cdot r_2)$ enthält $r \in \mathbb{Q}$,

d. h. $\sqrt{2} \cdot r_1 < r < \sqrt{2} \cdot r_2 : a < r_1 < \frac{r}{\sqrt{2}} = s < r_2 < b$

$\implies s \in (a, b), s = \frac{r}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

1.6.6 Allgemeine Potenz

Sei $a > 0, r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Dann gilt: $a^r := \sqrt[q]{a^p}$. Diese Definition ist unabhängig von der Darstellung $r = \frac{p}{q}$

Beweis:

Sei $\xi = \sqrt[n]{a}$.

Dann ist

$$(\xi^n)^m = a^m$$

und

$$\xi^{nm} = (\xi^m)^n = ((\sqrt[n]{a})^m)^n$$

also gilt:

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Setze $r = \frac{p}{q} = \frac{m}{n}$, $m = kp$, $n = kq$.

Dann ist

$$(\sqrt[kq]{a})^{kp} = \sqrt[kq]{a^{kp}} = \sqrt[q]{a^p} = a^r$$

$$a^0 = 1$$

$$a^r = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p, \text{ falls } \frac{q}{p} = r, q \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{Z}$$

1.6.7 Regeln für Potenzen

Seien $a, b > 0$, $r, s \in \mathbb{Q}$. Dann gilt:

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}, \quad a^r b^r = (ab)^r$$

1.6.8 Ungleichung zwischen dem arithmetischen und geometrischen Mittel (AGM)

Sind $a_1, \dots, a_n \geq 0$, so gilt

$$\underbrace{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}}_{\text{geometrisches}} \leq \underbrace{\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}}_{\text{arithmetisches}}$$

Mittel

„=“ genau dann, wenn $a_1 = \dots = a_n$ ist.

Beweis: für $a_j = 0 \Rightarrow$ o.k.

Seien jetzt alle $a_j > 0$, $a = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} > 0$

$$\alpha_j = \frac{a_j}{a} : \alpha_1 + \dots + \alpha_n = n$$

Gilt $\alpha_1 \dots \alpha_n \leq 1$?

1.6.9 Hilfssatz

Sind $\alpha_1, \dots, \alpha_n > 0$ mit $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = n$,

so gilt: $\alpha_1 \dots \alpha_n \leq 1$ und „=“ genau dann, wenn $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$

Beweis:

- $n = 2$: $\alpha_1 = 1 - s \leq 1$
 $\alpha_2 = 1 + s \geq 1$
 $\alpha_1 \alpha_2 = (1 - s)(1 + s) = 1 - s^2 \leq 1$
 $= 1$, genau dann, wenn $s = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 1$

- $n \mapsto n+1$: $\alpha_1 + \dots + \alpha_n + \alpha_{n+1} = n+1$
 z. B. sei $\alpha_n = 1-s \leq 1$ und $\alpha_{n+1} = 1+t \geq 1$
 (sonst wird umnummeriert)
 $\beta_1 = \alpha_1, \dots, \beta_{n-1} = \alpha_{n-1}, \beta_n = \alpha_n + \alpha_{n+1} > 0$
 $\beta_1 + \dots + \beta_n = n+1-1$

$$\begin{aligned} \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n+1} &= \underbrace{\beta_1 \dots \beta_{n-1} \beta_n}_{\leq 1} \frac{\alpha_n \alpha_{n+1}}{\beta_n} \\ &\leq 1 \cdot \frac{(1-s)(1+t)}{1-s+t} \\ &= \frac{1-s+t-\overbrace{s \cdot t}^{\geq 0}}{1-s+t} \\ &\leq \frac{1-s+t}{1-s+t} = 1 \end{aligned}$$

„=“ genau dann, wenn $\beta_1 \dots \beta_n = 1$ und $st = 0$

$$\iff \beta_1 = \dots = \beta_n = 1 \text{ und } st = 0$$

$$\iff \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 1, \alpha_n + \alpha_{n+1} = 2 \text{ und } s = 0 \vee t = 0$$

$$s = 0: \alpha_n = 1, \alpha_{n+1} = 2 - 1 = 1$$

$$t = 0: \alpha_{n+1} = 1, \alpha_n = 2 - 1 = 1$$

Beweis (AGM) Fortsetzung:

$$a_1 \dots a_n = \alpha_1 \dots \alpha_n \underbrace{a^n}_{*} \leq a^n = \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right)^n$$

$$\iff \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$$

Gleichheit, wenn Gleichheit bei * $\iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 1$, d. h. alle $a_j = a$.

1.6.10 Beispiel

Sei $a > 0$, $r = \frac{p}{q} \in (0, 1)$

Dann gilt: $a^r \leq 1 + r(a-1)$ (z. B.: $a = 1+x$: $(1+x)^r \leq 1+rx$ für $0 < r < 1$)

Beweis:

$$\begin{aligned} a^r = \sqrt[q]{a^p} &= \sqrt[q]{\underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} \cdot \underbrace{1 \dots 1}_{q-p\text{-mal}}} \\ &\stackrel{\text{AGM}}{\leq} \frac{a + \dots + a + 1 + \dots + 1}{q} \\ &= \frac{pa + (q-p)}{q} = 1 + r(a-1) \end{aligned}$$

2 Folgen und Reihen¹

2.1 Konvergente Folgen

2.1.1 Definition: Folge

Eine Folge (a_n) ist eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$. Sie heißt *konvergent* gegen $a \in \mathbb{R}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit: $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$. Schreibweise: $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$) oder $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

2.1.2 Bemerkungen

- (a) Manchmal betrachtet man Folgen (a_n) , die für $n \geq p$ definiert sind, mit $p \in \mathbb{Z}$ fest.
- (b) Nicht konvergente Folgen heißen *divergent*.
- (c) Gilt $a_n \rightarrow 0$, ($n \rightarrow \infty$), so heißt (a_n) *Nullfolge*.
- (d) Gilt $a_n \rightarrow a$, ($n \rightarrow \infty$), so heißt a *Grenzwert* oder *Limes* der Folge (a_n) .
- (e) Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist eindeutig bestimmt.
- (f) Es gilt $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$ genau dann, wenn es eine Nullfolge (b_n) gibt mit $|a_n - a| \leq b_n$ für alle n .

Beweis:

- (e) Gelte $a_n \rightarrow a$, $a_n \rightarrow b$
Sei $\varepsilon > 0$: $\exists n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$ ($n \geq n_0$)
 $\exists n_0 : |a_n - b| < \varepsilon$ ($n \geq n_0$)
 $|a - b| = |(a - a_n) - (b - a_n)| \leq |a - a_n| + |b - a_n| < \varepsilon + \varepsilon \Rightarrow |a - b| < 2\varepsilon \Rightarrow a = b$
- (f) (Andeutung)
„ $\Rightarrow$ “: $b_n := |a_n - a|$, zeige $b_n \rightarrow 0$.
„ $\Leftarrow$ “: $|a_n - a| \leq b_n$ ($n \rightarrow \infty$)

2.1.3 Rechenregeln für konvergente Folgen

- (1) Der Grenzwert ist eindeutig bestimmt.
- (2) Konvergente Folgen sind beschränkt, d. h. es existiert ein $k > 0$ mit $|a_n| \leq k$ für alle n . D. h. $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ ist beschränkt.
- (3) Aus $a_n \rightarrow a$ folgt $\lambda a_n \rightarrow \lambda a$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).
- (4) Aus $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ folgt $a_n + b_n \rightarrow a + b$.
- (5) Aus $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ folgt $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$.

---

¹Version 191 vom 13. Februar 2006

2 Folgen und Reihen

- (6) Aus $b_n \rightarrow b$, $b \neq 0$ folgt $b_n \neq 0$ für $n \geq p$ und $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}$.
- (7) Aus $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$, $b \neq 0$ folgt $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$.
- (8) Aus $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ folgt $a \leq b$.
- (9) Aus $a_n \leq b_n \leq c_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $a_n \rightarrow a$, $c_n \rightarrow a$ folgt $b_n \rightarrow a$.
- (10) Aus $a_n \rightarrow a > 0$ folgt $a_n^r \rightarrow a^r$ ($r \in \mathbf{Q}$)
 $[r \in \mathbb{N}: a \in \mathbb{R}$ beliebig; $r \in \mathbb{Z}: a \neq 0$ beliebig; $r > 0: a = 0, a_n \geq 0]$

Beweis:

(1) siehe oben unter (e)

(2) Gelte $a_n \rightarrow a$:

Zu $\varepsilon = 1$ ex. n_0 mit $|a_n - a| < \varepsilon = 1$,

$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|$ für $n \geq n_0$.

$|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_n|, |a| + 1\} =: k$ für alle $n \in \mathbb{N}$

(3) $\lambda = 0 \Rightarrow$: o. k.

$\lambda \neq 0$: Zu jedem $\varepsilon > 0$ ex. n_0 mit $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ für alle $n \geq n_0$.

$\Rightarrow |\lambda a_n - \lambda a| = |\lambda| \cdot |a_n - a| < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$,

d. h. $\lambda a_n \rightarrow \lambda a$.

(4) Gelte $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$:

Sei $\varepsilon > 0$: Dazu ex. n_0 mit $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ und $|b - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $n \geq n_0$.

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (a + b)| &= |(a_n - a) + (b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \text{ für alle } n \geq n_0 \end{aligned}$$

(5) Gelte $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$:

(a_n) und (b_n) sind beschränkt mit $|a_n| \leq A$, $|b_n| \leq B$ für alle n

$$\begin{aligned} |a_n \cdot b_n - a \cdot b| &= |(a_n - a)b_n + a(b_n - b)| \\ &\leq |b_n(a_n - a)| + |a(b_n - b)| \\ &\leq \underbrace{B \overbrace{|a_n - a|}^{\text{NF}}}_{\text{NF nach (3)}} + \underbrace{|a| \overbrace{|b_n - b|}^{\text{NF}}}_{\text{NF nach (3)}} \\ &\qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{NF nach (4)}} \end{aligned}$$

also: $a_n b_n \rightarrow ab$

(6) Gelte $b_n \rightarrow b$, $b \neq 0$:

Zu $\varepsilon = \frac{|b|}{2} > 0$ ex. ein p mit: $|b_n - b| < \varepsilon = \frac{|b|}{2}$ für $n \geq p$

$|b_n| = |(b_n - b) + b| \geq |b| - |b_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2} > 0$ für $n \geq p$

$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b_n b} \right| \leq \frac{|b - b_n|}{\frac{|b|}{2} |b|} = \frac{2}{|b|^2} |b - b_n| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

d. h. $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}$.

$$(7) \frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \underbrace{\frac{1}{b_n}}_{\text{def. für } n \geq p} \rightarrow a \cdot \frac{1}{b} \text{ nach (5) und (6)}$$

$$(8) \begin{aligned} & a_n < b_n \text{ für alle } n: \\ & \varepsilon > 0 : |a_n - a| < \varepsilon \quad (n \geq n_0) \\ & |b_n - b| < \varepsilon \quad (n \geq n_0) \\ & a - b = \underbrace{a - a_n}_{< \varepsilon} + \underbrace{a_n - b_n}_{\leq 0} + \underbrace{b_n - b}_{< \varepsilon} < 2\varepsilon \quad (n \geq n_0) \\ & \Rightarrow a - b \leq 0, a \leq b \end{aligned}$$

$$(9) \text{ („Sandwich-Theorem“)} \\ |c_n - a_n| = c_n - a_n = (c_n - a) - (a_n - a) = \text{Nullfolge} \\ |b_n - a_n| = b_n - a_n \leq c_n - a_n = \text{Nullfolge} \\ \Rightarrow b_n - a = \underbrace{b_n - a_n}_{\text{NF}} + \underbrace{a_n - a}_{\text{NF}} = \text{NF} \\ \Rightarrow b_n \rightarrow a$$

- (10) • Sei $r \in \mathbb{N}$: Induktion.
 $r = 1$: (o. k.: $a_n \rightarrow a$)
 $r \mapsto r + 1$: $a_n^{r+1} = a_n \cdot a_n^r \rightarrow a \cdot a^r = a^{r+1}$
- Sei $-r \in \mathbb{N}$ und $a \neq 0$:
 Dann existiert $a_n \neq 0$ für $n \geq p$
 $a_n^r = \frac{1}{a_n^{-r}} \xrightarrow{1.\text{Teil und (6)}} \frac{1}{a^{-r}} = a^r$.
 $r = 0$: $a_n^0 = 1 \rightarrow 1 = a^0$.
- $r = \frac{1}{q}$, $q \in \mathbb{N}$: $a > 0$, $a_n > 0$
 $\alpha_n = \sqrt[q]{a_n} = a_n^{\frac{1}{q}}$, $\alpha = \sqrt[q]{a}$

$$\begin{aligned} a_n - a &= \alpha_n^q - \alpha^q \\ &= |(\alpha_n - \alpha)(\alpha_n^{q-1} + \alpha_n^{q-2}\alpha + \dots + \alpha^{q-1})| \\ &\geq |\alpha_n - \alpha| \cdot \alpha^{q-1} \\ \left| a_n^{\frac{1}{q}} - a^{\frac{1}{q}} \right| &\leq \frac{|a_n - a|}{\alpha^{q-1}} \end{aligned}$$

- $r = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$
 α , α_n werden wie vorher definiert.

$$a_n^r - a^r = a_n^{\frac{p}{q}} - a^{\frac{p}{q}} = \alpha_n^p - \alpha^p$$

Da $\alpha_n \rightarrow \alpha$ folgt $\alpha_n^p \rightarrow \alpha^p$ (siehe oben, $r \in \mathbb{N}$)
 d. h.: $a_n^r \rightarrow a^r$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow a_n^r \rightarrow a^r \text{ für } r \in \mathbf{Q}, a, a_n > 0 \\ & r > 0, a = 0, a_n \geq 0 : \\ & \text{Zu } \varepsilon > 0 \text{ existiert ein } n_0 : |a_n| < \varepsilon^{\frac{1}{r}} \quad (n \geq n_0) \\ & |a_n^r| < (\varepsilon^{\frac{1}{r}})^r = \varepsilon \quad (n \geq n_0), \text{ d. h. } a_n^r \rightarrow 0 = 0^r \end{aligned}$$

2.1.4 Beispiele

1. Beh.: $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$ Beweis: $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n, \quad h_n \geq 0$

$$n = (1 + h_n)^n \stackrel{\text{bin. Satz}}{=} \underbrace{1 + \binom{n}{1}h_n + \binom{n}{2}h_n^2 + \cdots + \binom{n}{n}h_n^n}_{\text{alle Terme} \geq 0}$$

$$\geq 1 + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2$$

$$n \geq 2: h_n^2 \leq \frac{n-1}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$$

$$0 \leftarrow 0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \rightarrow 0 \quad n \geq 2, n = 1$$

$$\Rightarrow h_n \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{n} = 1 + h_n \rightarrow 1 + 0 = 1$$

2. Beh.: $a^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$, falls $|a| < 1$

$$\text{Beweis: } |a| = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{h} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow |a|^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Gilt $a^n \rightarrow 0$? Allgemeiner (Satz (11)): Wenn $b_n \rightarrow b \Rightarrow |b_n| \rightarrow |b|$

$$\text{Beweis: } ||b_n| - |b|| \leq |b_n - b| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\text{Umkehrung gilt für } b = 0: |b_n - b| = |b_n - 0| = |b_n| \rightarrow 0$$

3. Beh.: $a_n = \sqrt[n]{a} \rightarrow 1$, falls $a > 0$ Beweis: Wähle m so, daß $a < m$ und $\frac{1}{a} < m$.

$$\frac{1}{m} < a < m : n \geq m \Rightarrow \frac{1}{n} < a < n \text{ gilt nur für } n \geq m$$

$$\Rightarrow 1 \leftarrow \sqrt[n]{\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{a} \rightarrow 1$$

4.

$$n \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right) = n \frac{\sqrt{n^2 + 1} - n}{1} \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 1} + n}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

$$= n \frac{n^2 + 1 - n^2}{\sqrt{n^2 + 1} + n}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

2.2 Monotone Folgen

2.2.1 Definition

Eine Folge (a_n) heißt *monoton wachsend* [fallend], wenn $a_n \leq a_{n+1}$ [$a_n \geq a_{n+1}$]Eine Folge (a_n) heißt *streng wachsend* [fallend], wenn $a_n < a_{n+1}$ [$a_n > a_{n+1}$]kurz: $a_n \uparrow, a_n \downarrow$

2.2.2 Monotoniekriterium

Ist (a_n) monoton (wachsend oder fallend) und beschränkt, so ist sie auch konvergent. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} & \text{falls } a_n \uparrow \\ \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\} & \text{falls } a_n \downarrow \end{cases}$$

Beweis: Für $a_n \uparrow$. Sei $a = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$

Sei $\varepsilon > 0$: Damit existiert n_0 mit $a_{n_0} > a - \varepsilon$

Für $n \geq n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq a$

$|a_n - a| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$

d. h. $a_n \rightarrow a$.

Bemerkung: $a_n \uparrow [a_n \downarrow] \Rightarrow a_n \geq a_1 [a_n \leq a_1]$

Eine monotone Folge ist einseitig beschränkt.

2.2.3 Aufgabe

Sei $b_0 > a_0 > 0$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$ und $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$

Zeige: $a_n \uparrow$, $b_n \downarrow$, $a_n < b_n$ und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M(a_0, b_0)$$

2.2.4 3 Beispiele

1. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = 2.718\dots$

Zeige mehr: $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \geq 1$

$$b_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} \quad n \geq 2$$

$$a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n$$

$$a_n \uparrow, b_n \downarrow, a_1 \leq a_n \leq b_1, a_1 \leq b_n \leq b_1$$

Beweis:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{n\text{-mal}} \cdot 1 \\ &\stackrel{\text{AGM}}{\leq} \left(\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(\frac{n+1 + n \frac{1}{n}}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_n} &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot 1 \\ &\stackrel{\text{AGM}}{\leq} \left(\frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \left(\frac{n+1-1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= \frac{1}{b_{n+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n \geq 2: \frac{a_n}{b_n} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n < 1 \\ \Rightarrow a_n &< b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \text{ existieren} \\ \frac{a_n}{b_n} = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) > 1 - \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n} \\ \Rightarrow \underbrace{b_n \left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow b} < a_n < \underbrace{b_n}_{\rightarrow b} \\ \Rightarrow a_n &\rightarrow b \end{aligned}$$

2. Newton-Verfahren zur Berechnung der Wurzel $\sqrt[p]{a}$, $a > 0$, $p \geq 2$ ganz.

$$a_0 > 0 \text{ beliebig, } a_{n+1} = \frac{(p-1)a_n^p + a}{pa_n^{p-1}}$$

Behauptung: $a_n \rightarrow \sqrt[p]{a}$

Zeige mehr:

- 1) $a_n \geq 0$ (Aufgabe für uns)
- 2) $a_n^p \geq a$ für $n \geq 1$
- 3) $a_n \downarrow$ und $a_n > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ existiert

Beweis:

2)

$$\begin{aligned} a_{n+1}^p &= \left(\left(1 - \frac{1}{p}\right) a_n + \frac{a}{pa_n^{p-1}} \right)^p \\ &= a_n^p \left(1 - \frac{1}{p} \left(1 - \frac{a}{a_n^p}\right) \right)^p \\ &\stackrel{\text{Bernoulli}}{\geq} \left(1 - p \cdot \frac{1}{p} \left(1 - \frac{a}{a_n^p}\right) \right) a_n^p \\ &= a_n^p \frac{a}{a_n^p} = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \ a_{n+1} - a_n &= \frac{(p-1)a_n^p + a}{pa_n^{p-1}} - a_n = \frac{\overbrace{a - a_n^p}^{\leq 0}}{pa_n^{p-1}} \leq 0 \\ \text{d. h.: } a_{n+1} &\leq a_n \end{aligned}$$

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ existiert} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{(p-1) a_n^p}^{\rightarrow \alpha^p} + a}{\underbrace{p a_n^{p-1}}_{\rightarrow \alpha^{p-1}}}$$

$$\alpha = \frac{(p-1)\alpha^p + a}{p\alpha^{p-1}} \iff -\alpha^p + a = 0 \iff \alpha = \sqrt[p]{a}, \text{ da } \alpha > 0$$

3. $0 < a_0 < \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$
 Zeige: $0 < a_n < \frac{1}{2}$
 $n = 0$: o. k.

$$n \mapsto n+1 : a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4} \quad \left(\geq \frac{1}{4} > 0 \right)$$

$$\leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$a_{n+1} - a_n = a_n^2 + \frac{1}{4} - (a_{n-1}^2 + \frac{1}{4})$$

$$= a_n^2 - a_{n-1}^2$$

$$= (a_n - a_{n-1}) \underbrace{(a_n + a_{n-1})}_{> 0}$$

(a_n) ist monoton. Für uns die Aufgabe: in welche Richtung $\uparrow \downarrow$?

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 + \frac{1}{4} = \alpha^2 + \frac{1}{4}$$

$$\iff \alpha = \alpha^2 + \frac{1}{4}$$

$$\iff (\alpha - \frac{1}{2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

2.3 Teilfolgen

2.3.1 Definition

Sei (a_n) eine Folge. Ist (n_k) eine streng monoton wachsende Folge in $\mathbb{N}$ ($n_k \in \mathbb{N}$, $n_k < n_{k+1}$), dann heißt (a_{n_k}) eine *Teilfolge* von (a_n) ($k \rightarrow a_{n_k}$). $a \in \mathbb{R}$ heißt Häufungswert von (a_n) , wenn es eine Teilfolge (a_{n_k}) gibt mit $a_{n_k} \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$.

2.3.2 Beispiele

1. $a_n \rightarrow a$ konvergiert, a ist einziger Häufungswert:
 $a_{n_k} \rightarrow a$ für jede (n_k) .

Beweis: $\varepsilon > 0 : |a_n - a| < \varepsilon$ für $n \geq m_0$

Wähle k_0 so, daß $n_{k_0} \geq m_0$:

$$k \geq k_0 \Rightarrow n_k \geq n_{k_0} \geq m_0 : |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

2. $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$
 $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty)$
 $a_{2k+1} = -1 + \frac{1}{2k+1} \rightarrow -1 \quad (k \rightarrow \infty)$
 Die Häufungswerte sind $-1, 1$.

- 3.

$$1 < a_0 \leq 2 : a_{n+1} = \begin{cases} 4a_n & \text{falls } a_n \leq 4 \\ \frac{1}{2}a_n & \text{falls } a_n > 4 \end{cases}$$

$(a_0, 4a_0, 2a_0, 8a_0, 4a_0, \dots)$
 Häufungswerte sind $2a_0, 4a_0, 8a_0$

2.3.3 Satz von Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge (a_n) besitzt mindestens eine konvergente Teilfolge, d. h. mindestens einen Häufungswert.

(Zu-)Satz: (a_n) enthält eine monotone Teilfolge, und besitzt einen größten und einen kleinsten Häufungswert.

Beweis: (von Polya)

$m \in \mathbb{N}$ heißt Gipfelpunkt, wenn für alle $n > m$ $a_n < a_m$ ist.

1. Fall: Es gibt unendlich viele Gipfelpunkte $m_1 < m_2 < \dots$

(a_{m_k}) ist streng monoton fallend, beschränkt.

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{m_k} =: \bar{a}$ existiert

Sei (a_{n_k}) eine konvergente Teilfolge mit $a_{n_k} \rightarrow a$

Für $n_j \geq m_1$ existiert dann m_{k_j} mit $m_{k_j} \leq n_j < m_{k_j+1}$.

Damit gilt: $a \leftarrow a_{n_j} \leq a_{m_{k_j}} \rightarrow \bar{a}$

$\Rightarrow a \leq \bar{a}$ $\bar{a}$ ist größter Häufungswert.

2. Fall: Es gibt nur endlich viele (oder gar keine) Gipfelpunkte.

$\Rightarrow \exists$ Gipfelpunkt m_1 mit $m_1 >$ alle Gipfelpunkte.

Wähle $m_2 > m_1$ minimal aus, so daß $a_{m_2} \geq a_{m_1}$ ist. m_2 ex., da m_1 kein Gipfelpunkt ist.

Wähle $m_3 > m_2$ minimal aus, so daß $a_{m_3} \geq a_{m_2}$ ist. m_3 ex., da m_2 kein Gipfelpunkt ist.

$\vdots$ usw.

$(a_{m_k}) \uparrow$ und ist beschränkt.

$\Rightarrow (a_{m_k})$ ist konvergent, also $a_{m_k} \rightarrow \bar{a}$ (Häufungswert).

Sei a irgendein Häufungswert mit $a_{n_j} \rightarrow a$ für $(j \rightarrow \infty)$. Zu j mit $n_j > m_1$ ex. ein $k_j : m_{k_j} \leq n_j < m_{k_j+1}$

$a \leftarrow a_{n_j} \leq a_{m_{k_j+1}} \rightarrow \bar{a}$

$a < \bar{a}$ $\bar{a}$ ist größter Häufungswert

Beweis für den kleinsten Häufungswert: selber machen über $(-a_n)$.

2.3.4 Cauchysches Konvergenzkriterium

Eine Folge (a_n) heißt *Cauchyfolge*, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt, so daß für alle $n > m \geq n_0$ gilt: $|a_n - a_m| < \varepsilon$. Jede Cauchyfolge in $\mathbb{R}$ ist auch eine konvergente Folge, und umgekehrt.

Beweis:

- „ $\Leftarrow$ “: Sei $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$)
 $\varepsilon > 0$: es existiert $n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n > n_0$
 $n > m \geq n_0 : |a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$
- „ $\Rightarrow$ “: (a_n) Cauchyfolge.
 $\varepsilon = 1 : |a_n - a_m| < 1$ für $n > m \geq n_0$
 $\Rightarrow |a_n| = |(a_n - a_{n_0}) + a_{n_0}| \leq 1 + |a_{n_0}|$ für $n \geq n_0$
 (a_n) ist beschränkt.
 (a_n) hat konvergente Teilfolge, $a_{n_k} \rightarrow a$.

$\varepsilon > 0$: Dann ex. k_0 : $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ für $k \geq k_0$

Es ex. n_0 : $|a_n - a_m| < \varepsilon$ für $n > m \geq n_0$

$|a_n - a| = |a_n - a_{n_k} + a_{n_k} + a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} + a| < 2\varepsilon$
für $n \geq n_0, k \geq k_0, n_k \geq n_0$

$\Rightarrow a_n \rightarrow a$

2.3.5 Definition: Limes superior, Limes inferior

Sei (a_n) eine beschränkte Folge.

Der größte Häufungswert heißt *oberer Limes* oder *limes superior*,

kurz: $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ oder $\overline{\lim} a_n$.

Der kleinste Häufungswert heißt *unterer Limes* oder *limes inferior*,

kurz: $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ oder $\underline{\lim} a_n$.

2.3.6 Bemerkungen

(a) (a_n) ist konvergent $\iff \overline{\lim} a_n = \underline{\lim} a_n$.

(b) $\overline{\lim} a_n = \bar{a}$ ist charakterisiert durch:

Für jedes $\varepsilon > 0$ gilt:

(i) $a_n > \bar{a} + \varepsilon$ gilt nur für endlich viele n .

(ii) $a_n > \bar{a} - \varepsilon$ gilt für unendlich viele n .

(c) $\underline{\lim} a_n = \underline{a}$ ist charakterisiert durch:

für jedes $\varepsilon > 0$ gilt:

(i) $a_n < \underline{a} - \varepsilon$ gilt nur für endlich viele n .

(ii) $a_n < \underline{a} + \varepsilon$ gilt für unendlich viele n .

Beweis: (von (b))

„ $\Leftarrow$ “: Sei $\bar{a} = \overline{\lim} a_n$.

$\bar{a}$ ist der größte Häufungswert von (a_n) , d. h. es gibt keinen größeren Häufungswert, d. h. es gilt (i).

Da $\bar{a}$ Häufungswert ist, existiert (a_{n_k}) mit $a_{n_k} \rightarrow \bar{a}$.

Zu $\varepsilon > 0$ ex. k_0 mit $|\bar{a} - a_{n_k}| < \varepsilon$ für $k \geq k_0$.

„ $\Rightarrow$ “: $\bar{a} \in \mathbb{R}$ erfülle (i) und (ii).

Sei $\varepsilon > 0$:

1. $\Leftarrow$ kein Häufungswert von (a_n) ist $\geq \bar{a} + \varepsilon$.

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, ist kein Häufungswert $> \bar{a}$, also sind alle $\leq \bar{a}$.

2. Für unendlich viele n gilt $a_n > \bar{a} - \varepsilon$.

Es gibt also einen Häufungswert $\geq \bar{a} - \varepsilon$.

Also gibt es einen Häufungswert $\geq \bar{a}$.

Aus (i) und (ii) folgt: $\bar{a} = \overline{\lim} a_n$.

2.3.7 Beispiel

Sei $a_n = \sqrt[n]{2^n + 3^{n+(-1)^n n}}$. Setze $n = 2m$. Dann gilt

$$\begin{aligned} a_{2m} &= \sqrt[2m]{2^{2m} + 3^{2m+2m}} \\ &= \sqrt[2m]{2^{2m} + 3^{4m}} \\ &= 9 \sqrt[2m]{1 + \underbrace{\left(\frac{2}{9}\right)^{2m}}_{\rightarrow 0}} \rightarrow 9 \\ &\quad \underbrace{\sqrt[2m]{\underbrace{\phantom{1 + \left(\frac{2}{9}\right)^{2m}}}_{\rightarrow 1}}}_{\rightarrow 1} \end{aligned}$$

für $n = 2m + 1$ gilt:

$$\begin{aligned} a_{2m+1} &= \sqrt[2m+1]{2^{2m+1} + 3^0} \\ &= \sqrt[2m+1]{2^{2m+1} + 1} \\ &= 2 \sqrt[2m+1]{1 + \frac{1}{2^{2m+1}}} \rightarrow 2 \end{aligned}$$

Es ist $\overline{\lim} a_n = 9$, $\underline{\lim} a_n = 2$ und es existieren keine anderen Häufungswerte.

2.3.8 Rechenregeln

(1) Aus $a_n \leq b_n$ für alle n folgt: $\underline{\lim} a_n \leq \underline{\lim} b_n$ und $\overline{\lim} a_n \leq \overline{\lim} b_n$

(2)

$$\begin{aligned} \underline{\lim} a_n + \underline{\lim} b_n &\stackrel{(i)}{\leq} \underline{\lim}(a_n + b_n) \\ &\leq \overline{\lim}(a_n + b_n) \\ &\stackrel{(ii)}{\leq} \overline{\lim} a_n + \overline{\lim} b_n \end{aligned}$$

Wenn eine der beiden Folgen konvergiert, so gilt „ $=$ “ in (i) und (ii)

(3) $\underline{\lim}(-a_n) = -\overline{\lim} a_n$ und $\overline{\lim}(-a_n) = -\underline{\lim} a_n$

Beweis: als Aufgabe.

2.3.9 Ergänzungen

Sei (a_n) eine beliebige Folge.

(a) $a_n \rightarrow \infty$ [$a_n \rightarrow -\infty$] oder $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ [$-\infty$] bedeutet folgendes:

Zu jedem $K > 0$ gibt es ein n_0 mit $a_n > K$ [$a_n < -K$] für alle $n \geq n_0$. (Man sagt: (a_n) *divergiert* gegen ∞ .)

(b) ∞ [$-\infty$] ist Häufungswert von (a_n) , wenn es eine Teilfolge (a_{n_k}) gibt, die mit $a_{n_k} \rightarrow \infty$ [$-\infty$] divergiert.

- (c) $\overline{\lim} a_n = \infty [-\infty]$, wenn $\infty [-\infty]$ Häufungswert ist, d. h. wenn die Folge nicht nach oben [unten] beschränkt ist.
- (d) $\overline{\lim} a_n = -\infty$, wenn $a_n \rightarrow -\infty$, beziehungsweise $\underline{\lim} a_n = +\infty$, wenn $a_n \rightarrow +\infty$.

2.3.10 Satz

Sei (a_n) eine beschränkte Folge, $\alpha_n := \sup\{a_m : m \geq n\}$, $\beta_n := \inf\{a_m : m \geq n\}$.
Dann gilt folgendes: $\alpha_n \downarrow, \beta_n \uparrow$ beschränkt, und

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &= \overline{\lim} a_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n &= \underline{\lim} a_n\end{aligned}$$

Beweis: für (α_n) : Sei $\bar{a} = \overline{\lim} a_n$, $M_n = \{a_m : m \geq n\}$

$$M_{n+1} \subseteq M_n \Rightarrow \alpha_{n+1} \leq \alpha_n$$

es gibt $K : |a_n| \leq K$ für alle n , also insbesondere $a_n \leq K$ für alle n , K ist obere Schranke für $M_n, \alpha_n \leq K$

(genauso: $+a_n \geq -K$, also $\alpha_n \geq -K$)

$$\begin{aligned}a_n \in M_n &\Rightarrow a_n \leq \alpha_n \\ &\Rightarrow \bar{a} \leq \overline{\lim} \alpha_n \\ &\Rightarrow \boxed{\bar{a} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n}\end{aligned}$$

Sei $\varepsilon > 0$: Dann gilt für alle $n \geq n_0 : a_n < \bar{a} + \varepsilon$

$$\begin{aligned}n \geq n_0 &:\Rightarrow \alpha_n \leq \bar{a} + \varepsilon \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq \bar{a} + \varepsilon \\ &\Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \leq \bar{a}}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \overline{\lim} a_n.$$

2.4 Unendliche Reihen

2.4.1 Definition

Sei $(a_n)_{n \geq 0}$ eine Folge und $s_n := \sum_{k=0}^n a_k$.

Die Folge (s_n) heißt *unendliche Reihe*. Schreibweise: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$

Die unendliche Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt *konvergent*, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existiert. s heißt dann *Wert* der

Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$.

s_n heißt n -te Partialsumme von $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.

Nicht konvergente Reihen nennt man *divergent*.

2.4.2 Beispiel: Die geometrische Reihe

Die geometrische Reihe ist $\sum_{k=0}^{\infty} a^k$ ($a \in \mathbb{R}$ gegeben).

für $|a| < 1$ ist $\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$, für $|a| \geq 1$ ist diese Reihe divergent.

Beweis: Es ist

$$\begin{aligned} s_n &= 1 + a + a^2 + \dots + a^n \\ &= 1 + a(1 + a + \dots + a^{n-1} + a^n - a^n) \\ &= 1 + as_n - a^{n+1} \\ \Rightarrow (1-a)s_n &= 1 - a^{n+1} \\ \Rightarrow s_n &= \frac{1 - a^{n+1}}{1-a}, \quad a \neq 1 \\ s_n &= n + 1, \quad a = 1 \end{aligned}$$

$|a| < 1 : a^{n+1} \rightarrow 0, s_n \rightarrow \frac{1}{1-a}$

$|a| > 1 : |a|^{n+1} \rightarrow \infty, (s_n)$ nicht konvergent,

auch für $a = 1$ und $a = -1$ (bei $a = -1$ ist $s_0 = 1, s_1 = 0, s_2 = 1$).

2.4.3 Beispiel: Teleskopsumme

$b_n \rightarrow 0, \quad a_n = b_n - b_{n+1}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = b_0 = \sum_{n=0}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) \quad (\text{„Teleskopsumme“})$$

Beweis:

$$\begin{aligned} s_n &= (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \dots + (b_{n-1} - b_n) + (b_n - b_{n+1}) \\ &= b_0 - b_{n+1} \rightarrow b_0 \end{aligned}$$

Beispiel für eine Teleskopsumme:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} : \quad \frac{1}{n^2 - n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{0+1} = 1$$

2.4.4 Beispiel: erweiterte Teleskopsumme

Sei $b_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ und $p \in \mathbb{N}$ fest.

$a_n = b_n - b_{n+p}$. Dann gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = b_0 + b_1 + \dots + b_{p-1}$.

Beweis:

$$\begin{aligned}
s_n &= b_0 - b_p + b_1 - b_{p+1} + \cdots + b_n + b_{n+p} \\
&= b_0 + b_1 + \cdots + b_{p-1} - (b_{n+1} + \cdots + b_{n+p}) \\
&\rightarrow b_0 + b_1 + \cdots + b_{p-1}
\end{aligned}$$

Beispiel für eine erweiterte Teleskopsumme

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+3)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{2}(b_0 + b_1) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Hier ist $b_n = \frac{1}{n+1}$ und $p = 2$ **2.4.5 Satz über den Reihenrest**Ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergent, so gilt: $a_n \rightarrow 0$ und $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. r_n heißt *Reihenrest*.**Beweis:**

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow s - s = 0$$

$$r_n = s - s_n \rightarrow s - s = 0.$$

2.4.6 Cauchy Kriterium Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert genau dann, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt mit: $\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| = |s_n - s_m| < \varepsilon$ für alle $n > m \geq n_0$.**Beweis:** $s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ (s_n) konvergiert $\iff$ zu jedem $\varepsilon > 0$ ex. ein n_0 mit

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| = |s_n - s_m| < \varepsilon$$

für alle $n > m \geq n_0$ **2.4.7 Beispiel: Die harmonische Reihe**Die harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert.**Beweis:**

$$\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} = \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{2m} > m \frac{1}{2m} = \frac{1}{2}$$

Da es für $\varepsilon < 1/2$ kein n_0 mehr gibt $\Rightarrow$ Divergenz nach Cauchy Kriterium.

2.4.8 Hilfssatz: Abelsche partielle Summation

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=m}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k, \quad (B_k = \sum_{j=m}^k b_j)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n a_k b_k &= \sum_{k=m}^n a_k (B_k - B_{k-1}) \\ &= \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m}^n a_k B_{k-1} \\ &= \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} a_{k+1} B_k \\ &= a_n B_n + \sum_{k=m}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k - a_m \underbrace{B_{m-1}}_{=0} \end{aligned}$$

2.4.9 Dirichlet-Kriterium

Es sei (a_k) eine monoton fallende Nullfolge, (b_k) eine Folge mit beschränkten Partialsummen (d. h. $\left| \sum_{k=0}^n b_k \right| \leq B$ für alle n). Dann konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k$.

Beweis: Setze

$$B_k = \sum_{j=0}^k b_j.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m+1}^n a_k b_k \right| &= \left| \underbrace{a_n}_{\geq 0} (B_n - B_m) + \sum_{k=m+1}^{n-1} \underbrace{(a_k - a_{k+1})}_{\geq 0} (B_k - B_m) \right| \\ &\leq |(B_n - B_m)| a_n + \sum_{k=m+1}^{n-1} |B_k - B_m| (a_k - a_{k+1}) \\ &\leq 2B \left(a_n + \sum_{k=m+1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) \right) \\ &= 2B(a_n + a_{m+1} - a_n) \\ &= 2B a_{m+1} \end{aligned}$$

$\varepsilon > 0$: Man wähle n_0 so, daß $a_{m+1} < \frac{\varepsilon}{2B}$ für alle $m \geq n_0$

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k b_k \right| < 2B \frac{\varepsilon}{2B} = \varepsilon \quad \text{für } n > m \geq n_0$$

$\Rightarrow$ konvergent nach Cauchy Kriterium.

2.4.10 Leibniz-Kriterium

Es sei (a_k) eine monoton fallende Nullfolge. Dann konvergiert die alternierende Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$.
Ihr Wert liegt zwischen s_{2n} und s_{2n+1} für alle n .

Beweis: Setze $b_k = (-1)^k$ und $B_k = \sum_{j=0}^k b_j$. Es ist $B_k = 0$ oder $B_k = 1$, d. h. B_k ist beschränkt, also konvergiert

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k.$$

$$\begin{aligned} s_{2n+2} - s_{2n} &= (-1)^{2n+2} a_{2n+2} + (-1)^{2n+1} a_{2n+1} \\ &= a_{2n+2} - a_{2n+1} \leq 0 \quad s_{2n} \downarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{2n+1} &= s_{2n} + (-1)^{2n+1} a_{2n+1} \\ &= s_{2n} - a_{2n+1} \leq s_{2n} \end{aligned}$$

$$s_1 \leq s_3 \leq s_5 \leq \dots \leq s \leq \dots \leq s_4 \leq s_2 \leq s_0$$

2.4.11 Die alternierende harmonische Reihe (1)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \quad \text{konvergiert nach Leibnizkriterium.}$$

$$\begin{aligned} \text{z. B. } s_{100} &= 0,688\dots \\ s_{101} &= 0,698\dots \end{aligned}$$

2.4.12 Rechenregeln für konvergente Reihen

Sind $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ konvergent, $c \in \mathbb{R}$, so gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (ca_k) = c \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

Beweis: Dies hier sind Folgen von Partialsummen

2.4.13 Die alternierende harmonische Reihe (2)

$$1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + 1/7 - 1/8 + 1/9 - + \dots$$

Reihenwert s : $s < 1 - 1/2 + 1/3 = 5/6$

Umordnung von $\frac{(-1)^{k-1}}{k}$: $1 + 1/3 - 1/2 + 1/5 + 1/7 - 1/4 + 1/9 + 1/11 - 1/6 + \dots$ hier: $s > 5/6$,
d. h. Umordnungen bei Reihen können den Reihenwert verändern

2.5 Absolute Konvergenz

2.5.1 Definition

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt *absolut konvergent*, wenn die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Beispiel:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \quad \text{konvergent, aber nicht absolut}$$

2.5.2 Satz

Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent

Beweis:

$$\varepsilon > 0. \quad \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |a_k| < \varepsilon \quad \text{für alle } n > m \geq n_0,$$

also Konvergenz nach Cauchy Kriterium

2.5.3 Majorantenkriterium

Gilt $|a_k| < c_k$ für alle k , und ist $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ konvergent, dann ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent. (Man nennt $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ eine *Majorante* für $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$!)

Beweis:

$$\sum_{k=0}^n |a_k| \leq \sum_{k=0}^n c_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} c_k$$

Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ konvergiert:

$$a_k = \frac{1}{k^2} \quad a_k = \frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = c_k \quad (k \geq 2)$$

$$a_1 = 1 = c_1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k = 1 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 = 2$$

2.5.4 Wurzelkriterium

Gilt $\lim \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, so konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut.

Beweis: Wähle q so, daß $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} < q < 1$ ist. Dann ist für $n \geq n_0$

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq q \quad \text{für } n \geq n_0.$$

Damit ist $|a_n| \leq q^n$ für $n \geq n_0$ bzw.

$$|a_n| \leq C \cdot q^n$$

für alle n . Dabei wird C geeignet gewählt. Setze nun $c_n = C \cdot q^n$. Damit ist

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

als geometrische Reihe eine konvergente Majorante.

2.5.5 Quotientenkriterium

Gilt $a_n \neq 0$ für alle n und ist $\overline{\lim} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, so ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent.

Beweis: Wähle q so, daß $\overline{\lim} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < q < 1$

$$\Rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q \quad \text{für } n \geq n_0$$

Multipliziere diese Werte nun für $n = n_0, n_0 + 1, \dots, m - 1$ auf:

$$\prod_{k=n_0}^{m-1} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q^{m-n_0}$$

Ausgeschrieben ist dies:

$$\left| \frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \cdot \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} \dots \frac{a_{m-1}}{a_{m-2}} \cdot \frac{a_m}{a_{m-1}} \right| = \left| \frac{a_m}{a_{n_0}} \right| \leq q^{m-n_0}$$

$$|a_m| \leq |a_{n_0}| q^{-n_0} q^m \quad \text{für } m > n_0$$

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{|a_m|} \leq q \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{|a_{n_0}| q^{-n_0}} = q < 1$$

2.5.6 Beispiele

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{n^\alpha q^n}_{a_n}$ ist absolut konvergent für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $|q| < 1$

Beweis Wurzelkriterium:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{n^\alpha} \cdot |q| \rightarrow |q| < 1$$

$$\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = |q| < 1$$

2 Folgen und Reihen

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ konvergiert absolut, für $a \in \mathbb{R}$

Beweis: $a = 0$ o.k.

$$a \neq 0: \quad \frac{a^n}{n!} \neq 0 \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |a| \cdot \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\overline{\lim} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$$

(3) Die Binomische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} a^n$ ist absolut konvergent für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $|a| < 1$.

Beweis:

$$a_n = a^n \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{n!}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| a \frac{1}{n+1} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)} \right|$$

$$= |a| \underbrace{\frac{1}{n+1} |\alpha-n|}_{\rightarrow 1} \rightarrow |a| < 1$$

Sonderfälle: $a = 0$ trivial, $\alpha \in \mathbb{N}_0$: endliche Summe.

2.5.7 Satz

Für $p \in \mathbb{N}, p \geq 2$ hat jedes $a \in \mathbb{R}$ eine Darstellung der Form

$$a = \text{sign}(a) \left([|a|] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} \right)$$

mit $a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Diese Darstellung ist eindeutig, wenn man „ $a_n = p-1$ für $n \geq n_0$ “ verbietet.

Beweis: für $0 < a < 1$.

$$\begin{aligned} \text{setze } a_1 &= [pa], r_1 = a - \frac{a_1}{p} \\ a_2 &= [p^2 r_1], r_2 = r_1 - \frac{a_2}{p^2} \\ a_3 &= [p^3 r_2], r_3 = r_2 - \frac{a_3}{p^3} \\ &\vdots \\ a_n &= [p^n r_{n-1}], r_n = r_{n-1} - \frac{a_n}{p^n} \end{aligned}$$

$$a = \frac{a_1}{p} + r_1 = \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p^2} + r_2 = \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p^2} + \cdots + \frac{a_n}{p^n} + r_n =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{p^k}$$

Mit Induktion: $a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\}$, $0 \leq r_n \leq p^{-n}$, $r_n \geq r_{n+1}$

n=0:

$$a_0 := 0, r_0 := a, \text{ d.h. } 0 < r_0 < 1 = p^{-0}$$

$$r_1 = a - \frac{a_1}{p} \leq 0$$

n → n+1: $a_{n+1} = [p^{n+1}r_n] \geq 0$, da $r_n \geq 0$

$$\text{da } r_n < p^{-n} \Rightarrow p^{n+1}r_n < p^{n+1}p^{-n} = p$$

$$\Rightarrow a_{n+1} < p, \text{ also } a_{n+1} \leq p - 1.$$

$$r_{n+1} = r_n - \underbrace{\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}}}_{\geq 0} \leq r_n$$

$$\begin{aligned} 0 \leq p^{n+1}r_{n+1} &= p^{n+1}r_n - a_{n+1} \\ &= p^{n+1}r_n - [p^{n+1}r_n] < 1 \end{aligned}$$

$$0 \leq r_{n+1} < \frac{1}{p^{n+1}}$$

Eindeutigkeit:

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{p^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{p^k}$$

Annahme: Es gibt verschiedene Darstellungen.

Dann ex. m : $a_k = b_k$ für $1 \leq k < m$, $a_m \neq b_m$, z.B. Sei $a_m > b_m$

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k - b_k}{p^k} = \overbrace{\frac{a_m - b_m}{p^m}}^{\geq 1} + \sum_{k=m+1}^{\infty} \overbrace{\frac{a_k - b_k}{p^k}}^{\geq -(p-1)} \\ &\geq \frac{1}{p^m} - (p-1) \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{1}{p^k} \\ &= \frac{1}{p^m} - (p-1) \frac{1}{p^{m+1}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{p^j} \\ &= \frac{1}{p^m} - \frac{1}{p^{m+1}} (p-1) \frac{1}{1-1/p} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_m - b_m = 1, a_k - b_k = -(p-1) \text{ für } k > m :$$

$$a_k = 0, b_k = p-1 \text{ für } k > m$$

2.5.8 Satz

$\mathbb{R}$ ist überabzählbar. Eine Menge ist endlich oder unendlich: Eine unendliche Menge M , heißt *abzählbar*, wenn es eine injektive Abbildung von M auf $\mathbb{N}$ gibt, sonst heißt sie *überabzählbar*

Beweis: Annahme: $\mathbb{R}$ ist abzählbar

$$]0, 1[\cap \mathbb{R} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$$

$$x_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{n,k}}{10^k} \quad (\text{„eindeutige“ Darstellung})$$

$$a_n = \begin{cases} 8, & \text{wenn } a_{n,n} = 0 \\ 0, & \text{wenn } a_{n,n} \neq 0 \end{cases}$$

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \in]0, 1[, \text{ d.h. } x = x_m \text{ f\u00fcr ein } m$$

$$\Rightarrow a_k = a_{m,k} \text{ f\u00fcr alle } k$$

Widerspruch: die neue Zahl ist nicht in der Menge von oben.

2.6 Mehrfachreihen

Bisher wurden Reihen der Form $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ betrachtet.

Dabei war die Summationsreihenfolge vorgegeben und wesentlich. Hier im Abschnitt 2.6:

- allgemeine Reihen, etwa $\sum_{i,j=0}^{\infty} a_{i,j}$
- Zusammenhang zwischen „absoluter Konvergenz“ und „Umordnen der Reihe“

2.6.1 Definition

Sei Λ eine beliebige Indexmenge und f\u00fcr jedes $\lambda \in \Lambda$ sei ein $a_\lambda \geq 0$ gegeben.

F\u00fcr jede *endliche* Menge $E \subseteq \Lambda$ sei $S(E) := \sum_{\lambda \in E} a_\lambda$ (dabei ist $s(\emptyset) = 0$).

Falls $\{S(E) | E \subseteq \Lambda \text{ endlich}\}$ beschr\u00e4nkt ist, so sei

$$S(\Lambda) \equiv \sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda := \sup\{S(E) : E \subseteq \Lambda \text{ endlich}\}$$

2.6.2 Beispiel

Sei $a_k \geq 0$ und $\sum_{k=0}^{\infty} a_k < \infty$. Hier also: $\Lambda = \mathbb{N}_0$.

Dann ist

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda \equiv \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

Beweis: Sei $E \subseteq \Lambda$ beliebig, endlich. Dann existiert ein n mit $E \subseteq \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$\Rightarrow S(E) = \sum_{k \in E} a_k \leq \sum_{k=0}^n a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

$$\text{d. h. } \sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda \equiv \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k \text{ ist wohldefiniert und ist } \leq \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

noch z. z.: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k$

$$\begin{aligned} s_n &:= \sum_{k=0}^n a_k = s(E) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k \end{aligned}$$

2.6.3 Folgerung

Ist $a_k \geq 0$ und $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergent und $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bijektiv, dann konvergiert auch

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(x)} \text{ mit dem Wert } \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

Bemerkung: Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(x)}$ heißt „Umordnung“

Beweis:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k \in \mathbb{N}_0} a_k = \sum_{\varphi(k) \in \mathbb{N}_0} a_{\varphi(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}$$

2.6.4 Umordnungssatz

Ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent und $(a_{\varphi(k)})$ eine beliebige Umordnung von (a_k) , dann ist auch $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(x)}$ absolut konvergent und es ist

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(x)} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

Schreibweise: Für $c \in \mathbb{R}$ sei $c^+ := \max(c, 0)$ und $c^- := \max(-c, 0)$
Damit gilt: $c = c^+ - c^-$ sowie $c^+ \leq |c|$, $c^- \leq |c|$

Beweis: Da $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergiert und $a_k^+ \leq |a_k|$, $a_k^- \leq |a_k|$ gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k^+, \sum_{k=0}^{\infty} a_k^- &\text{ konvergieren} \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}^+ = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^+ \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^n a_k^+ - \sum_{k=0}^n a_k^- \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=0}^{\infty} a_k^- = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}^+ - \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}^- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{k=0}^n a_{\varphi(k)} &= \sum_{k=0}^n a_{\varphi(k)}^+ - \sum_{k=0}^n a_{\varphi(k)}^- \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}^+ - \sum_{k=0}^{\infty} a_{\varphi(k)}^- = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

2.6.5 Hilfssatz

Sei $\Lambda = \bigcup_{j=0}^{\infty} \Lambda_j$ mit $\Lambda_j \cap \Lambda_k = \emptyset$ für $j \neq k$. Dann gilt:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} \right) = \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda}$$

Beweis: Zuerst „ $\leq$ “: Es ist

$$\sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} \leq \infty.$$

$\varepsilon > 0$: Wähle zu jedem $j = 0, 1, 2, \dots$ eine endliche Menge $E_j \subseteq \Lambda_j$ mit

$$S(E_j) > \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} - \varepsilon \cdot 2^{-j}$$

$E = E_0 \cup E_1 \cup \dots \cup E_n \subseteq \Lambda$ endlich.

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} &< \sum_{j=0}^n S(E_j) + \sum_{j=0}^n \varepsilon \cdot 2^{-j} \\ &= S(E) + \varepsilon \sum_{j=0}^n 2^{-j} \\ &\leq \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} + \varepsilon \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j \\ &= \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} + 2\varepsilon \end{aligned}$$

$$\text{d. h.: } \sum_{j=0}^n \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} + 2\varepsilon \text{ für alle } n \text{ und alle } \varepsilon > 0$$

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda} + 2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_{\lambda} \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} a_{\lambda}$$

Umkehrung: $\geq$

$E \subseteq \Lambda$ endlich

$$E_j = E \cap \Lambda_j \quad (j = 0, 1, 2, \dots)$$

Nur endlich viele E_j sind $\neq \emptyset$

$$S(E) = \sum_{\lambda \in E} a_\lambda = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{\lambda \in E_j} a_\lambda \leq \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_\lambda$$

$$\Rightarrow \sum_{\lambda \in \Lambda} a_\lambda = \sup_E (S(E)) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} a_\lambda.$$

2.6.6 Definition

Sei $c \in \mathbb{R}$: $c^+ = \max\{0, c\}$ positiver Anteil, bzw. $c^- = \max\{0, -c\}$ negativer Anteil

$$c \geq 0 : c^+ = c, c^- = 0$$

$$c < 0 : c^+ = 0, c^- = -c$$

$$c^+ - c^- = c$$

Sei $\Lambda \neq \emptyset$, $c_\lambda \in \mathbb{R}$ für jedes $\lambda \in \Lambda$

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^+ \text{ und } \sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^- \text{ seien erklärt}$$

$$\text{Man setzt } \sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda = \sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^+ - \sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^-$$

2.6.7 Großer Umordnungssatz

Sei $\Lambda = \bigcup_j \Lambda_j$ (endlich oder unendlich) mit $\Lambda_j \cap \Lambda_k = \emptyset$ ($j \neq k$). Dann gilt

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda = \sum_j \sum_{\lambda \in \Lambda_j} c_\lambda$$

sofern eine der beiden Seiten existiert.

Beweis:

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^\pm = \sum_j \sum_{\lambda \in \Lambda_j} c_\lambda^\pm \quad (\text{Hilfssatz})$$

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^+ - \sum_{\lambda \in \Lambda} c_\lambda^- = \sum_j \left(\sum_{\lambda \in \Lambda_j} c_\lambda^+ - \sum_{\lambda \in \Lambda_j} c_\lambda^- \right)$$

2.6.8 Spezialfall: Doppelreihensatz

($\Lambda = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$)

$$\begin{aligned} \sum_{(j,k) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0} c_{j,k} &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} c_{j,k} \text{ Zeilensummen} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} c_{j,k} \text{ Spaltensummen} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{(j,k): j+k=n} c_{j,k} \text{ Diagonalsummen} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{(j,k): \max(j,k)=n} c_{j,k} \text{ Quadratsummen} \end{aligned}$$

2 Folgen und Reihen

falls eine der 5 Summen existiert, mit c_{j_k} durch $|c_{j_k}|$ ersetzt.

Beweis: $\Lambda = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$

1. $\Lambda_j = \{(j, k) : k \in \mathbb{N}_0\}$
2. $\Lambda_k = \{(j, k) : j \in \mathbb{N}_0\}$
3. $\Lambda_n = \{(j, k) : j + k = n\} = \{(0, n), (1, n-1), \dots, (n, 0)\}$
4. $\Lambda_n = \{(j, k) : \max\{j, k\} = n\} = \{(0, n), (1, n), \dots, (n-1, n), (n, n), (n, 0), \dots, (n, n-1)\}$

2.6.9 Beispiele

(0) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergiert

(1) $\sum_{(j,k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} \frac{1}{j^2+k^2}$ existiert nicht

Beweis: Quadratsummen

$$n \geq 1 : \sum_{\max(j,k)=n} \frac{1}{j^2+k^2} \leq \frac{1}{n^2} \cdot \text{Anzahl der Summanden}$$

$$\geq \frac{1}{2n^2} \cdot \text{Anzahl der Summanden}$$

$$(j^2 + k^2 \geq n^2, \quad j^2 + k^2 \leq 2n^2)$$

$$\sum_{\max(j,k)=n} \frac{1}{j^2+k^2} \geq \frac{1}{2n^2} (2n-1) \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\max(j,k)=n} \frac{1}{j^2+k^2} \right) \text{ divergiert,}$$

$$\text{weil } \sum \frac{1}{n} \text{ divergiert, } \sum \frac{1}{2n^2} \text{ konvergiert}$$

(2) $\sum_{j,k \geq 1} \frac{1}{j^3+k^3}$ existiert

Beweis: Quadratsummen

$$\sum_{\max(j,k)=n} \frac{1}{j^3+k^3} \leq \frac{1}{n^3} \cdot (2n-1) < \frac{2}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{\max(j,k)=n} \frac{1}{j^3+k^3} < 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 4$$

(3) $\sum_{j,k \geq 2} \frac{1}{j^k} = 2$

$$\begin{aligned} \sum_{j=2}^{\infty} \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{j}\right)^k &= \sum_{j=2}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{j}\right)^{k+2} \\ &= \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j(j-1)} = 1 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
\sum_{(m,n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0} \binom{n}{m} 2^{-n-m} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^n \binom{n}{m} 2^{-m} \right) 2^{-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} \right)^n \cdot 2^{-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n = \frac{1}{1 - 3/4} = 4
\end{aligned}$$

2.6.10 Reihenmultiplikation/Cauchyprodukt

Sind $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ absolut konvergent, so gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$$

mit $c_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j} = \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konvergiert absolut und heißt Cauchyprodukt

Beweis:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k &= \sum_{(n,k) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0} a_n b_k \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n+k=m} a_n b_k = \sum_{m=0}^{\infty} c_m.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n+k=m} a_n b_k &= a_0 b_m + a_1 b_{m-1} + \cdots + a_{m-1} b_1 + a_m b_0 \\
&= \sum_{j=0}^m a_j b_{m-j} = c_m
\end{aligned}$$

Gerechtfertigt, weil $\sum_{n,k} |a_n| |b_k|$ existiert

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{0 \leq n \leq N \\ 0 \leq k \leq K}} |a_n| |b_k| &= \sum_{n=0}^N |a_n| \sum_{k=0}^K |b_k| \\
&\leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \sum_{k=0}^{\infty} |b_k| = M \\
\Rightarrow \sum_{(n,k) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0} |a_n b_k| &\leq M
\end{aligned}$$

2.6.11 Beispiel

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n \frac{a^j}{j!} \frac{a^{n-j}}{(n-j)!} \frac{n!}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2a)^n}{n!}\end{aligned}$$

3 Grenzwert und Stetigkeit¹

3.1 Grenzwerte bei Funktionen

In diesem Abschnitt gilt: I ist immer ein beliebiges Intervall, $x_0 \in I$ oder einer der Endpunkte.

3.1.1 Definition

Sei I Intervall, $x_0 \in \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$ oder Endpunkt von I und $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $c \in \mathbb{R}$ heißt *Grenzwert* oder *Limes* von f für $x \rightarrow x_0$, geschrieben $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$ oder $f(x) \rightarrow c$ für $x \rightarrow x_0$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit $|f(x) - c| < \varepsilon$ für alle $x \in I$ mit $0 < |x - x_0| < \delta$.

3.1.2 Bemerkungen

- (1) Der Grenzwert c ist eindeutig bestimmt.
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ bedeutet: f ist definiert auf $I = (a, \infty)$ oder $[a, \infty)$ und zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $k > a$ mit $|f(x) - c| < \varepsilon$ für alle $x > k$.
- (3) entsprechend: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3.1.3 Folgenkriterium

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert genau dann, wenn für jede Folge (x_n) in $I \setminus \{x_0\}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ existiert. Dieser Grenzwert ist dann unabhängig von (x_n) und gleich $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$ existiere, d. h. zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit $|f(x) - c| < \varepsilon$ für alle $x \in I$ mit $0 < |x - x_0| < \delta$.
 (x_n) ist Folge in $I \setminus \{x_0\}$. $x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow$ es gibt ein n_0 mit $0 < |x_n - x_0| < \delta$ für $n \geq n_0$.
 $\Rightarrow |f(x_n) - c| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$, d. h. $f(x_n) \rightarrow c$ für $n \rightarrow \infty$.

„ $\Leftarrow$ “ „Alle $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ existieren“
Setze $c := \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. ((x_n) ist feste Folge in $I \setminus \{x_0\}$ mit $x_n \rightarrow x_0$).
 (ξ_n) ist Folge in $I \setminus \{x_0\}$ mit $\xi_n \rightarrow x_0$.
Die Mischfolge $(x_1, \xi_1, x_2, \xi_2, \dots) = (y_n)$ ist Folge in $I \setminus \{x_0\}$ mit $y_n \rightarrow x_0$.
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n)$ existiert und ist $= \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n)$.
Also: $f(\xi_n) \rightarrow c$ für $n \rightarrow \infty$.
Annahme: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiere nicht (oder ist $\neq c$).
 $\Rightarrow$ Es gibt ein $\varepsilon > 0$ und für $n = 1, 2, 3, \dots$ ein $x_n \in I \setminus \{x_0\}$ mit $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$,
aber $|f(x_n) - c| \geq \varepsilon$, d. h. $x_n \rightarrow x_0$, also $f(x_n) \rightarrow c$ für $n \rightarrow \infty$.
Widerspruch!

¹Version 194 vom 14. Februar 2006

3.1.4 Rechenregeln

Wenn $f(x) \rightarrow \alpha$ für $x \rightarrow x_0$ und $g(x) \rightarrow \beta$ für $x \rightarrow x_0$, so gelten

(1) $f(x) + g(x) \rightarrow \alpha + \beta.$

(2) $\lambda f(x) \rightarrow \lambda \alpha.$

(3) $f(x)g(x) \rightarrow \alpha\beta.$

(4) $|f(x)| \rightarrow |\alpha|.$

(5) $\alpha \leq \beta$, falls $f(x) \leq g(x)$ in $I \setminus \{x_0\}$.

(6) $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$, falls $\beta \neq 0$.

Genauer: Es gibt ein $\sigma > 0$ mit $g(x) \neq 0$ in $(x_0 - \sigma, x_0 + \sigma) \cap I \setminus \{x_0\}$.

$\frac{f(x)}{g(x)}$ ist dort definiert und hat den Grenzwert $\frac{\alpha}{\beta}$ für $x \rightarrow x_0$

Beweis: von (1)–(5): Folgenkriterium

von (6): Wähle $\varepsilon = \frac{1}{2} \cdot |\beta| > 0$.

Dazu ex. ein $\sigma > 0$ mit $|g(x) - \beta| < \frac{1}{2}|\beta|$ für $0 < |x - x_0| < \sigma$, $x \in I$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow |g(x)| &= |\beta + (g(x) - \beta)| \geq |\beta| - |g(x) - \beta| \\ &> |\beta| - \frac{1}{2}|\beta| = \frac{1}{2}|\beta| \end{aligned}$$

Dann Folgenkriterium.

3.1.5 Beispiele

(0) Ist $f(x) = c$ für alle $x \in \mathbb{R}$, dann ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$.

(1) $f(x) = x$ für $x \in \mathbb{R}$, dann ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0$ (Zu $\varepsilon > 0$ setze $\sigma = \varepsilon$).

(2) Ist $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p$ ein Polynom vom Grad p mit $a_p \neq 0$ und $a_j \in \mathbb{R}$, dann ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_px_0^p = f(x_0)$

Über Induktion: $\lim_{x \rightarrow x_0} x^k = x_0^k$.

(3) Ist $f(x) = [x]$ = die größte Ganze Zahl $\leq x$, so ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, falls $x_0 \notin \mathbb{Z}$. Der Limes existiert nicht für $x_0 \in \mathbb{Z}$.

(4) Es gilt: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 1}{x - 1} = r$ für $r \in \mathbf{Q}$.

Beweis: Für $r \in \mathbb{N}$:

$$x^r - 1 = (x - 1)(x^{r-1} + x^{r-2} + \dots + x + 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^{r-1} + \dots + x + 1) = r \cdot 1 = r$$

3.1.6 Einseitige Grenzwerte

Sei $I = (a, b)$, $x_0 \in (a, b)$ und $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Setze $f_-(x) = f(x)$ für $a < x < x_0$ und $f_+(x) = f(x)$ für $x_0 < x < b$.

Dann ist $f(x_{0\pm}) := \lim_{x \rightarrow x_0} f_{\pm}(x)$, falls der rechtsstehende Grenzwert existiert.

Schreibweise: $f(x_{0\pm}) = \lim_{x \rightarrow x_{0\pm}} f(x)$.

Bezeichnung: linksseitiger bzw. rechtsseitiger Grenzwert.

Beispiel: $f(x) = [x]$: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x_{0+})$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x_{0-})$ existieren immer.

3.1.7 Satz

$$f(x_{0+}) = f(x_{0-}) = c \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c.$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Es ist $|f(x) - c| < \varepsilon$ für $x_0 < x < x_0 + \delta_1$ (rechtsseitig) und für $x_0 - \delta_2 < x < x_0$ (linksseitig).

Setze $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Dann ist $|f(x) - c| < \varepsilon$ für $x \in I \setminus \{x_0\}$, $|x - x_0| < \delta$.

3.1.8 Monotone Funktionen

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt monoton wachsend [fallend], wenn aus $x < y$ ($x, y \in I$) folgt:

$$f(x) \leq f(y) \text{ [} f(x) \geq f(y)\text{]}.$$

f heißt streng wachsend [fallend], wenn immer $<$ anstelle $\leq$, bzw. $>$ anstelle $\geq$ gilt.

3.1.9 Satz

Monotone Funktionen haben in jedem Punkt $x_0 \in I$ einseitige Grenzwerte.

Sei z. B.: $a < x_0 < b$ und f wachsend: $f(x_{0-}) \leq f(x_0) \leq f(x_{0+})$.

Beweis: Sei (x_n) Folge in (a, x_0) mit $x_n \uparrow$ und $x_n \rightarrow x_0$.

Dann ist $(f(x_n))$ wachsend und beschränkt: $f(x_n) \leq f(x_0)$. Damit existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq f(x_0)$.

Nach dem modifizierten Folgenkriterium folgt dann:

Existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ für jede Folge (x_n) in (a, x_0) mit $x_n \uparrow x_0$, so existiert auch $f(x_{0-})$.

Bei monotonen Funktionen, für die $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert ($a < x_0 < b$), ist er $= f(x_0)$.

3.1.10 Cauchy Kriterium

Es sei $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann existiert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ genau dann, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ für alle $x, y \in I$, $0 < |x - x_0| < \delta$, $0 < |y - x_0| < \delta$.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert) wie Folgen.

„ $\Leftarrow$ “ Sei (x_n) Folge in $I \setminus \{x_0\}$, $x_n \rightarrow x_0$.

$(f(x_n))$ ist eine Cauchyfolge, weil zu $\varepsilon > 0$ aus der Voraussetzung ein $\delta > 0$ existiert.

Da $x_n \rightarrow x_0$ für $n \rightarrow \infty$ gibt es ein n_0 mit $|x_n - x_0| < \delta$ für $n \geq n_0$.

Für $n > m \geq n_0$ gilt: $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$.

Damit ist $(f(x_n))$ eine Cauchyfolge und $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ existiert.

Jetzt das Folgenkriterium anwenden $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert.

3.2 Stetigkeit

Sei I stets ein Intervall, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

3.2.1 Definition

f heißt *stetig* im Punkt $x_0 \in I$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ für alle $x \in I$ mit $|x - x_0| < \delta$.

f heißt *stetig* (in I), wenn f in jedem $x_0 \in I$ stetig ist. Kurz: $f \in C(I)$ oder $f \in C^0(I)$.

Bemerkung: f ist stetig in $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

3.2.2 Rechenregeln

Sind f, g stetig (in x_0 oder in I), so sind auch folgende Funktionen stetig:

- (a) $f + g$.
- (b) λf für $\lambda \in \mathbb{R}$.
- (c) $f \cdot g$.
- (d) $\frac{f}{g}$ (falls $g(x) \neq 0$ (in x_0 oder für $x \in I$)). Genauer: $g(x_0) \neq 0$.
 $\Rightarrow$ es ex. ein $\sigma > 0$ mit $g(x) \neq 0$ in $(x_0 - \sigma, x_0 + \sigma) \cap I = I'$ und $\frac{f}{g}$ als Funktion von I' nach $\mathbb{R}$ ist stetig in x_0 .
- (e) Das Kompositum:
 Ist $g: I \rightarrow J$ stetig (in $x_0 \in I$ oder in ganz I) und ist $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig (in $y_0 = g(x_0)$ oder im ganzen Intervall J), dann ist auch die Komposition $f \circ g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $(f \circ g)(x) := f(g(x))$ stetig (in x_0 oder in I).

Beweis: Nur für das Kompositum:

Sei $\varepsilon > 0$: Dann ex. ein $\delta > 0$ mit $|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon$ für $y \in J$, $|y - y_0| < \delta$.

Zu diesem δ existiert ein $\sigma > 0$ mit $|g(x) - g(x_0)| < \delta$ für alle $x \in I$, $|x - x_0| < \sigma$, d. h. für $x \in I$, $|x - x_0| < \sigma$ gilt: $|(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_0)| < \varepsilon$.

3.2.3 Beispiele

- (1) Polynome sind stetig in $\mathbb{R}$.
- (2) $f(x) = \sqrt[p]{x}$ ist stetig in $[0, \infty)$ ($p \in \mathbb{N}$).
- (3) $f(x) = x^r$ ist stetig in $(0, \infty)$ für beliebige $r \in \mathbb{Q}$.

Beweis:

- (1) Klar.
- (2) Sei $x_0 \in [0, \infty)$, (x_n) Folge in $[0, \infty)$ mit $x_n \rightarrow x_0$.
 $f(x_n) = \sqrt[p]{x_n} \rightarrow \sqrt[p]{x_0}$ (Beispiel bei Folgen).
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f$ ist stetig.
- (3) Sei $r = \frac{p}{q}$ mit $q \in \mathbb{N}$ und $p \in \mathbb{Z}$.
 $g(x) = x^p$ ist stetig in $(0, \infty)$, falls $p \in \mathbb{N}$ ist; g ist auch stetig für $p \leq 0$ ($x^p = \frac{1}{x^{-p}}$).
 Setze $c^r = \sqrt[q]{x^p} = h(g(x))$, $h(y) = \sqrt[q]{y}$ ist stetig nach Beispiel (2).
 $\Rightarrow f(x)$ ist stetig.

3.2.4 Satz vom Minimum und Maximum

Ist $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so hat f Minimum und Maximum, d. h. es gibt $x_* \in [a, b]$ und $x^* \in [a, b]$ mit $f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*)$ für alle $x \in [a, b]$.

Beweis: Für das Maximum:

Setze $M = \sup\{f(x) : a \leq x \leq b\}$. Dazu existiert eine Folge (x_n) in $[a, b]$ mit $f(x_n) \rightarrow M$ für $n \rightarrow \infty$.

Da die Folge (x_n) beschränkt ist, enthält sie eine konvergente Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \rightarrow x^* \in [a, b]$. Es ist dann $f(x^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M = \text{Maximum}$.

Für das Minimum analog.

3.2.5 Nullstellensatz

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $f(a) < 0 < f(b)$ [$f(a) > 0 > f(b)$]. Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit $f(\xi) = 0$. (ξ ist *Nullstelle* von f .)

Beweis: Zeige: Es gibt eine kleinste (erste) und eine größte (letzte) Nullstelle in (a, b) .

Beweis (für $f(a) < 0 < f(b)$, kleinste Nullstelle):

Setze $M = \{x : f(t) < 0 \text{ für } a \leq t < x\} \subseteq [a, b]$ und $\xi = \sup M \in [a, b]$. Es gilt:

- (i) $M \neq \emptyset$, weil $a \in M$.
- (ii) $\xi > a$, da $f(a) < 0$ und damit $f(t) < 0$ in $[a, a + \delta)$, für ein $\delta > 0$.
- (iii) $\xi < b$, da $f(b) > 0$ und damit $f(t) > 0$ in $(b - \delta, b]$, für ein $\delta > 0$.
- (iv) $a < x < \xi \Rightarrow f(t) < 0$ für $a \leq t < x$, d. h. $f(x) < 0$ in $[a, \xi)$.
- (v) Nach Definition von ξ gibt es eine Folge (x_n) in $(\xi, b]$ mit $x_n \rightarrow \xi$ und $f(x_n) \geq 0$.
Es ist $f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x) \leq 0$ und $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq 0$.
 $\Rightarrow f(\xi) = 0$, $f(x) < 0$ für $a \leq x < \xi$. $\Rightarrow \xi$ ist kleinste Nullstelle.

3.2.6 Zwischenwertsatz

Ist f im Intervall I stetig, so ist $J = f(I)$ ein Intervall, insbesondere gilt: Ist $f(x_1) < y < f(x_2)$, so gibt es ein $x \in (x_1, x_2)$ (falls $x_1 < x_2$), bzw. $x \in (x_2, x_1)$ (falls $x_1 > x_2$) mit $f(x) = y$, $y \in J$.

Beweis: Setze $m = \inf\{f(x) : x \in I\}$ und $M = \sup\{f(x) : x \in I\}$.

Zeige: $(m, M) \stackrel{\otimes}{\subseteq} f(I) = J$. Dann ist $J = (m, M)$, $(m, M]$, $[m, M)$ oder $[m, M]$.

Beweis von $\otimes$: Sei $y \in (m, M)$. Dann existieren $x_1, x_2 \in I$ mit $f(x_1) < y < f(x_2)$.

Dabei ist z. B. $x_1 < x_2$ (oder $x_1 > x_2$).

$f: [x_1, x_2] \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig, $g(x) = f(x) - y$ ist ebenfalls stetig.

$\left. \begin{array}{l} g(x_1) = f(x_1) - y < 0 \\ g(x_2) = f(x_2) - y > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$ es existiert ein $\xi \in (x_1, x_2)$ mit $g(\xi) = 0$, d. h. $f(\xi) = y$.

Falls $m = M$ ist $\Rightarrow f$ ist konstant, $(m, M) = \emptyset \subseteq f(I) = \{m\} =: [m, m]$.

3.2.7 Bemerkung:

Ist $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist $f([a, b]) = [m, M]$ mit

$$\left. \begin{array}{l} m \\ M \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \min \\ \max \end{array} \right\} \{f(x) : a \leq x \leq b\}$$

3.2.8 Beispiele

- (a) Sei $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ in $I = (-1, 1)$. Es ist $f(I) = [0, \infty)$.
- (b) Sei $f(x) = x + \frac{1}{x}$ in $I = (0, \infty)$. Es ist $f(I) = [2, \infty)$.
- (c) Sei $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{2d+1}x^{2d+1}$ mit $a_{2d+1} > 0$ ein Polynom vom ungeraden Grad $2d+1$. Es ist $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ insbesondere hat f eine Nullstelle.

Beweis

- (a) Es ist $f(x) \geq 0$, $f(0) = 0$ und $\sup\{f(x) : -1 < x < 1\} = +\infty$ (Es ist $f \nearrow$ in $[0, 1)$).
- (b) Es ist $f(x) - 2 = x - 2 + \frac{1}{x} = (\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^2 \geq 0$ für alle x und $= 0$ für $x = 1$.
Für $x \rightarrow 0$ gilt: $f(x) \rightarrow +\infty$: $\sup\{f(x) : 0 < x < \infty\} = +\infty$
- (c) Setze $M = \sup\{f(x) : x \in \mathbb{R}\}$ und $m = \inf\{f(x) : x \in \mathbb{R}\}$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^{2d+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a_{2d+1} + \underbrace{\frac{a_{2d}}{x}}_{\rightarrow 0} + \dots + \underbrace{\frac{a_0}{x^{2d+1}}}_{\rightarrow 0} \right) = a_{2d+1} > 0,$$

- d. h. es existiert ein $K > 0$ mit $f(x) > \frac{1}{2}a_{2d+1}x^{2d+1}$ für $x > K \Rightarrow M = 0$.
Gleicher Beweis für $m = -\infty$.

3.2.9 Satz über die Umkehrfunktion

Ist f im Intervall I streng monoton und stetig, so existiert die Umkehrfunktion $f^{-1}: J = f(I) \rightarrow I$ und sie ist stetig und streng monoton im gleichen Sinn wie f .

Beweis (Für den Fall, daß f wachsend ist):

Aus $x_1 < x_2$ folgt, daß $f(x_1) < f(x_2)$, d. h. daß f injektiv ist.

f^{-1} ist definiert auf dem Intervall $J = f(I)$.

Zeige nun die Stetigkeit von f^{-1} in $y_0 = f(x_0)$:

Sei (y_n) Folge in J mit $y_n \rightarrow y_0$ für $n \rightarrow \infty$.

Es ist $y_n = f(x_n)$, $y_0 = f(x_0)$, $x_n, x_0 \in I$.

Zeige: $x_n \rightarrow x_0$ für $n \rightarrow \infty$.

Wenn nun $x_n \not\rightarrow x_0$ (nicht konvergent gegen x_0), dann existiert eine Teilfolge (x_{n_k}) mit z. B. $x_{n_k} \geq x_0 + \varepsilon$ für alle k und für ein $\varepsilon > 0$.

$$\Rightarrow f(x_{n_k}) \geq f(x_0 + \varepsilon)$$

$$\Rightarrow f(x_{n_k}) = y_{n_k} \rightarrow y_0 = f(x_0) \geq f(x_0 + \varepsilon) > f(x_0) \text{ Widerspruch!}$$

Also gilt $f^{-1}(y_n) = x_n \rightarrow x_0 = f^{-1}(y_0)$.

Bemerkung: Für $I = [a, b]$ gilt:

Man kann man eine Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \rightarrow x'_0 \in [a, b]$ auswählen.

Dann ist $f(x'_0) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = y_0 = f(x_0) \Rightarrow f$ ist injektiv und $x'_0 = x_0$.

Es bleibt noch zu zeigen, daß f^{-1} streng wachsend ist:

$$f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2) \xrightarrow{f \text{ streng wachsend}} x_1 < x_2, \text{ also } f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2).$$

3.2.10 Definition: gleichmäßige Stetigkeit

Eine Funktion $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *gleichmäßig stetig*, wenn gilt: zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ für alle $x, y \in I$, $|x - y| < \delta$.

3.2.11 Bemerkungen und Beispiele

- (a) Gleichmäßig stetige Funktionen sind stetig in I .
- (b) $f(x) = \frac{1}{x}$ ist in $I = (0, 1]$ stetig, aber nicht gleichmäßig.

Beweis: $\left| f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) \right| = \left| n - (n+1) \right| = 1$

$x = \frac{1}{n}, y = \frac{1}{n+1}; |x - y| = \frac{1}{n(n+1)}$

$\varepsilon = \frac{1}{2}$. Suche hierzu ein $\delta = ?$ Dieses ex. nicht.

(c) **Lipschitz-stetige Funktionen**

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ für alle $x, y \in I$ ($L > 0$ Lipschitzkonstante).

L -stetige Funktionen sind gleichmäßig stetig mit $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ für $\varepsilon > 0$.

- (d) $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$ ist Lipschitzstetig in $I = [0, \infty)$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= \left| \left(\sqrt{1 + x^2} - \sqrt{1 + y^2} \right) \right| \\ &= \frac{|x^2 - y^2|}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2}} \\ &= |x - y| \frac{x + y}{\sqrt{1 + x^2} + \sqrt{1 + y^2}} \\ &\leq |x - y| \left(\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}} \right) \\ &\leq 2 \cdot |x - y| \end{aligned}$$

- (e) $f(x) = \sqrt{x}$ ist in $I = [0, \infty)$ gleichmäßig stetig, aber nicht L -stetig.

Beweis: Es ist $f(x) - f(y) = \frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$. Für z. B. $x > y$ gilt:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ &= \frac{\sqrt{x - y}}{\underbrace{\sqrt{x} + \sqrt{y}}_{\leq 1}} \cdot \sqrt{x - y} \\ &\leq \sqrt{|x - y|} \end{aligned}$$

Setze nun für $\varepsilon > 0$ $\delta = \varepsilon$. Also ist f gleichmäßig stetig. (nicht L -stetig als Aufgabe).

3.2.12 Satz von Heine

Jede stetige Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist gleichmäßig stetig.

Beweis: Nehme an, daß die Behauptung falsch ist, d. h. es gibt ein $\varepsilon > 0$ und zu jedem δ gibt es $x, y \in I$, so daß $|x - y| < \delta$, aber $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$.

Zu $\delta = \frac{1}{n}$ existieren $x_n, y_n \in I$, so daß $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$, aber $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$.

Die Folge (x_n) in $[a, b]$ besitzt eine konvergente Teilfolge (x_{n_k}) , wobei $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$, $y_{n_k} \rightarrow x_0$.

Mit der Stetigkeit von f in x_0 gilt dann:

$$0 = |f(x_0) - f(x_0)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon \text{ Widerspruch!}$$

Aufgabe: $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann gleichmäßig stetig, wenn es eine stetige Funktion F gibt mit $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $F(x) = f(x)$ in (a, b) .

3.3 Gleichmäßige Konvergenz

Sei I ein Intervall, und $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

3.3.1 Def.: Punktweise und gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

Die Funktionenfolge (f_n) konvergiert

(a) *punktweise* gegen $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ für alle $x \in I$.

(b) *gleichmäßig* gegen $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, mit $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$ und alle $x \in I$.

Ebenso heißt $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ punktweise oder gleichmäßig konvergent, wenn die Funktionenfolge (s_n) ,

$s_n = \sum_{k=0}^n f_k(x)$, punktweise bzw. gleichmäßig konvergiert.

3.3.2 Beispiele

(1) Sei $f_n(x) = x^n$ in $I = [0, 1]$. Es ist

$$f_n(x) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{für } x = 1 \end{cases} = f(x),$$

d. h. f_n ist punktweise konvergent. f_n ist aber *nicht* gleichmäßig konvergent.

$$|f_n(x) - f(x)| \stackrel{x=1-\frac{1}{n}}{=} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0 \text{ für } n \rightarrow \infty.$$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz.

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ konvergiert gleichmäßig in jedem Intervall $[-r, r]$, $0 < r < 1$, aber nicht gleichmäßig in $(-1, 1)$.

Beweis: Sei $|x| \leq r$: Dann gilt für $n \geq n_0$

$$\left| \sum_{k=0}^n x^k \right| - \left| \frac{1}{1-x} \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} r^k = \frac{r^{n+1}}{1-r} < \varepsilon,$$

da $0 < r < 1$. $\Rightarrow$ gleichmäßige Konvergenz.

Nun für $(-1, 1)$: Es ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x^k &\stackrel{x=1-\frac{1}{n+1}}{=} 1 - \frac{x^{n+1}}{1-x} \\ &= \frac{1 - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\frac{1}{n+1}} \\ &= \underbrace{(n+1)}_{\rightarrow \infty} \cdot \underbrace{\left(1 - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right)}_{\rightarrow 1 - \frac{1}{e}} \rightarrow \infty \end{aligned}$$

3.3.3 Satz

Gegeben seien $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $f_n \rightarrow f$ gleichmäßig in I .

Für $n = 1, 2, \dots$ existiere $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$. Dann existiert auch $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, d. h.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right)$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert ein n_0 mit

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq n_0 \text{ und alle } x \in I. \quad (3.1)$$

Weiter existiert ein $\delta_n > 0$ mit

$$|f_n(x) - a_n| < \varepsilon \text{ für } |x - x_0| < \delta_n \text{ und } x \in I. \quad (3.2)$$

Für $n > m > n_0$ gilt dann:

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= |(a_n - f_n(x)) + (f_n(x) - f(x)) + (f(x) - f_m(x)) + (f_m(x) - a_m)| \\ &\leq \underbrace{\varepsilon}_{\text{für } |x-x_0| < \delta_n} + \underbrace{\varepsilon}_{n \geq n_0} + \underbrace{\varepsilon}_{m \geq n_0} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{für } |x-x_0| < \delta_m} = 4\varepsilon \end{aligned}$$

Solche $x \in I$ existieren $\Rightarrow (a_n)$ ist eine Cauchyfolge, $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_1 \quad (3.3)$$

Sei $m \geq n_0$ und $m \geq n_1$ fest. Dann gilt:

$$\begin{aligned} |f(x) - a| &= |(f(x) - f_m(x)) + (f_m(x) - a_m) + (a_m - a)| \\ &\leq \underbrace{\varepsilon}_{\substack{m \geq n_0 \\ \Rightarrow (3.1)}} + \underbrace{\varepsilon}_{\substack{0 < |x-x_0| \leq \delta_n \\ \Rightarrow (3.2)}} + \underbrace{\varepsilon}_{\substack{m \geq n_1 \\ \Rightarrow (3.3)}} = 3\varepsilon \end{aligned}$$

$\Rightarrow |f(x) - a| < 3\varepsilon$ für $0 < |x - x_0| < \delta_n =: \delta$, d. h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$.

3.3.4 Satz

Gilt $f_n \rightarrow f$ gleichmäßig in I und sind alle f_n stetig (in x_0 oder in I), so ist auch f stetig (in x_0 oder in I).

Beweis: Sei $x_0 \in I$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right)}_{= f_n(x_0)} = f(x_0),$$

d. h. f ist stetig in x_0 .

3.3.5 Cauchy Kriterium

Die Funktionenfolge (f_n) mit $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert genau dann gleichmäßig, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt mit

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \text{ für alle } n > m \geq n_0 \text{ und alle } x \in I. \quad (3.4)$$

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ (gleichmäßige Konvergenz $\Rightarrow$ (3.4)) wie immer.

„ $\Leftarrow$ “ Sei $\varepsilon > 0$ und (3.4) gelte für festes $x \in I$. Dann ist $(f_n(x))$ eine Cauchyfolge, d. h. $f_n \rightarrow f$ punktweise.

Aus (3.4) folgt für $n \rightarrow \infty$, daß $|f(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$ für $m \geq n_0$ und alle $x \in I$, d. h. $f_m \rightarrow f$ gleichmäßig.

Bemerkung: Für gleichmäßige Konvergenz von $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ lautet (3.4) so:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x) \right| < \varepsilon \text{ für alle } n > m \geq n_0 \text{ und alle } x \in I.$$

3.3.6 Majorantenkriterium

Gilt $|f_n(x)| \leq g_n(x)$ und konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ gleichmäßig in I , dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$.

Speziell dann, wenn $|f_n(x)| \leq c_n$ für $x \in I$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konvergiert.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dazu ex. ein n_0 mit $\sum_{k=n+1}^{\infty} g_k(x) < \varepsilon$ für $n > m \geq I_0$ und $x \in I$.

$$\left| \sum_{k=m+1}^n f_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |f_k(x)| \leq \sum_{k=m+1}^n g_k(x) < \varepsilon$$

für $n > m \geq n_0$ und $x \in I$.

3.3.7 Beispiele

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2+n^2}$ ($x \in \mathbb{R}$) ist gleichmäßig konvergent, weil $\left| \frac{1}{x^2+n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ und $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergiert (Majorantenkriterium).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2+n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{x^2+k^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

(2) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k(1-x)$ konvergiert punktweise in $[0, 1]$, aber nicht gleichmäßig.

Beweis:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x^k(1-x) &= (1-x) \cdot \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ n+1 & \text{für } x = 1 \end{cases} \\ &= 1 - x^{n+1} \\ &\rightarrow \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{für } x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

ist unstetig, also kann keine gleichmäßige Konvergenz vorliegen.

- (3)
- $\sum_{n=0}^{\infty} x^k(1-x)^2$
- konvergiert gleichmäßig in
- $[0, 1]$
- .

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dann gilt:

$$s_n(x) \stackrel{x \neq 1}{=} (1-x)^2 \cdot \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = (1-x)(1-x^{n+1}) \text{ für } 0 \leq x \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m+1}^n x^k(1-x)^2 \right| &= |s_n(x) - s_m(x)| \\ &= |(1-x)(x^{m+1} - x^{n+1})| \end{aligned}$$

(i) Für $0 \leq x \leq 1 - \varepsilon$ ist dies $\leq 1(1-\varepsilon)^{m+1} < \varepsilon$ mit $m \geq n_0$.(ii) Für $1 - \varepsilon < x \leq 1$ ist dies $\leq \varepsilon \cdot 1$ für alle m . $\Rightarrow$ gleichmäßige Konvergenz.

- (4)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2+x^2}$
- ist nicht gleichmäßig konvergent in
- $\mathbb{R}$
- .

Beweis: Sei $x > 0$. Dann gilt:

$$\sum_{n=m+1}^{2m} \frac{x}{n^2+x^2} \geq \frac{xm}{4m^2+x^2} \stackrel{x=2m}{=} \frac{2m^2}{8m^2} = \frac{1}{4} > 0$$

Aus dem Cauchy Kriterium folgt dann, daß keine gleichmäßige Konvergenz vorliegt.

- (5)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^4+x^2}$
- ist gleichmäßig konvergent.

Beweis: Mit dem Majorantenkriterium. Es ist

$$\left| \frac{x}{n^4+x^2} \right| \leq \begin{cases} \frac{n^2}{n^4} |x| \leq \frac{1}{n^2} & \text{für } |x| \leq n^2 \\ \frac{1}{n^2} & \text{für } |x| > n^2 \end{cases} = \frac{1}{n^2}$$

- (6)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^{2+r}+x^2}$
- ist gleichmäßig konvergent für
- $r > 0$
- .

Beweis:

$$\left| \frac{x}{n^{2+r}+x^2} \right| \leq \begin{cases} \frac{n^{1+(r/2)}}{n^{2+r}} & \text{für } |x| \leq n^{1+(r/2)} \\ \frac{1}{n^{1+(r/2)}} & \text{für } |x| \geq n^{1+(r/2)} \end{cases} = \frac{1}{n^{1+(r/2)}}$$

 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ist konvergent für $\alpha > 1$. Hier ist $\alpha = 1 + \frac{r}{2}$.

3.4 Potenzreihen

3.4.1 Definition: Potenzreihe

Eine Reihe der Form

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \tag{3.5}$$

heißt *Potenzreihe*. Die Folge (a_n) heißt *Koeffizientenfolge*, und x_0 ist der *Entwicklungspunkt*.

3.4.2 Satz, Konvergenzradius

Die Potenzreihe (3.5) konvergiert absolut in $(x_0 - r, x_0 + r)$ und gleichmäßig in jedem Intervall $[x_0 - \varrho, x_0 + \varrho] \subseteq (x_0 - r, x_0 + r)$. Sie divergiert für $x > x_0 + r$ und für $x < x_0 - r$. Dabei ist

$$r = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

der *Konvergenzradius* (Formel von Cauchy-Hadamard).

Sonderfälle:

1. Für $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$ ist $r = 0$ und (3.5) heißt nirgends konvergent (obwohl konvergent in $x = x_0$).
2. Für $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$ ist $r = \infty$ und (3.5) konvergiert überall.

Beweis: Es ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Daraus folgt absolute Konvergenz nach dem Wurzelkriterium für $|x - x_0| < r$.

Sei nun (3.5) konvergent im Punkt x . Dann gilt $a_n(x - x_0)^n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, insbesondere ist $|a_n(x - x_0)| \leq M$ für $n \in \mathbb{N}_0$.

Damit gilt dann: $|x - x_0| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{M} = 1$.

Daraus folgt $|x - x_0| \leq r$ und damit Divergenz für $|x - x_0| > r$.

Zeige nun noch die gleichmäßige Konvergenz in $[x_0 - \varrho, x_0 + \varrho] \subseteq (x_0 - r, x_0 + r)$:

Wähle $\xi = x_0 + \frac{\varrho+r}{2}$ (falls $r > 0$, $r < \infty$).

Dann ist $|a_n(\xi - x_0)^n| = |a_n| \cdot \left(\frac{\varrho+r}{2}\right)^n \leq M$ beschränkt und für $|x - x_0| \leq \varrho$ gilt:

$$\begin{aligned} |a_n(x - x_0)^n| &\leq |a_n| \cdot \varrho^n \cdot \left(\frac{\varrho+r}{2}\right)^n \cdot \left(\frac{2}{\varrho+r}\right)^n \\ &\leq M \cdot \underbrace{\left(\frac{2\varrho}{\varrho+r}\right)^n}_{=: q < 1} \end{aligned}$$

$M \cdot q$ ist eine Majorante.

3.4.3 Satz

Hat (3.5) einen positiven Konvergenzradius, so stellt (3.5) eine im Konvergenzintervall stetige Funktion f dar.

Beweis: Sei $I_\varrho = [x_0 - \varrho, x_0 + \varrho] \subseteq (x_0 - r, x_0 + r)$. In I_ϱ liegt gleichmäßige Konvergenz vor. Damit ist f stetig in I_ϱ für $0 < \varrho < r$. Also ist f stetig in $\bigcup_{0 < \varrho < r} I_\varrho = (x_0 - r, x_0 + r)$.

3.4.4 Bemerkungen und Beispiele

(a) Existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = A$, so ist $r = \frac{1}{A}$ (**Quotientenkriterium**, Aufgabe)

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ hat Konvergenzradius $r = \infty$.

- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} x^n$ hat für $\alpha \in \mathbf{Q}$ den Konvergenzradius $r = 1$, denn $\sqrt[n]{n^{\alpha}} \rightarrow 1 = \frac{1}{r}$.
- (d) Die Binomische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ hat den Konvergenzradius $r = 1$, falls $\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{N}_0$. Beweis über das Quotientenkriterium (a).
- (e) Sei (a_n) die Fibonaccifolge mit $a_0 = 1$, $a_1 = 1$ und $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ für $n \geq 1$.

Frage: Was ist dann

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

und welchen Konvergenzradius hat die Potenzreihe?

Behauptung: $r \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Versuche zu zeigen: $a_n \leq \varrho^n$ mit einem $\varrho \geq 1$ (a_n ist immer ≥ 1).

Dies ist o. k. für $n = 0$ und $n = 1$.

Induktionsansatz:

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \leq \varrho^n + \varrho^{n-1} = \varrho^{n-1}(\varrho + 1) \stackrel{?}{\leq} \varrho^{n+1}$$

Das „?“ ist in Ordnung, wenn $\varrho + 1 \leq \varrho^2$ ist. Suche nun das beste ϱ für $\varrho \geq 1$:

$$\begin{aligned} \varrho^2 &= \varrho + 1 \\ \varrho &= \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Da $\sqrt[n]{a_n} \leq \varrho$ ist, gilt:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \varrho \Rightarrow r \geq \frac{1}{\varrho} = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

Sei nun $|x| < r$. Dann gilt

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow a_{n+1} x^{n+1} = x a_n x^n + x^2 a_{n-1} x^{n-1} \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} x^{n+1}}_{f(x) - a_0 - a_1} = x \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^n + x^2)}_{f(x) - a_0} \cdot \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1}}_{f(x)} \\ &\Leftrightarrow (f(x) - a_0 - a_1) = x(f(x) - a_0) + x^2 f(x) \\ &\Leftrightarrow f(x)(1 - x - x^2) = (a_0 + a_1 - a_0)x = 1 \\ &\Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}. \end{aligned}$$

Wann ist $x^2 + x - 1 = 0$? Für $x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = -\frac{1 \mp \sqrt{5}}{2}$!

Also ist $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

3.4.5 Satz: Summe und Produkt von Potenzreihen

Haben $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ und $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n$ die Konvergenzradien $r_f > 0$ und $r_g > 0$, so gilt:

3 Grenzwert und Stetigkeit

(a) $f(x) + g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n)(x - x_0)^n$ mit Konvergenzradius $r \geq \min\{r_f, r_g\}$.

(b) $f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$ mit $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k$
und Konvergenzradius $r \geq \min\{r_f, r_g\}$.

Beweis:

(a) Summe konvergenter Reihen.

(b) Cauchyprodukt:

$$f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k b_{n-k}(x - x_0)^{n-k},$$

falls $|x - x_0| < r_f$ und $|x - x_0| < r_g$.

Beispiel zu (b): Es ist $f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ für $|x| < 1$ und

$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$. Frage: Was ist die Potenzreihe für $\frac{1}{(1-x)^p}$ ($p = 3, p \geq 3$)?

3.4.6 Identitätssatz

Haben $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ und $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x - x_0)^n$ positiven Konvergenzradius, und es ist $f(x) = g(x)$ für $x = x_1, \dots, x_n$ mit $x_k \rightarrow x_0$ für $k \rightarrow \infty$, aber $x_k \neq x_0$. Dann ist $a_n = b_n$ für alle $n = 0, 1, 2, \dots$

Beweis: Annahme: Nicht für alle n gelte $a_n = b_n$. Setze

$$\begin{aligned} h(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - b_n)t^n & (h(x - x_0) &= f(x) - g(x)) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n & (c_n &= a_n - b_n). \end{aligned}$$

Nach Annahme existiert ein kleinstes m mit $c_m \neq 0$. Es ist also

$$h(t) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n t^n = t^m (c_m + c_{m+1}t + c_{m+1}t^2 + \dots) = t^m \cdot \tilde{h}(t)$$

und für $t_k = (x_k - x_0) \neq 0, t_k \rightarrow 0$ gilt:

$$h(t_k) = 0 = \underbrace{t_k^m}_{\neq 0} \cdot \tilde{h}(t_k),$$

also $\tilde{h}(t_k) = 0$. D.h. $\tilde{h}(0) = 0 = c_m \neq 0$ Widerspruch!

3.4.7 Beispiele

(a) Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Konvergenzradius $r > 0$.

Ist nun $a_{2n} = 0$ für $n = 0, 1, 2, \dots$, dann ist f eine ungerade Funktion, d.h. $f(-x) = -f(x)$.
Gilt umgekehrt $f(-x) = -f(x)$ in einem Intervall $(-\delta, \delta) \subseteq \text{Konvergenzintervall}$,
dann ist $a_{2n} = 0$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

Beweis: $f(x) + f(-x) = 0 = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n - (-1)^n a_n) x^n$.

Aus dem Identitätssatz folgt, daß $a_n = (1 + (-1)^n) = 0$ für alle n , insbesondere ist $a_{2k} = 0$.

(b) Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ mit Konvergenzradius $r > 0$.

Dann ist f gerade ($f(-x) = f(x)$ in $(-\delta, \delta)$) genau dann, wenn $a_{2n-1} = 0$ ist für $n = 1, 2, \dots$

Beweis: $f(x) - f(-x) = 0 \dots$ usw.

3.4.8 Satz über die Verknüpfung von Potenzreihen

$f(y) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n y^n$ habe Konvergenzradius $R > 0$

$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ($g(0) = 0$ Entwicklungsmittelpunkt für f -Reihe)

Dann hat $f(g(x))$ eine Potenzreihenentwicklung $f(g(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

mit Konvergenzradius $r \geq \varrho$, ϱ so, daß $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \varrho^n < R$ ist.

ohne Beweis

3.4.9 Beispiel

Sei $f(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!}$ und $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$.

Suche die Koeffizienten $c_0, c_1, \dots, c_5$ von $f(g(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Es ist

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 1 + \frac{1}{1!} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots \right) + \frac{1}{2!} \left(x - \frac{x^3}{3!} \pm \dots \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3!} \left(x - \frac{x^3}{3!} \pm \dots \right)^3 + \frac{1}{4!} (x \mp \dots)^4 + \frac{1}{5!} (x \mp \dots)^5 + \dots \\ &= 1 + \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \right) + \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{x^4}{3} \right) \\ &\quad + \frac{1}{6} \left(x^3 - 3 \frac{x^5}{6} \right) + \frac{1}{24} x^4 + \frac{1}{120} x^5 + \dots \\ &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) x^3 \\ &\quad + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) x^4 + \left(\frac{1}{120} - \frac{1}{12} + \frac{1}{120} \right) x^5 + \dots \\ &= 1 + 1x + \frac{1}{2} x^2 + 0x^3 - \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{15} x^5 + \dots \end{aligned}$$

3.4.10 Satz über das Reziproke einer Potenzreihe

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ habe Konvergenzradius $r > 0$, $a_0 \neq 0$ ($\Rightarrow f(0) \neq 0$). Dann ist $\frac{1}{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ mit positivem Konvergenzradius, und es gilt:

$$\sum_{k=0}^n a_k c_{n-k} = \begin{cases} 1 & \text{für } n = 0 \\ 0 & \text{für } n \geq 1 \end{cases} \quad (3.6)$$

Beweis: Definiere (c_n) durch (3.6). Dann hat $\Phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ positiven Konvergenzradius. Es gilt:

$$\begin{aligned} f(x) \cdot \Phi(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (c_n x^n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\sum_{k=0}^n a_k c_{n-k} \right)}_{\substack{0 \text{ für } n \geq 1 \\ 1 \text{ für } n=0}} \cdot x^n = 1, \end{aligned}$$

d.h. $\Phi(x) = \frac{1}{f(x)}$.

Konvergenzbeweis für $a_0 = 1$ (sonst: $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0 \left(\frac{f(x)}{a_0}\right)} = \frac{1}{a_0} \cdot \frac{1}{1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_0}\right) x^n}$).

Es gibt ein $A \geq 1$ mit $|a_n| \leq A^n$ ($\Leftrightarrow$ Konvergenzradius $r > 0$)

Zeige: $|c_n| \leq (2A)^n$, d.h. Konvergenzradius $\geq \frac{1}{2A}$.

Induktionsanfang: $|c_0| = 1 \leq (2A)^0$. ✓

Induktionsschritt:

$$\begin{aligned} |c_n| &= \left| - \sum_{k=0}^{n-1} a_{n-k} c_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{|a_{n-k}|}_{\leq A^{n-k}} \cdot \underbrace{|c_k|}_{\leq (2A)^k} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} 2^k A^n = A^n \sum_{k=0}^{n-1} 2^k = A^n \cdot (2^n - 1) < (2A)^n \end{aligned}$$

Induktionsbeweis ✓

3.4.11 Beispiel

Sei $f(x) = 1 - 3x^2 + x^3 - x^5 + \dots$ und $\frac{1}{f(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. Suche c_0, c_1, c_2, c_3 .

$$\begin{array}{lll} a_0 = 1 & a_0 c_0 = 1 & \Rightarrow c_0 = 1 \\ a_1 = 0 & a_0 c_1 + a_1 c_0 = 0 & \Rightarrow c_1 = 0 \\ a_2 = -3 & a_0 c_2 + a_1 c_1 + a_2 c_0 = 0 & \Rightarrow c_2 = 3 \\ a_3 = 1 & a_0 c_3 + a_1 c_2 + a_2 c_1 + a_3 c_0 = 0 & \Rightarrow c_3 = -1 \end{array}$$

2. Methode: Für $|t| < 1$ ist

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = 1 + t + t^2 + t^3 + \dots$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1 - 3x^2 + x^3 - x^5 + \dots} &= \frac{1}{1 - (3x^2 - x^3 + x^5 - \dots)} \\
&= 1 + (2x^2 - x^3 + x^5 + \dots) \\
&\quad + (3x^2 - x^3 + x^5 + \dots)^2 + \dots \\
&= 1 + 3x^2 - x^3 + 9x^4 + \dots
\end{aligned}$$

3.4.12 Umentwickeln von Potenzreihen

Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ in $I = (x_0 - r, x_0 + r)$.

Für $x_1 \in I$ gilt

$$x - x_0 = x - x_1 + x_1 - x_0$$

und es ist nach dem binomischen Satz

$$(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x - x_1)^k (x_1 - x_0)^{n-k}.$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_n (x_1 - x_0)^{n-k} (x - x_1)^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} b_k (x - x_1)^k
\end{aligned}$$

Was ist nun b_k ? Wir sind in $|x - x_1| < r - |x_1 - x_0|$ auf der sicheren Seite:

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_n (x_1 - x_0)^{n-k} (x - x_1)^k \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a_n (x_1 - x_0)^{n-k} (x - x_1)^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{k} a_n (x_1 - x_0)^{n-k} \right] \cdot (x - x_1)^k \\
\Rightarrow b_k &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} a_n (x_1 - x_0)^{n-k}
\end{aligned}$$

3.4.13 Beispiel

Es ist $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ in $(-1, 1)$. Umentwicklung von $x_0 = 0$ auf $x_1 = -\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k \left(x + \frac{1}{2}\right)^k$$

mit $b_k = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = ?$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \frac{1}{1 - \left(x + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right)} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \left(x - \frac{1}{2}\right)\right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}}_{=b_k} \left(x + \frac{1}{2}\right)^k \end{aligned}$$

Daraus folgt ein Konvergenzradius $r = \frac{3}{2}$.

3.4.14 Abelscher Grenzwertsatz

Konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ gleichmäßig in $[0, 1]$ und dabei gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

Beweis: Sei $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$. Für $n > m$ und $0 \leq x \leq 1$ gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=m+1}^n a_k x^k &= \sum_{k=m+1}^n r_k x^k - \sum_{k=m+1}^n r_{k+1} x^k = \sum_{k=m+1}^n r_k x^k - \sum_{j=m+2}^{n+1} r_j x^{j-1} \\ &= r_{m+1} x^{m+1} - \sum_{k=m+2}^n r_k (x^k - x^{k-1}) \end{aligned}$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein n_0 mit $|r_k| < \varepsilon$ für $k \geq n_0$. Für $0 \leq x \leq 1$ und $n > m \geq n_0$ gilt also:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m+1}^n a_k x^k \right| &= \left| r_{m+1} x^{m+1} - \sum_{k=m+2}^n r_k (x^k - x^{k-1}) \right| \\ &\leq \varepsilon \cdot 1 + \sum_{k=m+2}^n \varepsilon \cdot (x^{k-1} - x^k) + \varepsilon \cdot 1 \\ &= 2\varepsilon + \varepsilon(x^{m+1} - x^{m+2} + x^{m+2} - \dots + x^{n-1} - x^n) \\ &\leq 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

Also gleichmäßige Konvergenz nach Cauchy Kriterium.

3.5 Exponentialfunktion und Logarithmus

3.5.1 Definition der Exponentialfunktion $\exp(x)$

$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ist die *Exponentialfunktion* oder *Exponentialreihe*

3.5.2 Satz: Eigenschaften der Exponentialfunktion

Die Exponentialfunktion ist stetig, streng monoton wachsend, $\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$ und es gilt die *Funktionalgleichung*

$$\exp(x) \cdot \exp(y) = \exp(x + y) \quad (3.7)$$

Beweis: Die Exponentialfunktion ist stetig in $\mathbb{R}$ als eine überall konvergente Potenzreihe, (3.7) war Aufgabe 4a auf Blatt 6.

Monotonie: Sei $x < y = x + h$ mit $h > 0$:

$$\exp(y) = \exp(x) \cdot \exp(h) > \exp(x), \text{ falls } \exp(x) > 0$$

$$\exp(h) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{n!} = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \dots > 1.$$

Setze nun in (3.7) $y = -x$. Dann gilt $\exp(x) \cdot \exp(-x) = \exp(0) = 1$. Also ist $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$, insbesondere ist $\exp(x) \neq 0$ und $\exp(0) = 1$. Aus dem Zwischenwertsatz folgt dann, daß $\exp(x) > 0$ ist.

Ist $c > 0$, so existieren $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ mit $\exp(x_1) < c < \exp(x_2)$, denn $\exp(x) = 1 + x + \dots > x \rightarrow \infty$ für $x \rightarrow \infty$. $\Rightarrow x_2$ existiert. Da aber auch $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$ existiert auch x_1 . Wende nun den Zwischenwertsatz auf die Ungleichung $\exp(x_1) < c < \exp(x_2)$ an. Daraus folgt, daß ein $x \in (x_1, x_2)$ existiert mit $\exp(x) = c$.

3.5.3 Definition des Logarithmus $\log x$

Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, der *Logarithmus*, existiert, ist stetig und ist streng monoton wachsend in $(0, \infty)$. Es gilt:

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \quad (3.8)$$

Beweis: Alles bis auf (3.8) folgt aus dem Satz über die Umkehrfunktion.

Seien nun $x = \exp(s)$ und $y = \exp(t)$. Dann gilt:

$$\log(x \cdot y) = \log(\exp(s) \exp(t)) = \log(\exp(s + t)) = s + t = \log(x) + \log(y)$$

3.5.4 Satz

- (a) $1 + x < \exp(x)$ für alle $x \neq 0$.
- (b) $\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$ für $x > -1$ und $x \neq 0$.
- (c) $\exp(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

Beweis:

- (a) Klar für $x > 0$ und für $x \leq -1$. Für $-1 \leq x < 0$ gilt:

$$\exp(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} < \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1+x}$$

$$\Rightarrow \exp(x) = \frac{1}{\exp(-x)} > 1+x$$

- (b) Es ist $\log(1+x) < \log(\exp(x)) = x$, da $1+x < \exp(1+x)$. Außerdem ist $-\log(1+x) = \log\left(\frac{1}{1+x}\right) = \log\left(1 - \frac{x}{1+x}\right) < -\frac{x}{1+x}$. Daraus folgt, daß $\log(1+x) > \frac{x}{1+x}$ für $x \neq 0$ und $\frac{x}{1+x} < 1$. Wenn $x > -1$ und $x \neq 0$ ist, dann ist $1+x > 0$ und $x < 1+x$, also $\frac{x}{1+x} < 1$.

3 Grenzwert und Stetigkeit

- (c) Multipliziere die Ungleichung $\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$ mit $\frac{1}{x}$ für $x > 0$
 $\Rightarrow 1 < \frac{1}{1+x} < \frac{\log(1+x)}{x} < 1 \rightarrow 1$.
 Für $x \rightarrow 0+$ gilt dann $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$.
 Es ist $\log(e) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = 1$.
 Also ist $e = \exp(\log(e)) = \exp(1)$.

3.5.5 Bemerkung

- (a) Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt $\exp(n) = e^n$.
 (b) Für $n \in \mathbb{N}$ gilt $\exp(-n) = e^{-n}$.
 (c) Für $r = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ gilt $\exp(\frac{m}{n}) = e^{m/n}$, d.h. $\exp(r) = e^r$.

Beweis:

- (a) Mit Induktion: $\exp(n+1) = \exp(n) \cdot \exp(1) = e^n \cdot e = e^{n+1}$.
 (b) $\exp(-n) = \frac{1}{\exp(n)}$.
 (c) Sei $m = 1$. Dann ist $e = \exp(1) = \exp(n \cdot \frac{1}{n}) = (\exp(\frac{1}{n}))^n$. Es ist $\exp(\frac{1}{n}) = \sqrt[n]{\exp(1)} = e^{1/n}$
 und $\exp(\frac{m}{n}) = \exp(m \cdot \frac{1}{n}) = (\exp(\frac{1}{n}))^m = (e^{1/n})^m = e^{m/n}$.

Abbildung 3.1: Vergleich der Exponential- und Logarithmusfunktion

Die Exponentialfunktion e^x	Der Logarithmus $\log x$
ist stetig und streng wachsend auf $\mathbb{R}$	ist stetig und streng wachsend in $(0, \infty)$
$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$	$\log(x \cdot y) = \log x + \log y$
$e^x > x + 1$ für $x \neq 0$	$\frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x$ für $x > -1, x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \log x = \infty$ $\lim_{x \rightarrow 0} \log x = -\infty$
$\exp(\mathbb{R}) = (0, \infty)$	$\log(0, \infty) = \mathbb{R}$

3.5.6 Definition von e^x für $x \in \mathbb{R}$

Für $x \in \mathbb{R}$ definiert man $e^x := \exp(x)$ und für $a > 0$ und $x \in \mathbb{R}$ ist $a^x := e^{x \cdot \log a}$.

Bemerkung: Für $r = \frac{p}{q}$ gilt:

$$e^{r \log a} = e^{\frac{p}{q} \log a} = \exp\left(\frac{1}{q} \log a^p\right) = (e^{\log a^p})^{1/q} = (a^p)^{1/q} = a^{p/q} = a^r$$

3.5.7 Hyperbolische Funktionen

Sinus hyperbolicus:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Cosinus hyperbolicus:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$\sinh x$ ist stetig, streng wachsend (e^x und $-e^{-x}$ streng wachsend), ungerade.

$\cosh x$ ist stetig, streng wachsend in $[0, \infty)$, streng fallend in $(-\infty, 0]$, gerade.

Tangens hyperbolicus:

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

Cotangens hyperbolicus:

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$$

Der $\tanh$ ist monoton: Es ist $\tanh x = 1 - \frac{2}{e^{2x} + 1}$

Damit ist $e^{2x} + 1 \nearrow$, $\frac{1}{e^{2x} + 1} \searrow$ und damit $\frac{-2}{e^{2x} + 1} \nearrow$.

Abbildung 3.2: Die hyperbolischen Funktionen

3.6 Die trigonometrischen Funktionen

3.6.1 Definitionen und Satz

Die Funktionen

3 Grenzwert und Stetigkeit

$$\text{Sinus: } \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\text{Cosinus: } \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

sind stetig in $\mathbb{R}$ und es gilt:

- (i) $\sin(-x) = -\sin x$ (ungerade Funktion)
- (ii) $\cos(-x) = \cos x$ (gerade Funktion)
- (iii) $\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$
- (iv) $\sin(x+y) = \sin x \cdot \cos y + \sin y \cdot \cos x$

Beweis: nur noch für (iii) und (iv):

$$\begin{aligned} \cos x \cdot \cos y &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} y^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} \cdot x^{2k} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{(2n-2k)!} \cdot y^{2n-2k} \binom{(2n)!}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot \sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k} x^{2k} y^{2n-2k} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot \sum_{\substack{j \leq 2n \\ j \text{ gerade}}} \binom{2n}{j} x^j y^{2n-j} \\ \sin x \cdot \sin y &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} y^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \cdot \frac{(-1)^{n-k} y^{2(n-k)+1}}{(2(n-k)+1)!} \cdot \binom{(2n+2)!}{(2n+2)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \cdot \sum_{k=0}^n \frac{(2n+2)! \cdot x^{2k+1} \cdot y^{2n+2-(2k+1)}}{(2k+1)! \cdot (2n+2-2k-1)!} \end{aligned}$$

setze $n+1 = m$:

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-(-1)^m}{(2m)!} \sum_{k=0}^{m-1} \binom{2m}{2k+1} x^{2k+1} y^{2m-(2k+1)} \\ &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \sum_{\substack{j \leq 2n \\ j \text{ ungerade}}} \binom{2n}{j} x^j y^{2n-j} \\ \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \sum_{j=0}^{2n} \binom{2n}{j} x^j y^{2n-j} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x+y)^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x+y)^{2n} = \cos(x+y) \end{aligned}$$

(iv) selber machen.

3.6.2 Hilfssatz

(a) $-\frac{x^2}{2} \leq \cos(x) - 1 \leq -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ für $|x| \leq \sqrt{12}$

(b) $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ für $0 \leq x \leq \sqrt{6}$

Beweis: Mit Leibnizkriterium:

(a) Es ist $\cos(x) - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$. Das Leibnizkriterium ist anwendbar,

falls $\frac{x^{2n}}{(2n)!} \geq \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!}$ für alle n gilt,

d. h. falls $(2n+2)(2n+1) \geq x^2$ für alle n ,

d. h. falls $(2+2)/2+1 \geq x^2$, also falls $|x| \leq \sqrt{12}$. Dann ist

$$-\frac{x^2}{2} \leq \cos(x) - 1 \leq \frac{-x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}.$$

(b) Hier ist genauso das Leibnizkriterium anwendbar, falls

$$\begin{aligned} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} &\leq \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \text{ für alle } n \geq 1 \\ \iff x^2 &\leq (2n+1)2n \text{ für alle } n \geq 1 \\ \iff x^2 &\leq 6, \text{ also falls } 0 \leq x \leq \sqrt{6} \\ x - \frac{x^3}{3!} &\leq \sin x \leq x \text{ für } 0 \leq x \leq \sqrt{6} \end{aligned}$$

3.6.3 Die Zahl π

Der Cosinus besitzt eine kleinste positive Nullstelle: $\frac{\pi}{2}$. Es gilt:

$$1,4 \approx \sqrt{2} < \frac{\pi}{2} < \sqrt{6 - \sqrt{12}} \approx 1,6$$

Beweis: Es ist

$$1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

Die Nullstellen von $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ sind $\pm\sqrt{6 - \sqrt{12}}$.

Es ist $\cos 0 = 1$, $\cos(x) \geq 1 - \frac{x^2}{2} > 0$ in $[0, \sqrt{2}]$ und es ist $\cos(\sqrt{6 - \sqrt{12}}) \leq 0$. Nach dem Zwischenwertsatz hat $\cos x$ eine kleinste positive Nullstelle $\frac{\pi}{2}$, die in $(\sqrt{2}, \sqrt{6 - \sqrt{12}})$ liegt.

3.6.4 Einfache Eigenschaften von Sinus und Cosinus

(a) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

(b) $\cos(\pi/2) = 0$, $\sin(\pi/2) = 1$

(c) $\sin(x + \pi) = -\sin x$, $\cos(x + \pi) = -\cos x$

(d) $\sin(x + 2\pi) = \sin x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$

Beweis:(a) Setze $y = -x$ in (iii):

$$\cos 0 = 1 = \cos x \cdot \cos(-x) - \sin x \cdot \sin(-x) = \cos^2 x + \sin^2 x$$

(b) $\cos \frac{\pi}{2} = 0 \Rightarrow \sin \frac{\pi}{2} = 1$ (oder -1) nach (a), aber $\sin x \geq x - \frac{x^3}{6} > -1$ für $x = \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= \sin x \cdot \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \cos x \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) &= -\sin x \cdot \sin \frac{\pi}{2} = -\sin x \\ \sin(x + \pi) &= \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x \\ \cos(x + \pi) &= -\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x \end{aligned}$$

(d) $\sin(x + 2\pi) = -\sin(x + \pi) = \sin x$. cos genauso.

$$\text{(e)} \quad \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} = 1 + \dots \rightarrow 1 \text{ für } x \rightarrow 0.$$

$$\frac{\cos(x)-1}{x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n-2} = -\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!}x^2 + \dots \rightarrow -\frac{1}{2} \text{ für } x \rightarrow 0.$$

Abbildung 3.3: Sinus und Cosinus

4 Differentialrechnung¹

4.1 Differenzierbare Funktionen

4.1.1 Definition

Es sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (I Intervall) un $x_0 \in I$.
 f heißt *differenzierbar* in x_0 , wenn der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. $f'(x_0)$ ist die Ableitung (der Differentialquotient) in x_0 , auch geschrieben als $\frac{df}{dx}(x_0)$.

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ist der Differenzenquotient. Er stellt die Steigung der Geraden dar, die den Graphen von f an den Stellen x und x_0 schneidet.

f heißt differenzierbar, wenn $f'(x_0)$ in jedem $x_0 \in I$ existiert. Wenn f' sogar in I stetig ist, so heißt f *stetig differenzierbar*: $f \in C^1(I)$, d. h. f ist differenzierbar und $f' \in C^0(I)$.

4.1.2 Bemerkungen und Beispiele

- (i) Wenn f in x_0 differenzierbar ist, so ist f auch stetig in x_0 .
- (ii) Sei $f(x) = c$ konstant. Dann ist $f'(x) = 0$.
- (iii) Es ist $\frac{d}{dx}e^x = e^x$.
- (iv) Es ist $\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$, $\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$.
- (v) Es ist $\frac{d}{dx}\log x = \frac{1}{x}$ für $x > 0$.

Beweis:

(i)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

(ii) klar.

(iii)

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} e^x$$

---

¹Version 195 vom 14. Februar 2006

(iv) Hier nur für den Sinus:

$$\begin{aligned}
\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\
&= \sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin h}{h} \\
&\rightarrow \sin(x) \cdot \frac{-1}{2} \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1 \\
&= \cos x \text{ für } h \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

(v)

$$\begin{aligned}
\frac{\log(x+h) - \log(x)}{h} &= \frac{\log(x(1 + \frac{h}{x})) - \log(x)}{h} \\
&= \frac{\log(x) + \log(1 + \frac{h}{x}) - \log(x)}{h} \\
&= \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\
&\quad \left(\frac{\log(1+t)}{t} \rightarrow 1 \text{ für } t \rightarrow 0 \right) \\
&\rightarrow \frac{1}{x} \text{ für } h \rightarrow 0
\end{aligned}$$

4.1.3 Differentiationsregeln

Sind f und g differenzierbar in x_0 (oder in I) und ist $\lambda \in \mathbb{R}$, dann sind die folgenden Funktionen ebenfalls differenzierbar:

(1) $f + g$. Dabei ist $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.(2) λf . Dabei ist $(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$.(3) $f \cdot g$. Dabei ist $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.(4) $\frac{f}{g}$, falls $g(x_0) \neq 0$. Dabei ist $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

Insbesondere ist $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$.

Beweis:

(3)

$$\begin{aligned}
\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0} \\
&\quad + \frac{g(x_0)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\
&\rightarrow f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0).
\end{aligned}$$

(4) Beweise zuerst den Spezialfall $\frac{1}{g}$:

$g(x) \neq 0$, g stetig in x_0 , also ist $g(x) \neq 0$ in einem Intervall $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} &= \underbrace{\frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0}}_{\rightarrow -g'(x_0)} \cdot \underbrace{\frac{1}{g(x)g(x_0)}}_{\rightarrow \frac{1}{g^2(x_0)}} \\ &\rightarrow \frac{-g'(x_0)}{g^2(x_0)} \end{aligned}$$

Nun $\frac{f}{g}$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)' - \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' &\stackrel{(3)}{=} f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' \\ &= f' \cdot \frac{1}{g} - f \cdot \frac{g'}{g^2} = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \end{aligned}$$

4.1.4 Umformung der Definition

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$. Dann ist

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ \iff \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0) - h \cdot f'(x_0)}{h}}_{=: r(h)} &= 0 \end{aligned}$$

$$\iff f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot h + h \cdot r(h) \text{ mit } r(h) \rightarrow 0 \text{ f\u00fcr } h \rightarrow 0$$

$f(x_0) + f'(x_0) \cdot h$ ist Approximation von $f(x_0 + h)$ in der N\u00e4he von $h = 0$.

4.1.5 Kettenregel

Seien $g: I \rightarrow J$ und $f: J \rightarrow \mathbb{R}$ mit Intervallen I und J . Ist g differenzierbar in $x_0 \in I$ und ist f differenzierbar in $y_0 = g(x_0)$, dann ist $f \circ g$, $(f \circ g)(x) := f(g(x))$, differenzierbar in x_0 und es gilt

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0) \cdot g'(x_0).$$

Beweis: Es ist

$$(1) \quad g(x_0 + h) - g(x_0) = g'(x_0) \cdot h + h \cdot r(h) \text{ mit } r(h) \rightarrow 0 \text{ f\u00fcr } h \rightarrow 0$$

$$(2) \quad f(y_0 + k) - f(y_0) = f'(y_0) \cdot k + k \cdot \varrho(k) \text{ mit } \varrho \rightarrow 0 \text{ f\u00fcr } k \rightarrow 0$$

Damit ist

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x_0 + h) - (f \circ g)(x_0) - h \cdot f'(y_0) \cdot g'(x_0) \\ = \underbrace{f(g(x_0 + h)) - f(y_0)}_{\otimes} - h \cdot f'(y_0) g'(x_0) = (*) \end{aligned}$$

Dabei ist

$$\otimes = f(g(x_0 + h)) - f(y_0)$$

mit $k = g(x_0 + h) - g(x_0)$

$$\begin{aligned}
 &= f(y_0 + k) - f(y_0) \\
 &\stackrel{(2)}{=} f'(y_0) \cdot (g(x_0 + h) - g(x_0)) + (g(x_0 + h) - g(x_0)) \cdot \varrho(k) \\
 &\stackrel{(1)}{=} f'(y_0) \cdot (g'(x_0) \cdot h + h \cdot r(h)) + g'(x_0) \cdot h \varrho(k) \\
 &= f'(y_0)g'(x_0) \cdot h + h \cdot (f'(y_0) \cdot r(h) + g'(x_0) \cdot \varrho(k))
 \end{aligned}$$

Für $h \rightarrow 0$ gilt dann: $k = g(x_0 + h) - g(x_0) \rightarrow 0$ und $\varrho(k) \rightarrow 0$. Daraus folgt dann für (*):

$$(*) = f'(y_0)g'(x_0) \cdot h + h \cdot R(h),$$

wobei $R(h) = f'(y_0) \cdot r(h) + g'(x_0) \cdot \varrho(g(x_0 + h) - g(x_0)) \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$.

Also: $(f \circ g)'(x_0) = f'(y_0)g'(x_0)$.

4.1.6 Beispiele

(1)

$$\frac{d}{dx} e^{\cos x} = e^{\cos x} \cdot \sin x$$

(2) Für $x > 0$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ ist

$$\frac{d}{dx} x^\alpha = \frac{d}{dx} e^{\alpha \log x} = e^{\alpha \log x} \alpha \frac{1}{x} = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$$

4.1.7 Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, injektiv und differenzierbar in $x_0 \in I$ mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist $f^{-1}: J = f(I) \rightarrow I$ differenzierbar in $y_0 = f(x_0)$ und es ist

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Falscher Beweis: Mit Kettenregel. Es gilt: $f(f^{-1}(y)) = y$. Differenzieren liefert

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} f(f^{-1}(y)) &= f'(f^{-1}(y)) \cdot (f^{-1})'(y) \\
 \Rightarrow (f^{-1})'(y_0) &= \frac{1}{f'(x^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}.
 \end{aligned}$$

Dieser „Beweis“ ist aber nur richtig, falls sicher ist, daß f^{-1} in y_0 differenzierbar ist.

Beweis: Es ist $y_0 = f(x_0)$ und $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Setze $y_0 + h = f(x_0 + k)$, also ist k definiert durch

$$k := f^{-1}(y_0 + h) - x_0 \neq 0.$$

Damit gilt dann:

$$\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} = \frac{1}{\frac{f(x_0+k) - f(x_0)}{k}}.$$

Für $h \rightarrow 0$ folgt $k \rightarrow 0$, da f^{-1} stetig ist, und damit ist

$$\frac{f^{-1}(y_0 + h) - f^{-1}(y_0)}{h} \longrightarrow \frac{1}{f'(x_0)}.$$

4.1.8 Beispiele

(1) Es ist

$$\frac{d}{dy} \log y = \frac{1}{\frac{d}{dx} e^x} \Big|_{x=\log y} = \frac{1}{e^x} \Big|_{x=\log y} = \frac{1}{y}$$

(2) Es ist

$$\frac{d}{dy} \sqrt[n]{y} = \frac{1}{\frac{d}{dx} x^n} \Big|_{x=\sqrt[n]{y}} = \frac{1}{nx^{n-1}} \Big|_{x=\sqrt[n]{y}} = \frac{1}{ny^{1-\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n} y^{\frac{1}{n}-1}.$$

4.1.9 Höhere Ableitungen

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ mit einem Intervall I . Wenn f differenzierbar ist, ist f' die Ableitung. Wenn f' differenzierbar ist, ist $(f')' = f''$ die 2. Ableitung von f und wenn f'' differenzierbar ist, dann ist $(f'')' = f'''$ die 3. Ableitung von f .

Allgemeiner: Es ist $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$. Induktiv wird weiter definiert: $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Dabei ist $f^{(n)}$ die n -te Ableitung von f . Es werden dann folgende Mengen definiert:

$$\begin{aligned} C^0(I) &= \{f: f \text{ ist stetig in } I\} \\ C^1(I) &= \{f: f' \text{ ist stetig in } I\} \\ C^n(I) &= \{f: f^{(n)} \text{ ist stetig in } I\} \\ C^\infty(I) &= \bigcap_{n \geq 0} C^n(I) = \{f: f^{(n)} \text{ existiert für alle } n \in \mathbb{N}_0\} \end{aligned}$$

Dabei gilt:

$$C^0(I) \supseteq C^1(I) \supseteq C^2(I) \supseteq \dots \supseteq C^\infty(I)$$

4.1.10 Leibnizregel

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{\nu=0}^n \binom{n}{\nu} f^{(\nu)} g^{(n-\nu)}$$

Beweis: mit Induktion: Für $n = 1$ ist dies die Produktregel. Für $n \mapsto n + 1$: Aufgabe. Tip: Vergleiche mit dem Binomischen Lehrsatz, 1.5.6 auf Seite 12:

$$(a + b)^n = \sum_{\nu=0}^n \binom{n}{\nu} a^\nu b^{n-\nu}$$

4.2 Die Mittelwertsätze der Diff.-rechnung

4.2.1 Definition: Minimum, Maximum

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$. f hat in x_0 ein Minimum bzw. Maximum, wenn $f(x) \geq f(x_0)$ bzw. $f(x) \leq f(x_0)$ für $x \in I$, $|x - x_0| < \delta$ für ein $\delta > 0$. Gilt $f(x) > f(x_0)$ bzw. $f(x) < f(x_0)$ für $x \in I$, $0 < |x - x_0| < \delta$, so heißt x_0 Stelle eines strikten Minimums bzw. Maximums.

4.2.2 Bemerkung

Ist x_0 kein Endpunkt von I und hat f in x_0 ein Extremum (Minimum oder Maximum) und existiert $f'(x_0)$, so ist $f'(x_0) = 0$.

Beweis: Für den Fall eines Maximums. Es gilt $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ für kleine $|h|$. Daraus folgt:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0, \text{ für } h > 0 \quad \xrightarrow{h \rightarrow 0} \quad f'(x_0) \leq 0, \text{ für } h > 0 \\ \geq 0, \text{ für } h < 0 \quad \geq 0, \text{ für } h < 0 \quad \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

4.2.3 Satz von Rolle

Ist $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $f(a) = f(b)$, und ist f differenzierbar in (a, b) , so gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.

Beweis: Klar für konstantes f . Sonst hat f ein Extremum in $\xi \in (a, b)$. Dort ist $f'(\xi) = 0$.

4.2.4 Mittelwertsatz der Differentialrechnung

Ist $f \in C^0([a, b])$ differenzierbar in (a, b) , so gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(\xi) \text{ bzw. } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Beweis: Sei $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Es ist $g(a) = g(b) = f(a)$. Außerdem ist $g \in C^0([a, b])$ und diffbar in (a, b) . Nach dem Satz von Rolle existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit $g'(\xi) = 0$ und damit

$$g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

4.2.5 Beispiele

(1) **Behauptung:** $\sin x \leq x$ für $x \geq 0$.

Beweis:

$$\sin x = \sin x - \sin 0 \stackrel{\text{MWS}}{=} (x - 0) \cdot \cos \xi \text{ mit } \xi \in (0, x) \leq x$$

(2) **Behauptung:** $\log(1+x) \geq \frac{x}{1+x}$ für $x > -1$.

Beweis: Es ist

$$\log(1+x) = \log(1+x) - \log(1+0) = (x-0) \frac{1}{1+\xi} = \frac{x}{1+\xi}.$$

Für $x > 0$, $0 < \xi < x$ gilt:

$$\frac{1}{1+\xi} > \frac{1}{1+x} \longrightarrow \frac{x}{1+\xi} > \frac{x}{1+x}$$

Für $-1 < x < 0$, $x < \xi < 0$ gilt:

$$\frac{1}{1+\xi} < \frac{1}{1+x} \longrightarrow \frac{x}{1+\xi} > \frac{x}{1+x}$$

(3) Es ist $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ der Tangens. Für die Ableitung gilt:

$$\frac{d}{dx} \tan x = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{(\cos x)^2} \\ = \frac{1}{(\cos x)^2} = 1 + (\tan x)^2 > 1 \text{ für } 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

Behauptung: $\tan x > x$ für $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Beweis: $\tan x = \tan x - \tan 0 = (x-0) \cdot (\tan)'(\xi) > x$ mit $\xi \in (0, x)$.

4.2.6 Satz

Sind f und g stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b) mit $f' = g'$ in (a, b) , dann gilt $f = g + c$ mit einer Konstanten c .

Beweis: $h = f - g$ ist stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b) . Es gilt $h' = f' - g' = 0$. Seien nun $x, y \in (a, b)$. Dann ist $h(y) - h(x) = (y - x)h'(\xi) = 0$, d. h. h ist konstant.

4.2.7 Satz

Sei f stetig in $[a, b]$ und differenzierbar in (a, b) mit $f'(x) \rightarrow \ell$ für $x \rightarrow a$. Dann ist f differenzierbar in $[a, b]$ mit $f'(a) = \ell = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$.

Beweis: Sei $x \in (a, b)$. Dann gilt

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{\text{MWS}}{=} f'(\xi) \text{ für ein } \xi \in (a, x).$$

Für $x \rightarrow a$ folgt $\xi \rightarrow a$, also $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow \ell$.

4.2.8 Aufgabe

Zeige: Sei f stetig in (a, b) und differenzierbar in (a, c) und (c, b) mit $c \in (a, b)$. Existiert dann $\lim_{x \rightarrow c} f'(x) = \ell$, so ist $f'(c) = \ell$.

4.2.9 Verallgemeinerter Mittelwertsatz

Sind f und g stetig in $[a, b]$, differenzierbar in (a, b) , so gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$(f(b) - f(a)) \cdot g'(\xi) = (g(b) - g(a)) \cdot f'(\xi)$$

beziehungsweise

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Beweis: (Der Sonderfall $g(x) = x$ entspricht dem Mittelwertsatz)

Zuerst ein FALSCHER BEWEIS: Es gilt:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f'(\xi_1)(b - a) \\ g(b) - g(a) &= g'(\xi_2)(b - a) \end{aligned}$$

Falls $g(b) - g(a) \neq 0$, dann kann dividiert werden:

$\Rightarrow$ verallgemeinerter Mittelwertsatz. FALSCH! Denn i. A. ist $\xi_1 \neq \xi_2$!

RICHTIGER BEWEIS: Sei $h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$.

h ist stetig in $[a, b]$, differenzierbar in (a, b) . Es ist

$$\begin{aligned} h(a) &= f(b)g(a) - f(a)g(b) \\ h(b) &= -f(a)g(b) + f(b)g(a) \\ \Rightarrow h(a) &= h(b) \end{aligned}$$

Nach dem Satz von Rolle existiert nun ein $\xi \in (a, b)$ mit $h'(\xi) = 0$. Damit gilt:

$$0 = h'(\xi) = (f(b) - f(a))g'(\xi) - (g(b) - g(a))f'(\xi)$$

4.2.10 Regel von de l'Hôpital

1. Form: Seien f und g stetig in $[a, b)$ und differenzierbar in (a, b) .

Außerdem sei $f(a) = g(a) = 0$, sowie

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

existiere. Dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Sonderform: Seien f und g in (c, ∞) stetig und differenzierbar.

Außerdem sei $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

2. Form: Seien f und g differenzierbar in (a, b) , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ und

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

Dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

Beweis:

1. Form:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &\stackrel{\text{v.a. MWS}}{=} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \text{ für ein } \xi \in (a, x). \end{aligned}$$

Sonderform: Sei $F(x) = f(\frac{1}{x})$, $G(x) = g(\frac{1}{x})$ in $(0, \frac{1}{c})$. Es ist $F(x) \rightarrow 0$ und $G(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$.

$$\frac{F'(x)}{G'(x)} = \frac{f'(\frac{1}{x}) \cdot \frac{-1}{x^2}}{g'(\frac{1}{x}) \cdot \frac{-1}{x^2}} \rightarrow L$$

2. Form: Sei $0 < \varepsilon < \frac{1}{4}$:

Es existiert ein $c \in (a, b)$ mit $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - L \right| < \varepsilon$ für $a < x < c$.

Es existiert ein d , $a < d < c$ mit $\left| \frac{f(c)}{f(x)} \right| < \varepsilon$ und $\left| \frac{g(c)}{g(x)} \right| < \varepsilon$ für $a < x < d$.

Sei nun $a < x < d$. Dann ist

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} - L &= \underbrace{\frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)}}_{\text{v.a. MWS}} \cdot \frac{1 - \frac{g(c)}{g(x)}}{1 - \frac{f(c)}{f(x)}} - L \\ &= \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - L + \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} (H(x) - 1) \end{aligned}$$

$$H(x) = \frac{1 - \frac{g(c)}{g(x)}}{1 - \frac{f(c)}{f(x)}}, \text{ wobei } x < \xi < c$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - L \right| &< \varepsilon + \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \cdot \frac{\left| \frac{f(c)}{f(x)} - \frac{g(c)}{g(x)} \right|}{\left| 1 - \frac{f(c)}{f(x)} \right|} \\ &< \varepsilon + (|L| + \varepsilon) \cdot \frac{2\varepsilon}{1 - \varepsilon} \\ &< \varepsilon + \left(|L| + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{2\varepsilon}{\frac{3}{4}} \\ &= \text{const} \cdot \varepsilon \text{ für } a < x < d = a + \delta. \end{aligned}$$

⇒ Behauptung.

4.2.11 Beispiele

(1)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{\cosh x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cosh x}{\sinh x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

direkt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1$$

4.3 Anwendungen der Differentialrechnung

A Monotone Funktionen

$I = (a, b), [a, b), (a, b], [a, b]$. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, differenzierbar in (a, b) .

4.3.1 Satz

1. f monoton wachsend [fallend] $\iff f'(x) \geq 0$ [$f'(x) \leq 0$] in $a < x < b$.
2. Ist $f'(x) > 0$ [$f'(x) < 0$] in (a, b) , dann ist f streng wachsend [fallend].

Beweis:

(i) „ $\Rightarrow$ “ Sei $x, x + h, h > 0$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0 \quad (f \uparrow)$$

„ $\Leftarrow$ “ Sei $x < y$ und $f' \geq 0$:

$$f(y) - f(x) = (y - x) \cdot f'(\xi) \geq 0 \text{ mit } \xi \in (x, y).$$

Also ist f wachsend.

(ii) $\Rightarrow f'(\xi) > 0$: $f(y) - f(x) > 0$, streng monoton.

4.3.2 Beispiel: $f(x) = x \cdot \log x$

Sei $f(x) = x \log x$ und $I = (0, \infty)$. Es ist

$$f'(x) = \log x + x \frac{1}{x} = \log x + 1 \begin{cases} > 0 & \text{für } x > \frac{1}{e} \\ < 0 & \text{für } 0 < x < \frac{1}{e} \end{cases}.$$

Es gilt außerdem: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Abbildung 4.1: $f(x) = x \cdot \log x$ **B Konvexe Funktionen**

I und f wie vorher.

4.3.3 Definition: konvex

f heißt *konvex*, wenn für beliebige $x, y \in I$ und $0 < t < 1$ gilt:

$$f(ty + (1-t)x) \leq tf(y) + (1-t)f(x) \quad (4.1)$$

Interpretation: Sei $z = ty + (1-t)x$. Für $x < y$ gilt dann:

$$t(y-x) = z-x, \quad t = \frac{z-x}{y-x}, \quad 1-t = \frac{y-z}{y-x}$$

Umgeformte Definition:

$$f(z) \leq \frac{z-x}{y-x} \cdot f(y) + \frac{y-z}{y-x} \cdot f(x) = l(z) \text{ linear} \quad (4.2)$$

Bedeutung der 2. Definition: f ist konvex im Intervall (a, b) , wenn für beliebige x, y mit $a < x < y < b$ gilt, daß der Graph von f unterhalb der Geraden liegt, die die Funktion zwischen den Stellen a und b verbindet.

4.3.4 Satz

f ist genau dann konvex, wenn für $x < z < y$ beliebig gilt:

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z} \quad (4.3)$$

Beweis: (4.2) $\iff$ (4.3):

$$\begin{aligned} f(z) &\leq \frac{z-x}{y-x}f(y) + \frac{y-z}{y-x}f(x) \\ \iff f(z)(t + (1-t)) &\leq \frac{z-x}{y-x}f(y) + \frac{y-z}{y-x}f(x) \\ \iff f(z)\frac{z-x}{y-x} + f(z)\frac{y-z}{y-x} &\leq \frac{z-x}{y-x}f(y) + \frac{y-z}{y-x}f(x) \\ \iff f(z)(z-x) + f(z)(y-z) &\leq f(y)(z-x) + f(x)(y-z) \\ \iff f(z)(y-z) - f(x)(y-z) &\leq f(y)(z-x) - f(z)(z-x) \\ \iff \frac{f(z) - f(x)}{z-x} &\leq \frac{f(y) - f(z)}{y-z} \end{aligned}$$

4.3.5 Satz

- (a) Ist f differenzierbar in (a, b) , so ist f genau dann konvex, wenn f' monoton wachsend ist.
- (b) Ist f zweimal differenzierbar in (a, b) , so ist f genau dann konvex, wenn $f''(x) \geq 0$ in (a, b) ist.

Beweis: Zuerst für (b): Aus (a) folgt (b), denn: Wenn f'' existiert gilt

$$f \uparrow \iff f'' = (f')' \geq 0.$$

Jetzt der Beweis für (a):

„ $\Rightarrow$ “ f sei konvex und differenzierbar: Aus (4.3) folgt:

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \text{ für } z \rightarrow x$$

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq f'(y) \text{ für } z \rightarrow y$$

Daraus folgt:

$$f'(x) \leq f'(y)$$

„ $\Leftarrow$ “ f' sei monoton wachsend. Weise nun (4.3) nach:

Seien ξ und η beliebig mit $x < \xi < z < \eta < y$:

$$\left. \begin{aligned} \frac{f(z) - f(x)}{z-x} &\stackrel{\text{MWS}}{=} f'(\xi) \\ \frac{f(y) - f(z)}{y-z} &\stackrel{\text{MWS}}{=} f'(\eta) \geq f'(\xi) \end{aligned} \right\} \Rightarrow (4.3)$$

C Die Arcusfunktionen

4.3.6 Arcustangens

Definition des Tangens: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Es ist $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ und für die Ableitung gilt: $\frac{d}{dx} \tan x = 1 + (\tan x)^2 \geq 1 > 0$. Also ist der Tangens streng wachsend. Zusätzlich gilt: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = +\infty$ und

Abbildung 4.2: Tangens und Arcustangens

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} = -\infty.$$

Für die zweite Ableitung gilt:

$$\frac{d^2}{dx^2} \tan x = 2 \cdot \tan x \cdot (1 + (\tan x)^2) \begin{cases} > 0 & \text{in } (0, \frac{\pi}{2}) \\ < 0 & \text{in } (-\frac{\pi}{2}, 0) \end{cases}$$

Der Tangens besitzt eine Umkehrfunktion, den *Arcustangens*: $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Es gilt:

$$\frac{d}{dy} \arctan y = \frac{1}{1 + (\tan x)^2} \Big|_{x=\arctan y} = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$\frac{d^2}{dy^2} \arctan y = \frac{-2y}{(1 + y^2)^2}$$

4.3.7 Arcuscotangens

Der Cotangens $\cot: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ ist definiert durch $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Es ist

$$\frac{d}{dx} \cot x = -1 - (\cot x)^2$$

Die Umkehrfunktion ist der Arcuscotangens: $\operatorname{arccot}: \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

$$\frac{d}{dy} \operatorname{arccot} y = \frac{-1}{1 + y^2}$$

4.3.8 Arcussinus

Für den Sinus gilt: $\sin: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ und

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x > 0$$

Abbildung 4.3: Cotangens und Arcuscotangens

Abbildung 4.4: Arcussinus

in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Der Sinus ist also streng wachsend in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Die Umkehrfunktion des Sinus ist der Arcussinus $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \arcsin y &= \left. \frac{1}{\cos x} \right|_{x=\arcsin y} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\sin x)^2}} \Big|_{x=\arcsin y} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \text{ in } (-1, 1). \\ \frac{d^2}{dy^2} \arcsin y &= -\frac{1}{2}(1 - y^2)^{-3/2} \cdot (-2y) = y(1 - y^2)^{-3/2} \end{aligned}$$

4.3.9 Arcuscosinus

Für den Cosinus gilt $\cos: [0, \pi] \rightarrow [1, -1]$ und

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x < 0$$

Die Umkehrfunktion ist der Arcuscosinus $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Es gilt:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dy} \arccos y &= \frac{1}{-\sin x} \Big|_{x=\arccos y} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \end{aligned}$$

Abbildung 4.5: Arcuscosinus

D Differentiation und gleichmäßige Konvergenz

4.3.10 Beispiel

Sei $f_n(x) = |x|^{1+\frac{1}{n}}$ in $[-1, 1]$, $n \in \mathbb{N}$. Es ist

$$\begin{aligned} x > 0: f'_n(x) &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) x^{\frac{1}{n}} \\ x < 0: f'_n(x) &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) (-x)^{\frac{1}{n}} (-1) = -\left(1 + \frac{1}{n}\right) |x|^{\frac{1}{n}} \\ f'_n(0) &= 0 \\ f'_n(x) &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \text{sign}(x) \cdot |x|^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Betrachte $f_n(x)$ und $f'_n(x)$ für $n \rightarrow \infty$:

$$f_n(x) \xrightarrow{\text{glm.}} |x| = f(x)$$

$f(x)$ ist nicht differenzierbar in $x = 0$

$$f'_n(x) \xrightarrow{\text{pktw.}} 1 \cdot 1 \cdot \text{sign}(x)$$

$f'_n(x)$ konvergiert nicht gleichmäßig gegen $f'(x)$.

4.3.11 Satz

Sei $f_n \in C^1(I)$ im Intervall I , $f_n(x)$ konvergiere punktweise in I gegen $f(x)$ und $f'_n(x)$ konvergiere gleichmäßig in I gegen $g(x)$. Dann ist $f \in C^1(I)$ und $f' = g$. Oder

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$$

Beweis: g ist stetig, wegen der gleichmäßigen Konvergenz von $f'_n(x)$. Sei nun $x \in I$ und $\varepsilon > 0$:

1. Es existiert ein $\delta > 0$ mit $|g(x) - g(\xi)| < \varepsilon$ für alle $\xi \in I$ mit $|\xi - x| < \delta$ (Stetigkeit von g).
2. Es gibt ein n_0 mit $|f'_n(\xi) - g(\xi)| < \varepsilon$ für alle $\xi \in I$ und alle $n \geq n_0$ (glm. Konvergenz $f'_n \rightarrow g$).
3. Es gibt ein n_1 mit $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ für $n \geq n_1$. Gilt für h nun $0 < |h| < \delta$, so folgt:

$$|f(x) - f_n(x)| < |h| \cdot \varepsilon \text{ für } n \geq n_1$$

$$|f(x+h) - f_n(x+h)| < |h| \cdot \varepsilon \text{ für } n \geq n_1$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - g(x) \right| &= \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) + (f'_n(x) - g(x)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{f(x+h) - f_n(x+h)}{h} + \frac{f(x) - f_n(x)}{h} \right| \\ &\leq \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) \right| \\ &\quad + \underbrace{\varepsilon}_2 + \underbrace{\varepsilon}_3 + \underbrace{\varepsilon}_3 \\ &\stackrel{\text{MWS}}{=} |f'_n(\xi_n) - f'_n(x)| + 3\varepsilon \\ &= |(f'(\xi_n) - g(\xi_n)) + (g(\xi_n) - g(x)) \\ &\quad + g(x) - f'_n(x)| + 3\varepsilon \\ &< \underbrace{\varepsilon}_2 + \underbrace{\varepsilon}_1 + \underbrace{\varepsilon}_2 + 3\varepsilon = 6\varepsilon \end{aligned}$$

für $0 < |h| < \delta$, also ist $f'(x) = g(x)$.

4.3.12 Folgerungen

Folgerung 1: Seien $f_n \in C^1(I)$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ konvergiere punktweise in I und $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x) = g(x)$ konvergiere gleichmäßig in I . Dann ist $f \in C^1(I)$ und $f' = g$:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x)$$

Folgerung 2: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ habe Konvergenzradius $r > 0$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} (x - x_0)^n \end{aligned}$$

Folgerung 3: Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ in $I = (x_0 - r, x_0 + r)$. Dann ist $f \in C^\infty(I)$ und für $m = 1, 2, \dots$ gilt:

$$f^{(m)}(x) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n(x-x_0)^{n-m}$$

Beweise:

Folgerung 1: Betrachte $x_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ und $s'_n(x) = \sum_{k=0}^n f'_k(x)$.

Folgerung 2: $f_n(x) = a_n(x - x_0)^n$, $f_n \in C^1(I)$, $I = (x_0 - r, x_0 + r)$.

Sei $0 < \varrho < r$, $J_\varrho = [x_0 - \varrho, x_0 + \varrho]$.

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(x - x_0)^n$ hat Konvergenzradius $r > 0$, denn:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{n+1}|} = \frac{1}{r}$$

$\Rightarrow$ Gleichmäßige Konvergenz von $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(x - x_0)^n$ in J_ϱ .

$\Rightarrow f \in C^1(J_\varrho)$ und $f' = g$ in J_ϱ .

Da $I = \bigcup_{0 < \varrho < r} J_\varrho \Rightarrow f \in C^1(I)$ und $f' = g$ in I .

Folgerung 3: Mit Induktion nach m . Selber machen.

4.3.13 Beispiele

(1)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^x &= \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \end{aligned}$$

(2) **Logarithmusreihe:** Für $-1 < x < 1$ gilt:

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

Beweis:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

hat Konvergenzradius 1. Es ist $f(0) = 0$, $\log(1+0) = 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot n \cdot x^{n-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \\ &= \frac{1}{1+x} = \frac{d}{dx} \log(1+x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \log(1+x) = f(x)$ in $(-1, 1)$. Für $x \rightarrow 1-$ gilt:

$$\left. \begin{array}{l} \log 2 \\ \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ konvergiert} \end{array} \right\} \text{Abelscher Grenzwertsatz}$$

Also: $\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \pm \dots$

(3) **Arcustangensreihe:** Für $-1 < x < 1$ gilt

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

Beweis:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

hat Konvergenzradius 1.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \\ &= \frac{1}{1+x^2} = \frac{d}{dx} \arctan x \end{aligned}$$

Also ist $\arctan x = f(x) + c$ mit einer Konstanten c .

Für $x = 0$ ist $\arctan(0) = 0$ und $f(0) = 0$. Also ist $c = 0$.

4.4 Der Satz von Taylor

4.4.1 Beispiele

1. Beispiel: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ in $(-r, r)$.

$$f \in C^\infty((-r, r)), f^{(m)}(x) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1)a_n x^{n-m}$$

$$\text{Für } x = 0 \text{ gilt: } f^{(m)}(0) = m(m-1)\dots 1 \cdot a_m. \text{ Also } a_m = \frac{f^{(m)}(0)}{m!}.$$

Frage: Sei $f \in C^\infty(I)$ und $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

$$\text{Gilt: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n?$$

NEIN!

2. Beispiel: Sei

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x = 0 \\ e^{-1/x^2} & \text{für } x \neq 0 \end{cases}$$

Behauptung: Es ist $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ und $f^{(n)}(0) = 0$ für $n = 0, 1, 2, \dots$

$$\text{Damit ist } f(x) \neq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Beweis: Zeige

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_n(\frac{1}{x})e^{-1/x^2} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

mit $P_n = \text{Polynom vom Grad } 3n$.

Beweis durch Induktion:

$\mathbf{n} = \mathbf{0}$: $P_0(x) = 1$: $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = 0 = f(0)$.

$\mathbf{n} \mapsto \mathbf{n} + \mathbf{1}$: Für $x \neq 0$ ist nach I. V.:

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}$$

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= P_n'\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{-1}{x^2} e^{-1/x^2} + P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3} \\ &= e^{-1/x^2} \left[-\frac{1}{x^2} P_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right) \right] \end{aligned}$$

Setze $\frac{1}{x} = y$:

$$P_{n+1}(y) = -y^2 \cdot \underbrace{P_n'(y)}_{\text{Grad}=3n-1} + 2 \cdot \underbrace{y^3 \cdot P_n(y)}_{\text{Grad}=3n+3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2} = \lim_{y \rightarrow \infty} P_n(y) e^{-y^2} \stackrel{?}{=} 0$$

Sei $|y| \geq 1$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |P_n(y)| &= |c_0 + c_1 y + \dots + c_{3n} y^{3n}| \\ &\leq (|c_0| + |c_1| + \dots + |c_{3n}|) \cdot y^{3n} \\ &= C \cdot y^{3n} \end{aligned}$$

Gilt nun $y^{3n} \cdot e^{-y^2} \rightarrow 0$ für $y \rightarrow \infty$?

$$\frac{y^{3n}}{e^{y^2}} < \frac{y^{3n}}{\frac{y^{4n}}{(2n)!}} = \frac{(2n)!}{y^n} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0$$

$$\left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^{2k}}{k!} > \frac{y^{2 \cdot 2n}}{(2n)!} \right]$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f^{(n)}(x) = 0.$$

Nach einem früheren Satz existiert dann auch $f^{(n)}(0) = 0$.

4.4.2 Hilfssatz

Sei I ein Intervall und $a \in I$. Ist f nun $(n+1)$ -mal differenzierbar in I mit $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n)}(a) = 0$, dann gilt für $x \in I$ und $x \neq a$:

$$\frac{f(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

ξ liegt dabei zwischen x und a .

Beweis: mit Induktion.

$n = 0$:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \stackrel{\text{MWS}}{=} f'(\xi)$$

$n \mapsto n + 1$: Sei $g = f'$.

g ist $(n + 1)$ -mal differenzierbar und $g(a) = \dots = g^{(n)}(a) = 0$.

Induktionsvoraussetzung:

$$\frac{f'(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{g(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Induktionsschluß:

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{(x-a)^{n+2}} &\stackrel{\text{vMWS}}{=} \frac{f'(\xi_1)}{(n+2)(\xi_1-a)^{n+1}} = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+2)(n+1)!} \\ &= \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \end{aligned}$$

Dabei liegt ξ_1 zwischen a und x und ξ liegt zwischen a und ξ_1 .

4.4.3 Definition: Das Taylorpolynom

f sei n -mal differenzierbar im Intervall I und $a \in I$. Dann heißt

$$T_n(x; a) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

n -tes Taylorpolynom von f .

4.4.4 Bemerkung

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \iff T_n(x; a) \rightarrow f(x) \text{ für } n \rightarrow \infty \quad (4.4)$$

Es gilt $T_n^{(k)}(x; a)|_{x=a} = f^{(k)}(a)$ für $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

4.4.5 Satz von Taylor

Ist f $(n + 1)$ -mal differenzierbar in I und ist $a \in I$, dann gilt

$$f(x) = T_n(x; a) + R_n(x; a)$$

mit

$$R_n(x; a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Dabei liegt ξ zwischen a und x . R_n heißt *Lagrange-Restglied*. Ist $f \in C^\infty(I)$, so gilt (4.4) genau dann, wenn $R_n(x; a) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Beweis: Setze $g(x) = f(x) - T_n(x; a)$. $g(x)$ ist $(n + 1)$ -mal differenzierbar und $g(a) = g'(a) = \dots = g^{(n)}(a) = 0$.

Hilfssatz $\Rightarrow$ Es ex. ein ξ zwischen a und x , so daß

$$R_n(x; a) = g(x) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1},$$

da $f^{(n+1)} = g^{(n+1)} + \underbrace{T_n^{(n+1)}}_{=0}$.

4.4.6 Beispiele

1. **Beispiel:** Behauptung:

$$f(x) = (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \text{ für } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0$$

Sei $a = 0$:

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f'(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1} \\ f''(x) &= \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2} \\ &\vdots \\ f^{(n)}(x) &= \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} \\ \frac{f^{(n)}(0)}{n!} &= \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} = \binom{\alpha}{n} \end{aligned}$$

Damit sind:

$$\begin{aligned} T_n(x; 0) &= \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k \\ R_n(x; 0) &= \binom{\alpha}{n+1} (1+\xi)^{\alpha-n-1} x^{n+1} \end{aligned}$$

Behauptung: Für $-1 < x < 1$ gilt

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

Beweis: für $-\frac{1}{2} < x < 1$: Zuerst für $0 < x < 1$: Sei $0 < \xi < x$ und wähle $n > \alpha$:

$$|R_n(x; 0)| = \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| x^{n+1} \underbrace{|(1+\xi)^{\alpha-n-1}|}_{\leq (1+0)^{\alpha-n-1}=1} \leq \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| x^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

weil $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^{n+1}$ für $-1 < x < 1$ konvergiert.

Nun für $-1 < x < 0$: Sei $x < \xi < 0$ und wähle $n > \alpha$:

$$|R_n(x; 0)| = \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot |x|^{n+1} \cdot \underbrace{|(1+\xi)^{\alpha-n-1}|}_{\leq (1+0)^{\alpha-n-1}=1} \leq \left| \binom{\alpha}{n+1} \right| \cdot |1+\xi|^\alpha \cdot \left(\frac{|x|}{1-|x|} \right)^{n+1} \stackrel{?}{\rightarrow} 0$$

$R_n(x; 0) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, falls $\frac{|x|}{1-|x|} < 1 \iff |x| < \frac{1}{2}$. Hier: $x > -\frac{1}{2}$.

2. **Beispiel:** Die Arcussinusreihe:

Behauptung:

$$\begin{aligned} \arcsin x &= x + \frac{1}{2 \cdot 3} x^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)(2n+1)} x^{2n+1} \text{ für } -1 < x < 1. \end{aligned}$$

Beweis: Für $-\frac{1}{2} < x^2 < 1$, d. h. für $|x| < 1$ gilt:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \arcsin x &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= (1-x^2)^{-1/2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n \quad (\text{vgl. 1. Beispiel})\end{aligned}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ hat Konvergenzradius } 1$$

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{d}{dx} \arcsin x$$

Aus $\arcsin(0) = 0$, $f(0) = 0$ und $f'(x) = \frac{d}{dx} \arcsin x$ folgt: $\arcsin x = f(x)$.
Betrachte nun die Stelle 1:

$$\begin{aligned}(-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} &= (-1)^n \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{1 \cdot 2 \dots n} \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1} = ?\end{aligned}$$

Falls konvergent: Wert nach dem Abelschen Grenzwertsatz

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \arcsin x = \frac{\pi}{2}.$$

Konvergiert diese Reihe?

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^N \frac{1 \dots (2n-1)}{2 \dots (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^N \frac{1 \dots (2n-1)}{2 \dots (2n)} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ &\leq \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Konvergenz.

4.5 Extremwertrechnung

4.5.1 Definition: relatives Minimum/Maximum

Sei $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$. f hat in x_0 ein *relatives Maximum* [*Minimum*], wenn es ein $\delta > 0$ gibt mit $f(x_0) \geq f(x)$ [$f(x_0) \leq f(x)$] für alle $x \in I$ mit $|x - x_0| < \delta$.

4.5.2 Satz

Ist $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, so gilt:

- (1) Hat f in $x_0 \in (a, b)$ ein relatives Extremum, so ist $f'(x_0) = 0$.
- (2) Wechselt f' in x_0 das Vorzeichen, so hat f in x_0 ein relatives Extremum.
  - (i) Ist $f'(x) < 0$ in $(x_0 - \delta, x_0)$ und $f'(x) > 0$ in $(x_0, x_0 + \delta)$ ist es ein Minimum.
  - (ii) Ist $f'(x) > 0$ in $(x_0 - \delta, x_0)$ und $f'(x) < 0$ in $(x_0, x_0 + \delta)$ ist es ein Maximum.

Beweis:

(1) Siehe Satz von Rolle (4.2.3 auf Seite 74).

(2) hier für (i):

f ist fallend in $(x_0 - \delta, x_0)$ und f ist wachsend in $(x_0, x_0 + \delta)$. Das heißt, f hat ein Minimum in x_0 .

4.5.3 Satz

1. Ist $f \in C^2(I)$, $I = (a, b)$, $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ [$f''(x_0) < 0$], so hat f in x_0 ein relatives Minimum [Maximum].
2. Ist $f \in C^{2n}(I)$ mit $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(2n-1)}(x_0) = 0$ und $f^{(2n)}(x_0) > 0$ [$f^{(2n)}(x_0) < 0$], so liegt in x_0 ein relatives Minimum [Maximum].

Beweis: Zu 2. mit dem Satz von Taylor:

$$\begin{aligned} f(x) &= T_{2n-1}(x; x_0) + R_{2n-1}(x; x_0) \\ &= f(x_0) + \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \underbrace{(x - x_0)^{2n}}_{>0 \text{ für } x \neq x_0} \end{aligned}$$

mit ξ zwischen x und x_0 .

z. B. $f^{(2n)}(x_0) > 0$:

Da $f^{(2n)}$ stetig ist, existiert ein $\delta > 0$ mit $f^{(2n)}(\xi) > 0$ in $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$$f(x) - f(x_0) = \underbrace{\frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!}}_{>0 \text{ für } |x-x_0| < \delta} \cdot \underbrace{(x - x_0)^{2n}}_{>0} > 0 \text{ für } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Also ist $f(x) > f(x_0) \Rightarrow$ relatives Minimum.

Für $f^{(2n)} < 0$ und relatives Minimum genauso.

4.5.4 Beispiele

Beispiel 1: $f(x) = x + \frac{1}{x}$ in $(0, \infty)$.

$$\text{Es ist } f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \begin{cases} < 0 & \text{für } 0 < x < 1 \\ = 0 & \text{für } x = 1 \\ > 0 & \text{für } x > 1 \end{cases}.$$

Also hat f ein Minimum bei 1.

Beispiel 2: $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ in $\mathbb{R}$.

Es ist $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$, sowie $f''(x) = (2 - 4x + x^2)e^{-x}$ und $f(x) > 0$ für $x \neq 0$.

Es ist $f'(x) = 0$ genau für $x = 0$ und $x = 2$. Dabei ist $f''(0) = 2$ und $f''(2) = -2e^{-2} < 0$.

$f''(x) \stackrel{!}{=} 0$ für $x = 2 \pm \sqrt{2}$

Abbildung 4.6: $f(x) = x + \frac{1}{x}$

Abbildung 4.7: $f(x) = x^2 e^{-x}$

5 Das Riemannsche Integral¹

5.1 Darbousche Summen

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$ und $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sei beschränkt (d. h. $f(I)$ ist beschränkt).

$Z = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ mit $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ heißt *Zerlegung* von $[a, b]$.

$I_k = [x_{k-1}, x_k]$ ist ein Teilintervall der Zerlegung und es werden definiert: $m_k = \inf f(I_k)$ und $M_k = \sup f(I_k)$.

5.1.1 Definition: Darbousche Ober- und Untersumme

$$s(Z) := \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) m_k$$

heißt (Darbousche) *Untersumme* und

$$S(Z) := \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) M_k$$

heißt (Darbousche) *Obersumme*. Es gilt:

$$s(Z) \leq S(Z)$$

5.1.2 Hilfssatz

(a) Ist $Z \subseteq Z'$ (d. h. Z' ist eine Verfeinerung von Z), dann gilt

$$s(Z) \leq s(Z') \text{ und } S(Z) \geq S(Z').$$

(b) Es gilt: $s(Z_1) \leq S(Z_2)$ für jedes Paar von Zerlegungen Z_1 und Z_2 .

Beweis:

(a) Induktion nach der Zahl p der Punkte in $Z' \setminus Z$:

p = 1: Sei $Z' = Z \cup \{\xi\}$. ξ teile das Intervall I_k . Es ist dann $m'_k := \inf f([x_{k-1}, \xi]) = \inf f(I'_k) \geq m_k$ und $m''_k := \inf f([\xi, x_k]) = \inf f(I''_k) \geq m_k$. Daraus folgt dann

$$\begin{aligned} s(Z) - s(Z') &= (x_k - x_{k-1})m_k - ((\xi - x_{k-1})m'_k + (x_k - \xi)m''_k) \\ &= \underbrace{(x_k - \xi)}_{>0} \cdot \underbrace{(m_k - m''_k)}_{\leq 0} + \underbrace{(\xi - x_{k-1})}_{>0} \cdot \underbrace{(m_k - m'_k)}_{\leq 0} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

Zeige genauso $S(Z) - S(Z') \geq 0$.

Induktionsschritt als Aufgabe.

(b) Sei $Z_1 \cup Z_2 = Z$ gemeinsame Verfeinerung von Z_1 und Z_2 . Dann gilt:

$$s(Z_1) \stackrel{(a)}{\leq} s(Z) \leq S(Z) \stackrel{(a)}{\leq} S(Z_2)$$

¹Version 184 vom 13. Februar 2006

5.1.3 Definition: Unteres und oberes Integral

$$\int_a^b f(x) dx := \sup\{s(Z) : Z \text{ Zerlegung von } [a, b]\}$$

heißt *unteres Integral* von f und

$$\int_a^b f(x) dx := \inf\{S(Z) : Z \text{ Zerlegung von } [a, b]\}$$

heißt *oberes Integral* von f . Es gilt

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx$$

5.1.4 Definition: Integrierbar, Riemannintegral

Gilt

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx,$$

so heißt f (Riemann-)integrierbar. Kurz $f \in R([a, b])$. Der gemeinsame Wert ist das Riemannintegral von f :

$$\int_a^b f(x) dx$$

5.1.5 Riemannsches Integritätskriterium

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. f ist genau dann integrierbar, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine Zerlegung Z gibt mit $S(z) - s(Z) < \varepsilon$.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ f sei integrierbar, d. h. das obere und das untere Integral sind gleich. Sei nun $\varepsilon > 0$. Zu diesem ε existiert eine Zerlegung Z_1 mit

$$s(Z_1) > \int_a^b f(x) dx - \varepsilon.$$

Genauso existiert eine Zerlegung Z_2 mit

$$S(Z_2) < \int_a^b f(x) dx + \varepsilon.$$

Sei nun $Z = Z_1 \cup Z_2$. Dann gilt:

$$S(z) - s(Z) \stackrel{(a)}{\leq} S(Z_2) - s(Z_1) = S(Z_2) - \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f(x) dx - s(Z_1) \leq 2\varepsilon.$$

„ $\Leftarrow$ “ Sei $\varepsilon > 0$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx &\stackrel{\forall Z}{\leq} S(Z) - s(Z) \stackrel{\exists Z}{<} \varepsilon \\ &\Rightarrow \underbrace{\int_a^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx}_{\geq 0} \leq 0 \\ &\Rightarrow \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad \Rightarrow f \in R([a, b]) \end{aligned}$$

5.1.6 Satz: Monotone Funktionen sind integrierbar

Jede monotone Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ und Z_n eine äquidistante Zerlegung mit $x_k = a + \frac{b-a}{n} \cdot k$ für $k = 0, 1, \dots, n$. Sei z. B. $f \nearrow$:

$$\begin{aligned} S(Z_n) - s(Z_n) &= \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot (f(x_k) - f(x_{k-1})) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) \\ &= (b-a)(f(b) - f(a)) \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ für große } n \end{aligned}$$

5.1.7 Beispiele

(1) Es ist $\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$. Wähle eine äquidistante Zerlegung mit $x_k = a + \frac{b-a}{n} \cdot k = a + hk$.

$$\begin{aligned} S(Z) &= h \sum_{k=1}^n e^{a+kh} = he^a \sum_{k=1}^n (e^h)^k \\ &= he^a e^h \sum_{k=0}^{n-1} (e^h)^k = he^a e^h \frac{e^{nh} - 1}{e^h - 1} \\ &= \frac{h}{e^h - 1} e^h e^a (e^{b-a} - 1) = \frac{h}{e^h - 1} e^h (e^b - e^a) \\ s(Z) &= \frac{h}{e^h - 1} (e^b - e^a) \end{aligned}$$

für $n \rightarrow \infty$, d. h. $h \rightarrow 0$ gilt:

$$\left. \begin{array}{l} s(Z_n) \rightarrow e^b - e^a \\ S(Z_n) \rightarrow e^b - e^a \end{array} \right\} = \int_a^b e^x dx$$

$$e^b - e^a \leftarrow s(Z_n) \leq \int_a^b e^x dx \leq S(Z_n) \rightarrow e^b - e^a$$

(2) Für $p \in \mathbb{N}$ und $0 < a < b$ ist $\int_a^b x^p = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}$.

Äquidistante Zerlegung: $x_k = \frac{b-a}{n} \cdot k + a$

$$S(Z) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{b-a}{n} \cdot k \right)^p = ?$$

Geometrische Zerlegung: $q = \sqrt[p]{b/a}$, $x_k = a \cdot q^k$ für $k = 0, 1, \dots, n$:

$$\begin{aligned} S(Z) &= \sum_{k=1}^n (a \cdot q^k - a \cdot q^{k-1}) \cdot a^p \cdot (q^k)^p = a^{p+1} \sum_{k=1}^n (q - 1) \cdot q^{k-1} \cdot q^{kp} \\ &= (q - 1) \cdot a^{p+1} \cdot \frac{1}{q} \sum_{k=1}^n (q^{p+1})^k \\ &= (q - 1) \cdot a^{p+1} \cdot \frac{1}{q} \cdot q^{p+1} \sum_{k=0}^{n-1} (q^{p+1})^k \\ &= (q - 1) \cdot a^{p+1} \cdot \frac{1}{q} \cdot q^{p+1} \cdot \frac{q^{(p+1)n} - 1}{q^{p+1} - 1} \\ &= a^{p+1} \cdot q^p \cdot \left((b/a)^{p+1} - 1 \right) \cdot \frac{q - 1}{q^{p+1} - 1} \\ &= q^p (b^{p+1} - a^{p+1}) \cdot \frac{q - 1}{q^{p+1} - 1} \rightarrow 1 \cdot (b^{p+1} - a^{p+1}) \cdot \frac{1}{p+1} \text{ für } n \rightarrow \infty, \text{ d. h. } q \rightarrow 1 \\ s(Z) &= \dots \rightarrow \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1} \end{aligned}$$

5.1.8 Hilfssatz

1. Für $a < c < b$ gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

2. Ist $f(x) \leq g(x)$ in $[a, b]$, dann ist

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

3. Ist f in $x_0 \in [a, b]$ stetig, dann ist

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt, \quad F(a) = 0$$

in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$.

Entsprechendes gilt für das untere Integral.

Beweis:

- (a) „ $\leq$ “ Sei Z Zerlegung von $[a, b]$,
 $Z_1 = \{c\} \cup (Z \cap [a, c])$ und $Z_2 = \{c\} \cup (Z \cap [c, b])$:

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &\leq S(Z_1) + S(Z_2) \\ &= S(Z \cup \{c\}) \leq S(Z) \\ \Rightarrow \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

- „ $\geq$ “ Sei Z_1 Zerlegung von $[a, c]$ und Z_2 Zerlegung von $[c, b]$.
 Setze $Z = Z_1 \cup Z_2$. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x) dx \leq S(Z) = S(Z_1) + S(Z_2)$$

Für festes Z_2 gilt dann

$$\int_a^b f(x) dx - S(Z_2) \leq \int_a^c f(x) dx,$$

also

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx - \int_a^c f(x) dx &\leq S(Z_2) \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx - \int_a^c f(x) dx &\leq \int_c^b f(x) dx \\ \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \Rightarrow \text{Beh.} \end{aligned}$$

- (b) klar nach Definition.

- (c) Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und F definiert wie in der Behauptung.
 Zu zeigen ist: f stetig in $x_0 \in [a, b] \Rightarrow F'(x_0) = f(x_0)$.

Bemerkung: Für $c \in \mathbb{R}$ ist $\int_a^b c dx = (b - a) \cdot c$.

Beweis: für den Fall $x_0 < b$. Sei $h > 0$. Dann ist

$$\begin{aligned} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) &\stackrel{(a)}{=} \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt - f(x_0) \\ &= \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \end{aligned}$$

5 Das Riemannsche Integral

Sei nun $\varepsilon > 0$. Dann existiert in $\delta > 0$ mit $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ für $t \in [a, b]$ mit $|t - x_0| < \delta$. Also gilt: $-\varepsilon < f(t) - f(x_0) < \varepsilon$. Daraus folgt:

$$-\varepsilon = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} -\varepsilon dt < \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) < \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} \varepsilon dt = \varepsilon$$

das heißt:

$$\left| \frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) \right| < \varepsilon \text{ für } 0 < h < \delta.$$

Genauso für $-\delta < h < 0$, d. h. $F'(x_0) = f(x_0)$.

5.1.9 Satz: Stetige Funktionen sind integrierbar

Jede stetige Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar, d. h. $C([a, b]) \subseteq R([a, b])$.

1. Beweis: Sei für $a < x \leq b$

$$H(x) := \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \text{ mit } H(a) = 0$$

Nach (c) ist dann in $[a, b]$

$$H'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

d. h. $H(x) = H(a) = 0$ für $x \in [a, b]$, insbesondere ist $H(b) = 0$, also gilt:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$

2. Beweis: Sei f gleichmäßig stetig. Dann existiert zu $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ mit $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ für alle $x, y \in [a, b]$ mit $|x - y| < \delta$. Wähle eine Zerlegung $Z = \{x_0, \dots, x_n\}$ mit $x_k - x_{k-1} < \delta$ für $k = 1, 2, \dots, n$. Dann gilt:

$$S(Z) - s(Z) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})(f(\xi_k) - f(\eta_k))$$

mit $\max_{I_k} f(x) = f(\xi_k)$ mit $\xi_k \in I_k$ und $\min_{I_k} f(x) = f(\eta_k)$ mit $\eta_k \in I_k$. Daraus folgt:

$$S(Z) - s(Z) < \varepsilon \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = (b - a)\varepsilon.$$

Nach dem Riemannkriterium ist dann $f \in R([a, b])$.

5.1.10 Satz

Ist $F \in C^1([a, b])$ und $F' = f$, so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Beweis: Sei $H(x) = \int_a^x f(t) dt$ mit $H(a) = 0$. Es ist dann $H \in C^1([a, b])$ mit $H'(x) = f(x)$. $\Rightarrow F(x) = H(x) + \text{const.}$ Für $x = a$ gilt dann $F(a) = 0 + \text{const.}$

$$\int_a^b f(x) dx = H(b) = F(b) - F(a)$$

5.2 Riemannsche Summen

5.2.1 Definition: Riemannsche Zwischensumme

Ist Z eine Zerlegung, so setzt man

$$\sigma(Z, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}).$$

σ heißt *Riemannsche Zwischensumme* zum Zwischenpunktsystem (ZWPS) $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, wobei $\xi_k \in I_k$ ist.

5.2.2 Hilfssatz

Es gilt

$$s(Z) \leq \sigma(Z, \xi) \leq S(Z)$$

und

$$\begin{aligned} s(Z) &= \inf\{\sigma(Z, \xi) : \xi \text{ ZWPS}\} \\ S(Z) &= \sup\{\sigma(Z, \xi) : \xi \text{ ZWPS}\} \end{aligned}$$

Beweis: Die Ungleichung $s(Z) \leq \sigma(Z, \xi) \leq S(Z)$ ist klar.

Sei nun $\varepsilon > 0$. Dazu gibt es ein $\xi_k \in I_k$ ($k = 1, \dots, n$) mit $f(\xi_k) < m_k + \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \sigma(Z, \xi) &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \\ &< \sum_{k=1}^n (m_k + \varepsilon)(x_k - x_{k-1}) \\ &= s(Z) - \varepsilon(b - a) \end{aligned}$$

Die Rechnung ist für $S(Z)$ analog.

Aufgabe: Falls f stetig ist, ist $s(Z) = \min\{\sigma(Z, \xi) : \xi \text{ ZWPS}\}$.

5.2.3 Satz

f ist genau dann Riemann-integrierbar und $\int_a^b f(x) dx = J$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ eine Zerlegung Z gibt mit $|\sigma(Z, \xi) - J| < \varepsilon$ für alle ZWPS ξ .

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ Sei $f \in R([a, b])$ und $J = \int_a^b f(x) dx$. Zu $\varepsilon > 0$ existiert eine Zerlegung Z mit $S(Z) - s(Z) < \varepsilon$.
Sei nun ξ ein beliebiges ZWPS. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\sigma(Z, \varepsilon) - J &\leq S(Z) - J \leq S(Z) - s(Z) < \varepsilon \\ J - \sigma(Z, \varepsilon) &\leq J - s(Z) \leq S(Z) - s(Z) < \varepsilon\end{aligned}$$

Daraus folgt: $|\sigma(Z, \xi) - J| < \varepsilon$.

„ $\Leftarrow$ “ Zu $\varepsilon > 0$ existiere nach Voraussetzung ein Z mit $-\varepsilon < \sigma(Z, \xi) - J < \varepsilon$ für alle ZWPS ξ .
Mit dem Hilfssatz 5.2.2 folgt dann:

$$\begin{aligned}S(Z) - J &\leq \varepsilon \\ -\varepsilon &\leq s(Z) - J \\ \Rightarrow S(Z) - s(Z) &\leq \varepsilon + J - (J - \varepsilon) = 2\varepsilon \\ \Rightarrow f &\in R([a, b]).\end{aligned}$$

Mit dem 1. Teil folgt dann $\int_a^b f(x) dx = J$.

5.2.4 Satz

Seien (Z_m) Zerlegungen von $[a, b]$ mit $|Z_m| \rightarrow 0$ für $m \rightarrow \infty$ (Dabei ist $|Z| := \max |I_k|$ das Feinheitsmaß—die Länge des längsten Teilintervalls—von Z). Dann gilt:

(a)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} s(Z_m) = \int_a^b f(x) dx$$

(b)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S(Z_m) = \int_a^b f(x) dx$$

(c)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma(Z_m, \xi^{(m)}) = \int_a^b f(x) dx$$

für beliebige ZWPS $\xi^{(m)}$ für Z_m , falls $f \in R([a, b])$.

Beweis: In 5.2.6.**5.2.5 Hilfssatz**

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt mit $|f(x)| \leq M$ für $a \leq x \leq b$. Z und Z_0 seien Zerlegungen von $[a, b]$, Z_0 habe $p + 2$ Teilpunkte. Dann gilt:

$$\begin{aligned}s(Z \cup Z_0) &\leq s(Z) + 2pM|Z \cup Z_0| \\ S(Z \cup Z_0) &\leq s(Z) - 2pM|Z \cup Z_0|.\end{aligned}$$

Beweis: Für die Untersumme. Per Induktion nach p :

$p = 1$: Sei $Z_0 = \{x, \bar{x}, b\}$ mit $\bar{x} \in [x_{k-1}, x_k] = I_k$. Teile I_k auf in $I'_k = [x_{k-1}, \bar{x}]$ und $I''_k = [\bar{x}, x_k]$.
Setze $m'_k = \inf f(I'_k)$ und $m''_k = \inf f(I''_k)$.

Es gilt $m_k = m'_k$ oder $m_k = m''_k$, und es gilt $-M \leq m_k, m'_k, m''_k \leq M$. Damit ist

$$\begin{aligned} s(Z \cup Z_0) - s(Z) &= (\bar{x} - x_{k-1})m'_k + (x_k - \bar{x})m''_k - (x_k - x_{k-1})m_k \\ &\leq \max\{\bar{x} - x_{k-1}, x_k - \bar{x}\} \cdot 2M \\ &\leq |Z \cup Z_0| \cdot 2M \end{aligned}$$

$p \mapsto p + 1$: Selber machen.

5.2.6 Beweis für 5.2.4

(a) Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein Z_0 mit

$$\underline{J} = \int_a^b f(x) dx,$$

so daß $\underline{J} - s(Z_0) < \varepsilon$ ist. Z_0 habe $p + 2$ Teilpunkte. Dann gilt:

$$s(Z_n \cup Z_0) \leq s(Z_n) + 2pM|Z_n \cup Z_0|.$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \underline{J} &\geq s(Z_n) \\ &\geq s(Z_n \cup Z_0) - 2pM|Z_n \cup Z_0| \\ &\geq s(Z_0) - 2pM|Z_n| \\ &> \underline{J} - \varepsilon - 2pM|Z_n| \end{aligned}$$

damit ist $0 \leq \underline{J} - s(Z_n) < \varepsilon + 2pM|Z_n| < 2\varepsilon$ für $n \geq n_0$, d. h. $|\underline{J} - s(Z_n)| < 2\varepsilon$ für $n \geq n_0$.

(b) $S(Z_n)$ genauso.

(c) Sei $J = \int_a^b f(x) dx$. Dann ist:

$$\begin{aligned} s(Z_m) &\leq \sigma(Z_m, \xi^{(m)}) \leq S(Z_m) \\ \underbrace{s(Z_m) - J}_{\rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)} &\leq \sigma(Z_m, \xi^{(m)}) - J \leq \underbrace{S(Z_m) - J}_{\rightarrow 0 (m \rightarrow \infty)} \\ &\Rightarrow (\sigma(Z_m, \xi^{(m)}) - J) \rightarrow 0 \text{ für } m \rightarrow \infty \end{aligned}$$

5.2.7 Regeln für Riemann-integrierbare Funktionen

(a) $f, g \in R(I) \Rightarrow (f + g) \in R(I)$ mit $\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

(b) $f \in R(I), c \in \mathbb{R} \Rightarrow (cf) \in R(I)$ mit $\int_a^b (cf)(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$.

(c) $f, g \in R(I) \Rightarrow (fg) \in R(I)$.

(d) $g \in R(I)$, $|g(x)| \geq c > 0$ für $a \leq x \leq b \Rightarrow 1/g \in R(I)$.

(e) $f, g \in R(I)$, $f(x) \leq g(x)$ für $a \leq x \leq b \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

(f) $f \in R(I) \Rightarrow |f| \in R(I)$ und $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

(g) $f \in R([a, c])$ und $f \in R([c, b]) \Rightarrow f \in R([a, b])$
 mit $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Beweis:

(a),(b),(e): Sei (Z_n) eine Zerlegungsfolge mit $|Z_n| \rightarrow 0$ und ZWPSen $\xi^{(n)}$. Definiere nun $\sigma_n := \sigma(Z_n, \xi^{(n)})$. Aus den Regeln für konvergente Folgen folgen dann die Behauptungen (a), (b) und (e).

(c),(d),(f): Vorbemerkung: Gilt

$$|f(x) - f(y)| \leq C \sum_{j=1}^m |\varphi_j(x) - \varphi_j(y)|$$

und $\varphi_j \in R(I)$, dann ist $f \in R(I)$.

Beweis: Sei Z Zerlegung mit den Intervallen I_k . Es ist

$$\begin{aligned} M_k - m_k &= \sup f(I_k) - \inf f(I_k) \\ &= \sup \{(f(x) - f(y)) : x, y \in I_k\} \\ &\leq C \cdot \sup \left\{ \sum_{k=1}^m \varphi_j(x) - \varphi_j(y) : x, y \in I_k \right\} \\ &\leq C \cdot \sum_{j=1}^m \sup \varphi_j(I_k) - \inf \varphi_j(I_k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow S(Z; f) - s(Z; f) &\leq C \sum_{j=1}^m S(Z; \varphi_j) - s(Z; \varphi_j) \\ &\leq \varepsilon \text{ für geeignetes } Z \end{aligned}$$

$\Rightarrow f \in R(I)$.

(c) Es ist

$$\begin{aligned} |f(x) \cdot g(x) - f(y) \cdot g(y)| &= |(f(x) - f(y)) \cdot g(x) + (f(x) - g(y)) \cdot f(y)| \\ &\leq |f(x) - f(y)| \cdot M + |g(x) - g(y)| \cdot M \end{aligned}$$

Setze nun $\varphi_1 = f$ und $\varphi_2 = g$. M ist Schranke für g und f . Aus der Vorbemerkung folgt dann: $fg \in R(I)$.

(d)

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)} \right| &= \left| \frac{g(y) - g(x)}{g(y)g(x)} \right| \\ &\leq \frac{1}{c^2} \cdot |g(x) - g(y)| \end{aligned}$$

$\Rightarrow 1/g \in R(I)$.

(f) Es ist $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \Rightarrow |f| \in R(I)$. Dabei ist

$$\begin{aligned} |\sigma(Z, \xi, f)| &= \left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| \cdot (x_k - x_{k-1}) \\ &= \sigma(Z, \xi, |f|) \end{aligned}$$

oder mit (e): $-|f| \leq f \leq |f|$.

(g): schon bewiesen in 5.1.8 auf Seite 96.

5.2.8 Satz

Ist $f_n \in R(I)$ für $n = 1, 2, 3, \dots$ mit $f_n \rightarrow f$ gleichmäßig auf $[a, b]$, dann ist $f \in R(I)$ und

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein n_0 mit $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$ und $x \in I$. Für eine Zerlegung Z mit ZWPS ξ gilt:

$$|\sigma(Z, \xi, f) - \sigma(Z, \xi, f_n)| < \varepsilon(b - a)$$

Für die Zerlegungsfolge (Z_m) mit $|Z_m| \rightarrow 0$ und ZWPSen $\xi^{(m)}$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(Z_m, \xi^{(m)}, f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

$\Rightarrow f \in R(I)$ und $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

5.3 Hauptsatz der Diff.- und Integralrechnung

5.3.1 Mittelwertsatz der Integralrechnung

Ist $f: [a, b] \rightarrow [m, M]$ Riemann-integrierbar, dann gilt:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Ist f stetig, so gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi).$$

Beweis: Aus $m \leq f(x) \leq M$ folgt $m \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b - a)$.

Ist f stetig, so ist

$$\min_{x \in [a, b]} f(x) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq \max_{x \in [a, b]} f(x),$$

d. h. es existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

5.3.2 Definition: Stammfunktion, unbestimmtes Integral

$F: I \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Stammfunktion* von $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, wenn $F' = f$ in I ist. Statt Stammfunktion nennt man F *unbestimmtes Integral* von f , kurz $\int f$.

5.3.3 Hauptsatz der Diff.- und Integralrechnung

(a) Hat $f \in R(I)$ ($I = [a, b]$) eine Stammfunktion F , so gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: F(x) \Big|_a^b.$$

(b) $f \in C([a, b])$ hat eine Stammfunktion:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ für } a \leq x \leq b.$$

Beweis:

(a) Sei Z_n mit $x_k^{(n)} = a + \frac{b-a}{n} \cdot k$, $k = 0, 1, \dots, n$, eine Folge von äquidistanten Zerlegungen. Dann ist

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{k=1}^n \left(F(x_k^{(n)}) - F(x_{k-1}^{(n)}) \right) \\ &\stackrel{\text{MWS}}{\text{Diff.}} = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^{(n)}) (x_k^{(n)} - x_{k-1}^{(n)}) \end{aligned}$$

mit $x_{k-1}^{(n)} < \xi_k^{(n)} < x_k^{(n)}$:

$$\begin{aligned} &= \sigma(Z_n, \xi^{(n)}) \\ &\rightarrow \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Eigentlich ist es „=“ statt „ $\rightarrow$ “, da $F(b) - F(a)$ konstant ist.

(b) schon bewiesen in Abschnitt 5.1.9 auf Seite 98.

5.3.4 Beispiel

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ ist divergent. Wie geht $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ gegen ∞ ?

$$\begin{aligned} s_n &< 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \log n \\ s_n &> \int_1^n \frac{1}{x} dx = \log n \\ \Rightarrow 0 &< \underbrace{s_n - \log n}_{=: c_n} < 1 \end{aligned}$$

Dabei ist $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \gamma$ die *Euler-Mascheronische Konstante*. c_n ist streng fallend, da

$$\begin{aligned} c_{n+1} - c_n &= \frac{1}{n+1} - \log(n+1) + \log n \\ &= \frac{1}{n+1} - [\log(n+1) - \log n] \\ &= \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \\ &< \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = 0, \end{aligned}$$

also ist c_n konvergent, da c_n auch beschränkt ist.

5.3.5 Partielle Integration

(a) Sind $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und hat $f'g$ eine Stammfunktion, so hat auch fg' eine Stammfunktion und es gilt

$$\int fg' = fg - \int f'g.$$

(b) Sind $f, g \in C^1([a, b])$, so gilt

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Beweis: (für (a), denn aus (a) folgt (b)):

$$\begin{aligned} (fg)' &= f'g + fg' \\ \Rightarrow fg' &= (fg)' - f'g \\ \Rightarrow \int fg' &= fg - \int f'g \end{aligned}$$

5.3.6 Substitutionsregel

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, und $\varphi: J \rightarrow I$ sei differenzierbar.

(a) Hat f eine Stammfunktion F , so hat $(f \circ \varphi)\varphi'$ eine Stammfunktion: $F \circ \varphi$

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int f(x) dx \quad (5.1)$$

(b) Hat $(f \circ \varphi)\varphi'$ eine Stammfunktion, so auch f und es gilt (5.1), falls $\varphi'(t) \neq 0$ in J .

(c) Ist f stetig in $I = [a, b]$, φ stetig differenzierbar in $J = [\alpha, \beta]$ mit $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$, dann gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Beweis:

(a) Mit der Kettenregel: Sei $G(t) = F(\varphi(t))$. Dann ist

$$\begin{aligned} G'(t) &= F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \\ &= f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \end{aligned}$$

$\Rightarrow F(\varphi(t))$ ist Stammfunktion von $f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$.

(b) φ ist injektiv. Die Umkehrfunktion sei ψ .
 ψ ist differenzierbar mit

$$\psi'(s) = \frac{1}{\varphi'(t)} \Big|_{t=\psi(s)}$$

Setze

$$g(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \text{ und } f(x) = g(\psi(x))\psi'(x)$$

Wende dann Teil (a) auf g mit Stammfunktion G an.

Dann hat $f = (g \circ \psi) \cdot \psi'$ eine Stammfunktion $F = (G \circ \psi)$.

(c) f hat Stammfunktion F , da f stetig ist.

$G(x) = F(\varphi(x))$ ist stetig differenzierbar mit $G'(x) = F'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$.

Es ist also

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx &= F(x) \Big|_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \\ &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= G(\beta) - G(\alpha) \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt. \end{aligned}$$

5.3.7 Beispiel

$$\begin{aligned}
\int (\sin x)^3 \cdot e^{\cos x} dx &= \left. \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ t = \cos x = \varphi(x) \\ \frac{dt}{dx} = \varphi' = -\sin x \\ dt = \varphi'(x) dx = -\sin x dx \end{array} \right| \\
&= - \int e^t \cdot (1 - t^2) dt \\
&= -e^t + \int t^2 e^t dt \\
&= -e^t + t^2 e^t - \int 2te^t dt \\
&= -e^t + t^2 e^t - 2te^t + 2 \int e^t dt \\
&= -e^t + (t^2 - 2t + 2)e^t \\
&= e^t(t^2 - 2t + 1) \\
&= e^t(t - 1)^2 \\
&= e^{\cos x}(\cos x - 1)^2
\end{aligned}$$

5.3.8 Satz von Taylor mit Integralrestglied

f sei $(n + 1)$ -mal differenzierbar in I , $a \in I$. Dann ist

$$\begin{aligned}
T_n(x; a) &= \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(a)}{j!} (x - a)^j \\
f(x) &= T_n(x; a) + R_n(x; a)
\end{aligned}$$

dabei gilt:

1. $R_n(x; a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$ mit ξ zwischen a und x (*Lagrange-Restglied*, schon bewiesen in 4.4.5 auf Seite 87).
2. Ist $f^{(n+1)}$ integrierbar, so ist

$$R_n(x; a) = \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt,$$

genannt *Integralrestglied*.

Beweis: mit Induktion nach n .

$n = 0$: Es ist $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ (Hauptsatz).

$(n - 1) \mapsto n$: Es ist

$$\begin{aligned} f(x) &= T_{n-1}(x; a) + \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt \\ &= T_{n-1}(x; a) + \left(-\frac{(x-t)^n}{(n-1)!n} f^{(n)}(t) \right) \Big|_a^x \\ &\quad + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \\ &= T_{n-1}(x; a) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + R_n(x; a) \\ &= T_n(x; a) + R_n(x; a) \end{aligned}$$

5.3.9 Satz von Bernstein

Ist $f \in C^\infty((-r, r))$ und ist $f^{(n)}(x) \geq 0$ für $-r < x < r$ für (fast) alle n , dann gilt in $(-r, r)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Bemerkung: Der Satz gilt auch, falls $(-1)^n f^{(n)}(x) \geq 0$ in $-r < x < r$ für fast alle n .

Beweis: Für den Fall $f^{(n)}(x) \geq 0$ für alle n und x .

Sei zunächst $0 \leq x < r$.

Dann ist $R_n(x; 0; f) \geq 0$, d. h. $T_n(x; 0) \leq f(x)$, denn

$$T_{n+1}(x; 0) = T_n(x; 0) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}}_{\geq 0} \cdot \underbrace{x^{n+1}}_{\geq 0} \geq T_n(x; 0)$$

Damit ist auch in $0 \leq x < r$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \leq f(x).$$

Es gilt:

$$R_n(x; 0; f) \leq R_{n-1}(x; 0; f) \leq \dots \leq R_0(x; 0; f)$$

Wähle nun zu x_0 , $0 \leq x_0 < r$ ein $q > 1$ so, daß $q \cdot x_0 < r$ ist.

Setze $F(x) := f(q \cdot x)$ in $[0, r/q)$. Dann ist $F^{(n)}(x) = q^n f^{(n)}(qx)$, $F^{(n)}(x) \geq 0$, und es gilt

$$R_n(x; 0; F) \leq R_0(x; 0; F).$$

Daraus folgt dann

$$\begin{aligned} R_n(x; 0; f) &= \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \cdot \frac{F^{(n+1)}(\frac{t}{q})}{q^n} dt \end{aligned}$$

Einschub: Aus $q > 1$ folgt $\frac{t}{q} < t$.

Es ist $F^{(n+1)}(s) \geq 0$ und $F^{(n)}$ ist wachsend, also ist $F^{(n)}(t/q) \leq F^{(n)}(t)$.

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{q^n} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} F^{(n+1)}(t) dt \\ &= \frac{1}{q^n} R_n(x; 0; F) \\ &\leq \frac{1}{q^n} R_0(x; 0; F) \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Da $R_n(x; 0; f) \geq 0$ ist,

gilt $R_n(x; 0; f) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Also gilt für $0 \leq x < r$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(x).$$

Sei nun $-r < x \leq 0$.

Sei $t \leq 0$.

Dann ist $f^{(n)}(t) \leq f^{(n)}(-t)$,

da $f^{(n)}$ monoton wachsend ist.

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \right| \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{Subst.:} \\ s = -t \\ ds = -dt \end{array} \right| \\ &= \left| \int_0^{-x} \frac{(x+s)^n}{n!} f^{(n+1)}(-s) ds \right| \\ &\leq \int_0^{-x} \frac{(x+s)^n}{n!} f^{(n+1)}(s) ds \\ &= R_n(-x; 0; f) \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$\Rightarrow R_n(x; f) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ auch für $-r < x \leq 0$.

5.3.10 Beispiel

$f(x) = (1-x)^\alpha$ für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}_0$. Es ist

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\alpha(1-x)^{\alpha-1} \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(1-x)^{\alpha-n} \\ f^{(n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(\alpha-n)(1-x)^{\alpha-n-1} \\ &= (-1)^n (\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)(1-x)^{\alpha-n} \cdot (-1)(\alpha-n)(1-x)^{-1} \\ &= f^{(n)}(x) \cdot \underbrace{(n-\alpha)}_{>0} \cdot \underbrace{(1-x)^{-1}}_{>0} \end{aligned}$$

für $n > \alpha$ und $-1 < x < 1$. Also haben für $n > \alpha$ und $-1 < x < 1$ alle Ableitungen immer das selbe Vorzeichen. Mit dem Satz von Bernstein gilt nun in $-1 < x < 1$

$$(1-x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n.$$

Weitere Beispiele: $\log(1+x)$ oder $\arcsin x$: Für $-1 < x < 1$ gilt:

$$(\arcsin x)' = (1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-1)^n x^{2n}$$

Also ist

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

5.4 Integration von rationalen Funktionen

5.4.1 Problem

Sei $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ mit teilerfremden Polynomen P und Q , d. h. es gibt kein nicht konstantes Polynom H mit $P(x) = P_1(x)H(x)$ und $Q(x) = Q_1(x)H(x)$. Was ist dann

$$\int R(x) dx?$$

5.4.2 Prinzip

1. Schritt: Polynomdivision mit Rest:

$$R(x) = P_0(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)} \text{ mit } \text{Grad}(P_1) < \text{Grad}(Q).$$

2. Schritt: Zerlege Q in elementare Faktoren der Form $(x-\xi)^r$ und/oder $(x^2+2bx+a)^s$ mit $a > b^2$ (Die Existenz der Zerlegung wird in 6.3.14 auf der Seite 135 gezeigt).

3. Schritt: Schreibe $\frac{P_1(x)}{Q(x)}$ als endliche Summe von Funktionen

$$\frac{\alpha_1}{x-\xi} + \dots + \frac{\alpha_r}{(x-\xi)^r}$$

bzw.

$$\frac{\beta_1 + \gamma_1 x}{x^2 + 2bx + a} + \dots + \frac{\beta_s + \gamma_s x}{(x^2 + 2bx + a)^s}$$

(Partialbruchzerlegung, Beweis in 6.3.16 auf Seite 137)

4. Schritt: Bestimme Stammfunktionen für

$$\frac{\alpha_j}{(x-\xi)^j} \text{ und } \frac{\beta_j + \gamma_j x}{(x^2 + 2bx + a)^j}.$$

5.4.3 Beispiele

1. Beispiel:

$$R(x) = \frac{x+2}{x^4-x^2}$$

1. Schritt: entfällt

2. Schritt: Es ist $x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = x^2(x-1)(x+1)$.

3. Schritt:

$$R(x) = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1}$$

Was sind die Werte für A , B , C und D ?. Es ist

$$\begin{aligned} A &= \lim_{x \rightarrow 0} x^2 R(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x^2-1} = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)R(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2(x+1)} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)R(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x^2(x-1)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

B ist so nicht berechenbar. Bis hierhin ist folgendes bekannt:

$$R(x) = \frac{-2}{x^2} - \frac{B}{x} + \frac{3/2}{x-1} + \frac{-1/2}{x+1}.$$

Setze einen speziellen Wert ein, z. B. $x = 2$:

$$\begin{aligned} \frac{4}{16-4} &= \frac{-2}{4} + \frac{B}{2} + \frac{3/2}{1} + \frac{-1/2}{3} \\ B &= 2 \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{6} \right) = -1 \end{aligned}$$

4. Schritt:

$$\begin{aligned} \int R(x) dx &= -2 \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{x} + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} \\ &= \frac{2}{x} - \log|x| + \frac{3}{2} \log|x-1| - \frac{1}{2} \log|x+1| \end{aligned}$$

2. Beispiel:

$$R(x) = \frac{x+3}{x^5-x^4+2x^3-2x^2+x-1}$$

1. Schritt: entfällt

2. Schritt: Es ist $Q(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 1 = (x-1)(x^2+1)^2$.

3. Schritt:

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2} \\ A &= \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)R(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{(x^2+1)^2} = 1 \end{aligned}$$

Was sind B , C , D und E ?

Der Hauptnenner von R ist $(x-1)(x^2+1)^2$.

Der Zähler ist $A(x^2+1)^2 + (Bx+C)(x^2+1)(x-1) + (Dx+E)(x-1)$.

Für den Zähler gilt also

$$\begin{aligned} x+3 &= x^4(A+B) + x^3(-B+C) + x^2(2A-C+B+D) \\ &\quad + x(-B+C-D+E) + (A-C-E) \end{aligned}$$

Es bildet sich ein lineares Gleichungssystem mit

$$\begin{array}{rccccrcr} x^4: & A & +B & & & & = 0 \\ x^3: & & -B & +C & & & = 0 \\ x^2: & 2A & +B & -C & +D & & = 0 \\ x^1: & & -B & +C & -D & +E & = 1 \\ x^0: & A & & -C & & -E & = 3 \end{array}$$

Das Ergebnis ist

$$A = 1 \qquad B = -1 \qquad C = -1 \qquad D = -2 \qquad E = -1$$

Also ist

$$R(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+1} - \frac{2x+1}{(x^2+1)^2}$$

4. Schritt:

$$\begin{aligned} \int R(x) dx &= \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \int \frac{dx}{x^2+1} \\ &\quad - \int \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx - \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} \\ &= \log|x-1| - \frac{1}{2} \log(1+x^2) - \arctan x \\ &\quad - \dots - \dots \end{aligned}$$

Die letzten beiden Terme sind leider noch nicht berechenbar.

5.4.4 Allgemeines zum 4. Schritt

Typ I:

$$\int \frac{dx}{(x-\xi)^p} \quad \text{für } p = 1, 2, \dots$$

Für $p = 1$ ist

$$\int \frac{dx}{x-\xi} = \log|x-\xi| \quad (x \neq \xi)$$

und für $p \geq 2$ ist

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-\xi)^p} &= \frac{1}{(x-\xi)^{p-1}} \cdot \left(\frac{1}{1-p} \right) \\ &= \frac{1}{1-p} \cdot (x-\xi)^{-p+1}. \end{aligned}$$

Typ II:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{A + Bx}{(x^2 + 2bx + a)^p} dx &= \int \frac{A + Bx}{((x + b)^2 + a - b^2)^p} dx \\
 &= \left. \begin{array}{l} \text{setze } a - b^2 = D^2, D > 0 \\ \text{Substitution:} \\ x + b = Dt \\ x = Dt - b \\ dx = D dt \end{array} \right| \\
 &= \int \frac{A + B(Dt - b)}{((Dt)^2 + D^2)^p} D dt \\
 &= \int \frac{A + BDt - Bb}{(D^2(t^2 + 1))^p} D dt \\
 &= \alpha \int \frac{dt}{(t^2 + 1)^p} + \beta \int \frac{2t}{(t^2 + 1)^p} dt
 \end{aligned}$$

Nun müssen die beiden Integrale berechnet werden. Zuerst

$$\int \frac{2t}{(t^2 + 1)^p} dt.$$

Für $p = 1$ ist

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = \log(1 + t^2)$$

und für $p > 1$ ist

$$\int \frac{2t}{(1 + t^2)^p} dt = \frac{1}{1 - p} \cdot \frac{1}{(1 + t^2)^{p-1}}.$$

Nun die Berechnung von

$$\int \frac{dt}{(1 + t^2)^p} :$$

Für $p = 1$ ist

$$\int \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan t = J_1$$

und für $p \geq 2$ ist

$$\begin{aligned}
 J_p &= \int \frac{dt}{(1 + t^2)^p} \\
 &= \int \underbrace{1}_{u'} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1 + t^2)^p}}_v dt \\
 &= \frac{t}{(1 + t^2)^p} - \int t(-p)(1 + t^2)^{-p-1} 2t dt \\
 &= \frac{t}{(1 + t^2)^p} + 2p \int \frac{(t^2 + 1) - 1}{(1 + t^2)^{p+1}} dt \\
 &= \frac{t}{(1 + t^2)^p} + 2pJ_p - 2pJ_{p+1} \\
 &\Rightarrow 2pJ_{p+1} = (2p - 1)J_p + \frac{t}{(1 + t^2)^p}
 \end{aligned}$$

Es ergibt sich damit die Rekursionsformel

$$J_{p+1} = \left(1 - \frac{1}{2p}\right) J_p + \frac{1}{2p} \cdot \frac{t}{(1+t^2)^p}$$

z. B. ist

$$\begin{aligned} J_2 &= \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) J_1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{2} \arctan t + \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{1+t^2}. \end{aligned}$$

5.4.5 Auf rationale Funktionen zurückföhrbare Integrale

(a)

$$\int R(e^{ax}) dx, R \text{ rational und } a \neq 0$$

$$\begin{aligned} \int R(e^{ax}) dx &= \left| \begin{array}{l} \text{Subst.:} \\ t = e^{ax} \\ \frac{dt}{dx} = ae^{ax} = at \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{a} \int R(t) \frac{1}{t} dt = \int R_1(t) dt \end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{\cosh x} &= \frac{e^{2x}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2}} dx \\ &= 2 \int \frac{e^{3x}}{e^{2x} + 1} dx \\ &= \left| \begin{array}{l} t = e^x \\ \frac{dt}{t} = dx \end{array} \right| \\ &= 2 \int \frac{t^3}{t^2 + 1} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= 2 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{t^2 + 1} dt \\ &= 2 \int \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1}\right) dt \\ &= 2t - 2 \arctan t \\ &= 2e^x - 2 \arctan(e^x) \end{aligned}$$

(b)

$$\int R \left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \right) dx \text{ mit } n \geq 2 \text{ und } ad - bc \neq 0$$

$$\begin{aligned}
\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) &= \left| \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ \frac{ax+b}{cx+d} = t^n \\ ax+b = (cx+d)t^n \\ x(a-ct^n) = dt^n - b \\ x = \frac{-b+dt^n}{a-ct^n} \\ \frac{dx}{dt} = \frac{-ad+bc}{(a-ct^n)^2} nt^{n-1} \end{array} \right| \\
&= \int R\left(\frac{dt^n - b}{a - ct^n}, t\right) \cdot \frac{bc - ad}{(a - ct^n)^2} dt \\
&= \int R_1(t) dt
\end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{\frac{x}{x+1}} dx &= \left| \begin{array}{l} \frac{x}{x+1} = t^2 \\ x = t^2(x+1) \\ x(1-t^2) = t^2 \\ x = \frac{t^2}{1-t^2} \\ \frac{dx}{dt} = \frac{2t}{(1-t^2)^2} \end{array} \right| \\
&= \int t \frac{2t}{(1-t^2)^2} dt \\
&= 2 \int \frac{t^2}{(1-t^2)^2} dt
\end{aligned}$$

(c)

$$\int R(\cos x, \sin x) dx$$

$$\begin{aligned}
\int R(\cos x, \sin x) dx &= \left| \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ t = \tan(x/2) \\ \frac{dt}{dx} = (1+t^2)^{-\frac{1}{2}} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| \\
&= \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\
&= \int R_1(t) dt
\end{aligned}$$

Beispiel:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{2 + \cos x} &= \left| \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ t = \tan(x/2) \end{array} \right| \\
&= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} dt = 2 \int \frac{dt}{3+t^2} \\
&= \left| \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ t = \sqrt{3} \cdot u \\ \frac{dt}{du} = \sqrt{3} \end{array} \right| \\
&= 2 \int \frac{1}{3+3u^2} \sqrt{3} du \\
&= \frac{2\sqrt{3}}{3} \int \frac{du}{1+u^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan u = \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \left(\frac{t}{\sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan \left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}} \right)
\end{aligned}$$

(d)

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + 2bx + c}) dx \text{ mit } a \neq 0$$

Zuerst quadratisches Ergänzen des Termes unter der Wurzel

$$\begin{aligned}
ax^2 + 2bx + c &= a \left(x^2 + \frac{2b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \\
&= a \left(\left(x + \frac{b}{a} \right)^2 - \underbrace{\frac{b^2}{a^2} + \frac{c}{a}}_{=: \Delta} \right)
\end{aligned}$$

$\Delta = 0$ wurde schon behandelt, denn in diesem Fall handelt es sich um eine rationale Funktion von x .

(i) $a > 0, \Delta = D^2 > 0$:

$$\begin{aligned}
\int R(x, \sqrt{ax^2 + 2bx + c}) dx &= \left. \begin{array}{l} \text{Substitution:} \\ x + \frac{b}{a} = Dt \\ dx = D dt \end{array} \right| \\
&= \int R \left(Dt - \frac{b}{a}, \sqrt{a(t^2 + 1)D^2} \right) \cdot D dt \\
&= \int \tilde{R}(t, \sqrt{t^2 + 1}) dt
\end{aligned}$$

(ii) $a > 0, \Delta = -D^2 < 0$: Dann ist

$$ax^2 + 2bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{a} \right)^2 - D^2 \right)$$

Substituiere dann $x + \frac{b}{a} = DT, dx = D dt$:

$$\begin{aligned}
\int R(x, \sqrt{ax^2 + 2bx + c}) dx &= \int R \left(Dt - \frac{b}{a}, \sqrt{aD^2(t^2 - 1)} \right) \cdot D dt \\
&= \int \tilde{R}(t, \sqrt{t^2 - 1}) dt
\end{aligned}$$

(iii) $a < 0, \Delta = -D^2 < 0$:Substituiere hier $x + \frac{b}{a} = Dt, dx = D dt$:

$$\begin{aligned}
\int R(x, \sqrt{ax^2 + 2bx + c}) dx &= \int R \left(Dt - \frac{b}{a}, \sqrt{a(D^2t^2 - D^2)} \right) \cdot D dt \\
&= \int R \left(Dt - \frac{b}{a}, \sqrt{-aD^2\sqrt{1 - t^2}} \right) \cdot D dt \\
&= \int \tilde{R}(t, \sqrt{1 - t^2}) dt
\end{aligned}$$

Beispiele zu den 3 Fällen:

(i)

$$\int \sqrt{x^2 + 2x + 3} dx = ?$$

Es ist $x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2$, es liegt Typ (i) vor.Substituiere $x + 1 = t\sqrt{2}$, $dx = \sqrt{2} dt$:

$$\int \dots = \int \sqrt{2(t^2 + 1)}\sqrt{2} dt = 2 \int \sqrt{t^2 + 1} dt$$

(ii)

$$\int \sqrt{x^2 + 2x - 3} dx = ?$$

Es ist $x^2 + 2x - 3 = (x + 1)^2 - 4$, es liegt Typ (ii) vor.Substituiere $x + 1 = 2t$, $dx = 2 dt$:

$$\int \dots = \int \sqrt{4(t^2 - 1)} \cdot 2 dt = 4 \int \sqrt{t^2 - 1} dt$$

(iii)

$$\int \sqrt{-x^2 + 2x} dx = ?$$

Es ist $-x^2 + 2x = -(x^2 + 2x) = -((x - 1)^2 - 1)$, es liegt Typ (iii) vor.Substituiere $x - 1 = t$, $dx = dt$:

$$\int \dots = \int \sqrt{-(t^2 - 1)} dt = \int \sqrt{1 - t^2} dt$$

Restliche Integrale in den 3 Fällen:(i) $\sqrt{t^2 + 1}$. Substitution: $t = \sinh u$, $dt = \cosh u du$, $t^2 + 1 = \sinh^2 u + 1 = \cosh^2 u$

$$\int \dots = \int \tilde{R}(\sinh u, \cosh u) \cdot \cosh u du = \int \hat{R}(\sinh u, \cosh u) du = \int \check{R}(e^u) du$$

Am Beispiel:

$$\begin{aligned} 2 \int \sqrt{1 + t^2} dt &= 2 \int \cosh u \cdot \cosh u du \\ &= 2 \int \left(\frac{e^u + e^{-u}}{2} \right)^2 du \\ &= \frac{1}{2} \int (e^{2u} + 2 + e^{-2u}) du \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} e^{2u} + 2u - \frac{1}{2} e^{-2u} \right) \\ &= \frac{1}{4} \exp \left(2 \operatorname{arsinh} \frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) + \operatorname{arsinh} \frac{x+1}{\sqrt{2}} \\ &\quad - \frac{1}{4} \exp \left(-2 \operatorname{arsinh} \frac{x+1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

(ii) $\sqrt{t^2 - 1}$ .Substitution: $t = \cosh u$, $dt = \sinh u \, du$, $t^2 - 1 = \cosh^2 u - 1 = \sinh^2 u$:

$$\begin{aligned} \int \dots &= \int \tilde{R}(\sinh u, \cosh u) \cdot \sinh u \, du \\ &= \int \hat{R}(\sinh u, \cosh u) \, du \\ &= \int \check{R}(e^u) \, du \end{aligned}$$

Am Beispiel:

$$\begin{aligned} 4 \int \sqrt{t^2 - 1} \, dt &= 4 \int \sinh u \cdot \sinh u \, du \\ &= \int (e^u - e^{-u})^2 \, du = \dots \end{aligned}$$

(iii) $\sqrt{1 - t^2}$ .Substitution: $t = \sin u$ (oder $t = \cos u$), $dt = \cos u \, du$, $1 - t^2 = \cos^2 u$.

$$\begin{aligned} \int \dots &= \int \tilde{R}(\sin u, \cos u) \cdot \cos u \, du \\ &= \int \hat{R}(\sin u, \cos u) \, du = \dots \end{aligned}$$

Am Beispiel:

$$\int \sqrt{1 - t^2} \, dt = \int \cos^2 u \, du = \dots$$

5.5 Uneigentliche Integrale

5.5.1 Definition

Sei I ein Intervall mit den Endpunkten a und b , $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Die Funktion f heißt *lokal integrierbar*, wenn sie über jedes Intervall $[\alpha, \beta] \subseteq I$ integrierbar ist. f heißt *uneigentlich integrierbar* über I , wenn

$$\lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^c f(x) \, dx + \lim_{\beta \rightarrow b} \int_c^{\beta} f(x) \, dx =: \int_a^b f(x) \, dx$$

für beliebiges $c \in I$ existiert. $\int_a^b f(x) \, dx$ ist dann das uneigentliche Integral von f über I . Man sagt auch $\int_a^b f(x) \, dx$ konvergiert (sonst: divergiert).

5.5.2 Bemerkungen

(1) Ist $I = [a, b]$ und f auf I lokal integrierbar, dann ist f integrierbar über $[a, b]$, insbesondere ist $|f(x)| \leq M$ in $[a, b]$.

Für $a < \alpha < c$ gilt:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^c f(x) dx - \int_a^\alpha f(x) dx \right| &= \left| \int_\alpha^c f(x) dx \right| \\ &\leq (\alpha - a)M \\ &\rightarrow 0 \text{ für } \alpha \rightarrow a \end{aligned}$$

d. h. das uneigentliche Integral ist gleich dem Riemann-Integral.

- (2) Die Sätze beziehen sich meist auf $[a, b]$. Genauso gelten sie für $(a, b]$ und (a, b) .
- (3) Ist f uneigentlich integrierbar über $(a_0, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_{n-1}, a_n)$, so heißt f uneigentlich integrierbar über (a_0, a_n) mit

$$\int_{a_0}^{a_n} f(x) dx = \sum_{j=1}^n \int_{a_{j-1}}^{a_j} f(x) dx.$$

5.5.3 Beispiele

- (1) $[a, b) = [0, \infty)$, $f(x) = e^{-x}$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-x} dx &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} \int_0^\beta e^{-x} dx \\ &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} -e^{-x} \Big|_0^\beta \\ &= \lim_{\beta \rightarrow \infty} (1 - e^{-\beta}) = 1 \end{aligned}$$

- (2)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_\alpha^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} 2\sqrt{x} \Big|_\alpha^1 \\ &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} 2 - 2\sqrt{\alpha} = 2 \end{aligned}$$

- (3)

$$\int_\alpha^1 \frac{dx}{x} = \log x \Big|_\alpha^1 = -\log \alpha \rightarrow \infty \text{ für } \alpha \rightarrow 0$$

divergiert.

- (4)

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} \text{ divergiert.}$$

(5) Für welche c ist

$$\int_0^1 x^{-c}$$

konvergent? Sei zuerst $c \geq 1$. Dann ist $x^{-c} \geq x^{-1}$ in $(0, 1] \Rightarrow$ Divergenz für $c \geq 1$. Sei nun $c < 1$:

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^1 x^{-c} dx &= \left. \frac{x^{-c+1}}{-c+1} \right|_{\alpha}^1 \\ &= \frac{1}{1-c} (1 - \alpha^{1-c}) \rightarrow \frac{1}{1-c} \text{ für } \alpha \rightarrow 0 \end{aligned}$$

(6) Aufgabe: Für welche c ist folgendes Integral konvergent:

$$\int_1^{\infty} x^{-c} dx$$

5.5.4 Cauchy Kriterium

$\int_a^b f(x) dx$ konvergiert genau dann in $I = [a, b]$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein β_0 gibt mit

$$|F(\beta') - F(\beta)| = \left| \int_{\beta}^{\beta'} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

für $\beta_0 < \beta < \beta' < b$.

Beweis: Setze $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ für $a \leq x < b$:

$$\int_a^b f(x) dx \text{ existiert} \iff \lim_{x \rightarrow b} F(x) \text{ existiert}$$

Dann Cauchy Kriterium für Grenzwerte.

5.5.5 Dirichlet Kriterium

f sei stetig differenzierbar in $[a, \infty)$ mit $f' \leq 0$ und $f(x) \rightarrow 0$. g sei stetig in $[a, \infty)$ und $G(x) = \int_a^x g(t) dt \leq M$. Dann konvergiert

$$\int_a^{\infty} f(x) \cdot g(x) dx.$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \int_{\beta}^{\beta'} f(x)g(x) dx &= f(x)G(x) \Big|_{\beta}^{\beta'} - \int_{\beta}^{\beta'} f'(x)G(x) dx \\ &= f(\beta')G(\beta') - f(\beta)G(\beta) - \int_{\beta}^{\beta'} f'(x)G(x) dx \end{aligned}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein β_0 mit $0 \leq f(x) < \varepsilon$ für $x \geq \beta_0$. Es ist auch $|G(x)| \leq M$ für alle $x \geq a$.

Sei nun $\beta_0 < \beta < \beta'$:

$$\begin{aligned} \int_{\beta}^{\beta'} f(x)g(x) dx &\leq 2\varepsilon \cdot M + \int_{\beta}^{\beta'} (-f'(x)) \cdot M dx \\ &= 2M\varepsilon + M(f(\beta) - f(\beta')) \\ &< 4M\varepsilon \end{aligned}$$

Mit dem Cauchy Kriterium folgt dann die Konvergenz des Integrals.

5.5.6 Beispiele

(1) Das Integral $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ konvergiert.

Es ist $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 0$, also existiert $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$.

Zeige nun, daß das Integral $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sin x dx$ existiert:

Setze $f(x) = \frac{1}{x}$ und $g(x) = \sin x$. Es ist dann

$$|G(x)| = \left| \int_1^x \sin t dt \right| = |\cos 1 - \cos x| \leq 2$$

und $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$ mit $f' \leq 0$.

Also existiert das Integral nach Dirichlet.

(2) Das Integral $\int_0^{\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ divergiert.

Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$\begin{aligned} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx &\geq \frac{1}{\pi(n+1)} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin x| dx \\ &= \frac{1}{\pi(n+1)} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \frac{2}{\pi(n+1)} \end{aligned}$$

Also ist

$$\int_{\pi}^{(N+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \leq \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+1}$$

$$\rightarrow \infty \text{ für } N \rightarrow \infty$$

Also divergiert das Integral.

5.5.7 Definition: Absolute Konvergenz

Ist f lokal integrierbar in I und konvergiert $\int_a^b |f(x)| dx$, dann heißt f *absolut integrierbar* und $\int_a^b f(x) dx$ heißt dann absolut konvergent.

Bemerkung: Aus der absoluten Konvergenz folgt die Konvergenz des Integrals: Für $\varepsilon > 0$ und $\beta_0 < \beta < \beta' < b$ ist

$$\left| \int_{\beta}^{\beta'} f(x) dx \right| \leq \int_{\beta}^{\beta'} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

5.5.8 Majorantenkriterium

Ist f lokal integrierbar über I , gilt $|f(x)| \leq g(x)$ in I und ist $\int_a^b g(x) dx$ konvergent, so ist auch $\int_a^b |f(x)| dx$ konvergent.

Beweis: „bei b “: Für $\beta_0 < \beta < \beta' < b$ ist

$$\left| \int_{\beta}^{\beta'} f(x) dx \right| \leq \int_{\beta}^{\beta'} \beta^{\beta'} g(x) dx < \varepsilon.$$

5.5.9 Nützliche Majoranten

$[1, \infty)$: $x^{-\alpha}$ für $\alpha > 1$

$[2, \infty)$: $\frac{1}{x} (\log x)^{-\alpha}$ für $\alpha > 1$

$[3, \infty)$: $\frac{1}{x} \frac{1}{\log x} \frac{1}{(\log(\log x))^{\alpha}}$ für $\alpha > 1$

$(0, 1]$: $x^{-\alpha}$ für $\alpha < 1$

$(0, \frac{1}{2}]$: $\frac{1}{x} |\log x|^{-\alpha}$ für $\alpha < 1$

$(0, \frac{1}{3}]$: $\frac{1}{x} \frac{1}{|\log x|} |\log(\log x)|^{-\alpha}$ für $\alpha < 1$

Beweis: für $\frac{1}{x}(\log x)^{-\alpha}$. Es ist

$$\int_2^b \frac{dx}{x(\log x)^\alpha} = \left| \begin{array}{l} \text{Subst.:} \\ x = e^t \\ dx = e^t dt \end{array} \right| = \int_{\log 2}^{\log b} \frac{dt}{t^\alpha}$$

für $b \rightarrow \infty$ ist dann

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x(\log x)^\alpha} = \int_{\log 2}^\infty \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Dieses Integral existiert, da $\alpha > 1$ ist (es existiert nicht für $\alpha \leq 1$).

5.5.10 Satz über die majorisierte Konvergenz

f_n sei uneigentlich integrierbar über I , $|f_n(x)| \leq g(x)$ in I für alle n und $\int_a^b g(x) dx$ existiere. Außerdem konvergiere f_n gleichmäßig gegen f in jedem $[\alpha, \beta] \subseteq I$. Dann ist f absolut integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Beweis: f ist absolut integrierbar, da f über jedem Intervall $[\alpha, \beta] \subseteq I$ Riemann-integrierbar ist und $|f(x)| \leq g(x)$ ist.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $\alpha > a$ und $\beta < b$ so, daß

$$\int_a^\alpha g(x) dx + \int_\beta^b g(x) dx < \varepsilon$$

ist. Wähle n_0 so, daß für $n \geq n_0$ und $\alpha \leq x \leq \beta$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha}$$

ist. Dies ist möglich, da gleichmäßige Konvergenz vorliegt. Zusammen ist dann

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) - f_n(x) dx \right| &\leq \int_a^\alpha 2g(x) dx + \int_\beta^b 2g(x) dx + \int_\alpha^\beta \frac{\varepsilon}{\beta - \alpha} dx \\ &< 2\varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \end{aligned}$$

5.5.11 Beispiel: Die Gammafunktion

(Benannt nach J. B. Gamma, 1743-1807)

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$$

(1) Γ ist definiert und stetig in $0 < x < \infty$.

(2) $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, insbesondere ist $\Gamma(n+1) = n!$ für $n \in \mathbb{N}_0$.

Beweis:

(1) Sei $x > 0$ fest. Dann ist $e^{-t}t^{x-1}$ stetig bzgl. $t \in (0, \infty)$ und lokal integrierbar in $(0, \infty)$. Es ist

$$e^{-t}t^{x-1} \leq \left\{ \begin{array}{ll} t^{x-1} & \text{für } 0 < t \leq 1 \\ e^{-t}t^{x-1} & \text{für } t \geq 1 \end{array} \right\} = g(t).$$

g ist eine konvergente Majorante, denn es ist

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} \text{ existiert für } \alpha < 1, \alpha = 1 - x < 1$$

und

$$\underbrace{\frac{t^{x-1+2}}{e^t}}_{\leq C \text{ für } t \geq t_0} \rightarrow 0 \text{ für } t \rightarrow \infty$$

Also ist $e^{-t}t^{x-1} \leq C/t^2$ für $t \geq t_0$.

Stetigkeit im Punkt $x_0 > 0$:

Zeige, daß aus $x_n \rightarrow x_0$ die Aussage $\Gamma(x_n) \rightarrow \Gamma(x_0)$ folgt.

Wähle $x_0, x_n \in [a, b] \subseteq (0, \infty)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(x_n) - \Gamma(x_0) &= \int_0^\infty e^{-t}t^{x_n-1} dt - \int_0^\infty e^{-t}t^{x_0-1} dt \\ &\stackrel{?}{\rightarrow} 0 \text{ für } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Gilt hier also

$$\int_0^\infty f_n(t) dt \longrightarrow \int_0^\infty f(t) dt?$$

Sei $t > 0$ und setze $\varphi(x) = e^{-t}t^{x-1}$. Es ist dann

$$\begin{aligned} |\varphi(x_n) - \varphi(x_0)| &= |x_n - x_0| \cdot |\varphi'(\xi_n)| \\ &\leq |x_n - x_0| \cdot C \text{ für alle } t \in [\alpha, \beta], \end{aligned}$$

denn es ist

$$\varphi'(x) = e^{-t} \frac{1}{x} \frac{d}{dx} e^{x \log t} = e^{-t} \frac{1}{t} \log t \cdot t^x,$$

also

$$|\varphi'(x)| \leq \begin{cases} 1 \frac{1}{\alpha} |\log \alpha| & \text{für } \alpha \leq t < 1 \\ e^{-1} (\log \beta) \beta^b & \text{für } 1 \leq t \leq \beta \end{cases}$$

Setze dann

$$C = \max \left(\frac{|\log \alpha|}{\alpha}, \frac{(\log \beta) \beta^b}{e} \right).$$

Damit ist dann für $a \leq x_0, x_n \leq b$ und $a \leq \xi_n \leq b$:

$$|e^{-t}t^{x_n-1} - e^{-t}t^{x_0-1}| \leq C \cdot \underbrace{|x_n - x_0|}_{\substack{\rightarrow 0 \\ \text{für } n \rightarrow \infty}} \text{ für } \alpha \leq t \leq \beta$$

Also konvergiert $e^{-t}t^{x_n-1}$ gleichmäßig in $\alpha \leq t \leq \beta$ für $n \rightarrow \infty$ gegen $e^{-t}t^{x-1}$.
Suche nun eine Majorante $g(t)$ für $f_n(t)$:

$$f_n(t) = e^{-t}t^{x_n-1} = \begin{cases} t^{a-1} & \text{für } 0 < t \leq 1 \\ e^{-t}t^{b-1} & \text{für } t > 1 \end{cases} \\ = g(t)$$

Das Integral $\int_0^\infty g(x) dt$ konvergiert. Für die Stetigkeit nun: Majorisierte Konvergenz.

(2) Es ist

$$\Gamma(x+1) = \int_0^\infty e^{-t}t^x dt$$

und

$$\int_\alpha^\beta e^{-t}t^x dt = -e^{-t}t^x \Big|_\alpha^\beta + \int_\alpha^\beta e^{-t}xt^{x-1} dt \\ = e^{-\alpha}\alpha^x - e^{-\beta}\beta^x + x \int_\alpha^\beta e^{-t}t^{x-1} dt \\ \rightarrow x\Gamma(x) \text{ für } \alpha \rightarrow 0 \text{ und } \beta \rightarrow \infty$$

Also gilt:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

Induktionsanfang: $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$

Induktionsschluß: $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n \cdot (n-1)! = n!$

5.5.12 Integralkriterium für Reihen

Sei $f: [p, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ monoton fallend mit $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Dann konvergieren bzw. divergieren

$$\sum_{n=p}^\infty f(n) \text{ und } \int_p^\infty f(x) dx$$

gleichzeitig.

Im Konvergenzfall gilt:

$$\sum_{n=p+1}^\infty f(n) \leq \int_p^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=p}^\infty f(n)$$

Anwendungsbeispiele:

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^\alpha} \\ \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n(\log n)^\alpha}$$

konvergieren für $\alpha > 1$.

5 Das Riemannsche Integral

Beweis: Sei $n \leq x \leq n+1$. Dann ist $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$ und

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n) \text{ für } n = p, \dots, p+1, \dots, N$$

und

$$\sum_{n=p+1}^{N+1} f(n) = \sum_{n=p}^N f(n+1) \leq \int_p^N f(x) dx \leq \sum_{n=p}^N f(n).$$

Sei nun die Reihe konvergent. Dann ist

$$\sum_{n=p}^N f(n) \leq C \text{ für alle } N$$

$$\Rightarrow \int_p^N f(x) dx \leq C \text{ für alle } N \Rightarrow \int_p^{\infty} f(x) dx \text{ konvergiert.}$$

Sei andersherum das Integral konvergent. Dann ist

$$\int_p^N f(x) dx \leq C \text{ für alle } N,$$

und es folgt

$$\sum_{n=p+1}^N f(n) \leq C \text{ für alle } N \Rightarrow \sum_{n=p+1}^{\infty} f(n) \text{ konvergiert.}$$

6 Komplexe Zahlen und Funktionen¹

6.1 Komplexe Zahlen

6.1.1 Einführung

Seien $x, y \in \mathbb{R}$. Dann ist $z = x + iy$ eine komplexe Zahl. Auf den komplexen Zahlen werden eine Addition

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

und eine Multiplikation

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

definiert.

$$\mathbb{C} := \{x + iy : x, y \in \mathbb{R}\}$$

bildet mit dieser Addition und Multiplikation einen Körper. $\mathbb{R}^* = \{x + i \cdot 0 : x \in \mathbb{R}\}$ wird identifiziert mit $\mathbb{R}$. Die Abbildung

$$\begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R}^* \\ x & \mapsto x + i \cdot 0 \end{cases}$$

ist bijektiv. Diese Abbildung ist ein Isomorphismus für $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ und ein Holomorphismus für $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Es gilt:

$$\mathbb{R} = \{x + i \cdot 0 : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}.$$

6.1.2 Bezeichnungen

Sei $z = x + i \cdot y$. Dann heißt $\operatorname{Re} z = x$ *Realteil* und $\operatorname{Im} z = y$ *Imaginärteil* von z . $\bar{z} = x - iy$ ist die konjugiert komplexe Zahl zu z . Es gilt dabei $\bar{\bar{z}} = z$ und

$$\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \text{ bzw. } \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}).$$

Bei Addition und Multiplikation ist

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w} \text{ bzw. } \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}.$$

Für $z \neq 0$ ist

$$\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{1 \cdot \bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2},$$

insbesondere ist

$$\frac{1}{i} = \frac{\bar{i}}{1} = -i.$$

Bei der Division gilt für $w \neq 0$:

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}.$$

---

¹Version 184 vom 13. Februar 2006

$$|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

heißt *Betrag* von z (Abstand zwischen z und 0. Für reelles $z = x$ ist $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$ der reelle Betrag. Für den Betrag gilt:

$$|z \cdot w| = |z| \cdot |w| \text{ und } |i| = 1$$

Es ist

$$|-z| = |z| = |i \cdot z| = |\bar{z}|, \quad |\operatorname{Re} z| \leq |z| \text{ und } |\operatorname{Im} z| \leq |z|.$$

6.1.3 Dreiecksungleichung

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt die Dreiecksungleichung (vgl. 1.4.2 auf Seite 9):

$$|z + w| \leq |z| + |w|.$$

Gleichheit genau dann, wenn $z = 0$ oder $w = 0$ oder $w = \lambda z$ mit $\lambda > 0$. Auch die umgekehrte Dreiecksungleichung gilt:

$$||z| - |w|| \leq |z - w|$$

Beweis: Zuerst für die Dreiecksungleichung. Es ist

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) = (z + w) \cdot (\bar{z} + \bar{w}) \\ &= z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} = |z|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \\ &\leq |z|^2 + 2|z\bar{w}| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2 \cdot |z| \cdot |w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2 \end{aligned}$$

Also ist $|z + w| \leq |z| + |w|$. Nun die umgekehrte Dreiecksungleichung:

Es ist $|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|$, also $|z| - |w| \leq |z - w|$. Genauso wird $|w| - |z| \leq |w - z|$ gezeigt. Zusammen ist dann $||w| - |z|| \leq |w - z|$.

Jetzt der Beweis für die Gleichheitskriterien:

1. Für $z = 0$ oder $w = 0$ klar.
2. Seien nun $z, w \neq 0$: Es ist dann

$$\begin{aligned} \text{„} = \text{“} &\iff \operatorname{Re}(z\bar{w}) = |z| \cdot |w| = |z\bar{w}| \\ &\iff z\bar{w} \in \mathbb{R} > 0 \iff \frac{z\bar{w}}{w\bar{w}} > 0 \\ &\iff \frac{z}{w} > 0 \iff \frac{z}{w} = \frac{1}{\lambda} \text{ mit } \lambda > 0 \\ &\iff w = \lambda z \text{ mit } \lambda > 0 \end{aligned}$$

6.2 Folgen und Reihen

6.2.1 Definition: Komplexe Folge

Eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, $n \mapsto c_n$ heißt (*komplexe*) *Folge*: (c_n) . (c_n) heißt konvergent gegen $c \in \mathbb{C}$, wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n - c| = 0$ ist. Schreibweise: $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$ oder $c_n \rightarrow c$ für $n \rightarrow \infty$. Vergleiche auch 2.1.1 auf Seite 19.

Bemerkung: Sei $c_n = a_n + ib_n$ und $c = a + ib$ mit $a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}$. Es ist

$$\begin{aligned} |a_n - a| &\leq |c_n - c| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ |b_n - b| &\leq |c_n - c| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \end{aligned}$$

Es gilt also: $c_n \rightarrow c \iff a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$.

6.2.2 Beispiel

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{n+i}{1-2ni} = \frac{n+i}{1-2ni} \cdot \frac{1+2ni}{1+2ni} \\ &= \frac{n-2n+i(1+2n^2)}{1+4n^2} = \frac{-n}{1+4n^2} + i \frac{2n^2}{1+4n^2} \rightarrow \frac{i}{2} \\ c_n &= \frac{1+\frac{i}{n}}{\frac{1}{n}-2i} \xrightarrow{\text{Regeln}} \frac{1}{-2i} = \frac{i}{2} \end{aligned}$$

6.2.3 Vererbung der Grenzwertregeln

Alle Regeln für Grenzwerte von reellen Folgen gelten für komplexe Folgen weiter. Ausgeschlossen sind diejenigen, die auf der Anordnung der reellen Zahlen beruhen (Es gibt keine Anordnung unter den komplexen Zahlen).

Beispiel: Gelte $c_n \rightarrow c, d_n \rightarrow d$. Dann ist

$$|(c_n + d_n) - (c + d)| = |c_n - c + d_n - d| \leq |c_n - c| + |d_n - d| \rightarrow 0.$$

6.2.4 Definition: Komplexe Reihe

Sei (c_n) eine komplexe Folge und $\sum_{k=0}^n c_k$. Die unendliche Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ heißt konvergent, wenn die Folge (s_n) konvergiert. Es ist $\sum_{k=0}^{\infty} c_k := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

Bemerkung: Sei $c_n = a_n + ib_n$ mit $a_n, b_n \in \mathbb{R}$. Dann ist $s_n = \sum_{k=0}^n a_k + i \sum_{k=0}^n b_k$. Also ist $\sum c_n$ genau dann konvergent, wenn $\sum a_n$ und $\sum b_n$ konvergent sind. Es ist $\sum c_n = \sum a_n + i \sum b_n$.

6.2.5 Beispiel: Die geometrische Reihe

Was ist $\sum_{n=0}^{\infty} c^n$? Reeller Versuch: Sei $c^n = c_n = a_n + ib_n$ und $c = a + ib$:

$$\begin{aligned} c_1 &= a + ib \\ c_2 &= (a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab \\ c_3 &= (a + ib)^3 = a^3 + 3ia^2b - 3ab^2 - ib^3 = a^3 - 3ab^2 + i(3a^2b - b^3) \end{aligned}$$

Nun ein komplexer Versuch: Es ist

$$s_n = 1 + c + \dots + c^n = 1 + c(s_n - c^n).$$

Für $c = 1$ ist $s_n = n + 1$. Für $c \neq 1$ ist

$$s_n = \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c} \rightarrow \frac{1}{1 - c} \text{ falls } |c| < 1.$$

Für $|c| \geq 1$ ist die Reihe divergent (selber machen).

6.2.6 Cauchy Kriterium

Eine komplexe Folge (c_n) bzw. Reihe $\sum_n c_n$ ist genau dann konvergent, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt mit $|c_n - c_m| < \varepsilon$ bzw. $\left| \sum_{k=m+1}^n c_k \right| < \varepsilon$ für $n > m \geq n_0$ (Vergleiche mit 2.3.4, Seite 26, und 2.4.6, Seite 31). Dies bedeutet, daß $\mathbb{C}$ vollständig ist.

Beweis: Aufgabe (Zerlegung in Re- und Im-Teil).

6.2.7 Satz von Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte (d. h. $|c_n| \leq K$ für alle n) Folge (c_n) besitzt eine konvergente Teilfolge (vergleiche mit 2.3.3 auf Seite 26).

Beweis: Sei $c_n = a_n + ib_n$ mit $|a_n|, |b_n| \leq |c_n| \leq K$. Dann besitzt (a_n) eine konvergente Teilfolge (a_{n_k}) und (b_n) besitzt eine konvergente Teilfolge $(b_{n_{k_j}})$.

Zusammen konvergiert dann $c_{n_{k_j}} = a_{n_{k_j}} + ib_{n_{k_j}}$.

6.2.8 Dirichletkriterium

Sei (λ_n) eine reelle monotone Nullfolge und (c_n) eine komplexe Folge mit beschränkten Partialsummen $\left(\left| \sum_{k=0}^n c_k \right| \leq M \text{ für alle } n \in \mathbb{N} \right)$.

Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n c_n$ (siehe 2.4.9 auf Seite 32).

Beweis: Sei $c_n = a_n + ib_n$. Dann ist $\left| \sum_{k=0}^n a_k \right| \leq M$ und $\left| \sum_{k=0}^n b_k \right| \leq M$, also ist $\sum_k \lambda_k a_k + i \sum_k \lambda_k b_k$ konvergent.

6.2.9 Definition: Absolute Konvergenz

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ heißt absolut konvergent, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$ konvergiert (s. 2.5.1, Seite 34).

Bemerkung: Es ist $|a_n| \leq |c_n|$, $|b_n| \leq |c_n|$ und $|c_n| \leq |a_n| + |b_n|$.

$\sum c_n$ ist absolut konvergent $\iff \sum a_n$ und $\sum b_n$ sind absolut konvergent.

6.2.10 Regeln

- (1) Absolut konvergente Reihen sind konvergent (vgl. 2.5.2 auf Seite 34).
- (2) Absolut konvergente Reihen darf man beliebig umordnen, ohne an der Konvergenz oder am Reihenwert etwas zu ändern (siehe 2.6.4 auf Seite 39).
- (3) Cauchyprodukt: Sind $\sum a_n$ und $\sum b_n$ absolut konvergent ($a_n, b_n \in \mathbb{C}$), so gilt:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Dabei konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$ absolut (vgl. 2.6.10, Seite 43).

(4) Majorantenkriterium: Ist $|c_n| \leq \lambda_n$ für alle n und konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n$, dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut (vgl. 2.5.3, Seite 34).

(5) Wurzelkriterium: Ist $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < 1$, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut (vergleiche mit 2.5.4, Seite 34).

(6) Quotientenkriterium: Sind alle $c_n \neq 0$ und ist

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| < 1,$$

so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut (vgl. 2.5.5, Seite 35).

6.2.11 Beispiele

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c^n$ konvergiert absolut für $|c| < 1$.

Beweis mit Wurzelkriterium: $\sqrt[n]{|c_n|} = \sqrt[n]{|c|^n} = |c|$.

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ konvergiert absolut für alle $z \in \mathbb{C}$.

Dies ist für $z = 0$ klar.

Für $z \neq 0$: Quotientenkriterium

$$\left| \frac{\frac{z^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{z^n}{n!}} \right| = \frac{|z|}{n+1} \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

(3) Cauchyprodukt:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{n! z^k w^{n-k}}{k!(n-k)!}}_{=(z+w)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!}$$

6.3 Konvergenz und Stetigkeit

6.3.1 Definition: Stetigkeit

Sei $D \subseteq \mathbb{C}$, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$. f heißt *stetig* in $z_0 \in D$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ für alle $z \in D$ mit $|z - z_0| < \delta$ (vgl. 3.2.1, Seite 48). Geometrische Deutung von $|z - z_0| < \delta$: Kreisscheibe um z_0 mit dem Radius δ .

Bemerkung: Sei $u(z) = \operatorname{Re} f(z)$ und $v(z) = \operatorname{Im} f(z)$ für $z \in D$. Es ist $u, v: D \rightarrow \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Dann gilt:

$$f = u + iv \text{ ist stetig in } z_0 \iff u, v \text{ sind stetig in } z_0 \in D$$

6.3.2 Beispiel

Sei $f(z) = z^2$, $D = \mathbb{C}$ und $z_0 \in \mathbb{C}$. Es ist

$$|f(z) - f(z_0)| = |z^2 - z_0^2| = |(z - z_0)(z + z_0)|.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$. Wähle dazu $0 < \delta < 1$ so, daß $\delta \cdot (2|z_0| + 1) < \varepsilon$ ist. Aus $|z - z_0| < \delta$ folgt dann

$$|z| < \delta + |z_0| < 1 + |z_0|.$$

Damit ist dann

$$|f(z) - f(z_0)| < \delta \cdot (|z| + |z_0|) < \delta \cdot (1 + 2|z_0|) < \varepsilon.$$

Bemerkung: Die Regeln für stetige Funktionen $D \rightarrow \mathbb{C}$ gelten wie für reelle Funktionen $I \rightarrow \mathbb{R}$.

6.3.3 Definition: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f_n: D \rightarrow \mathbb{C}$ für $n = 0, 1, 2, \dots$. Die Folge (f_n) bzw. die Reihe $\sum_n f_n$ heißt gleichmäßig konvergent in D gegen $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ einen Index n_0 gibt mit

$$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \text{ und } z \in D$$

bzw.

$$\left| \sum_{k=0}^n f_k(z) - f(z) \right| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \text{ und } z \in D$$

(vergleiche auch 3.3.1, Seite 52).

Bemerkung: Sei $f_n = u_n + iv_n$ und $f = u + iv$. Dann gilt

$$f_n \rightarrow f \text{ gleichmäßig in } D \iff u_n \rightarrow u \text{ und } v_n \rightarrow v \text{ gleichmäßig in } D.$$

6.3.4 Satz

Konvergieren die f_n gleichmäßig gegen f in D , und sind alle f_n stetig in $z_0 \in D$, dann ist auch f stetig in D (siehe auch 3.3.4, Seite 53).

Beweis: Wie in $\mathbb{R}$.

6.3.5 Definition: Potenzreihe

Eine Reihe der Form

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \tag{6.1}$$

heißt *Potenzreihe* mit dem Mittelpunkt (Entwicklungspunkt) z_0 . (c_n) heißt Koeffizientenfolge. Es sind $z_0, c_n \in \mathbb{C}$. Für den Konvergenzradius r gilt

$$r = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

(6.1) konvergiert für $|z - z_0| < r$ und divergiert für $|z - z_0| > r$. Sonderfälle sind:

(a) $r = 0$: Nur Konvergenz in z_0 , „nirgends“.

- (b) $r = \infty$: Überall konvergent.
 (c) $0 < r < \infty$: Für $|z - z_0| = r$ ist keine Aussage möglich.
 (d) Ist $r > 0$, so ist (6.1) gleichmäßig konvergent in $|z - z_0| < r$.
 Siehe auch 3.4.1 und 3.4.2 ab Seite 55.

Beweis: Wie in $\mathbb{R}$.

6.3.6 Die Exponentialfunktion

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Die Exponentialfunktion ist definiert und stetig in $\mathbb{C}$. Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt die Funktionalgleichung $e^{z+w} = e^z \cdot e^w$. Außerdem ist $e^z \neq 0$ in $\mathbb{C}$, da für $w = -z$ gilt: $1 = e^z \cdot e^{-z}$ (siehe auch 3.5.1 und 3.5.2 ab Seite 62).

6.3.7 Eulersche Formel

Für $t \in \mathbb{R}$ gelten die Formeln:

$$e^{it} = \cos t + i \sin t$$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} \cos t + i \sin t &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} t^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it)^n}{n!} = e^{it} \end{aligned}$$

6.3.8 Bemerkungen

$$e^{z+2\pi i} = e^z \cdot e^{2\pi i} = e^z \cdot (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z \cdot (1 + 0) = e^z$$

Die Exponentialfunktion ist $2\pi i$ -periodisch. Es gilt

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

6.3.9 Additionstheoreme von Sinus und Cosinus

Seien $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$. Es gilt

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad \text{und} \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

und damit ist

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} \cdot e^{i\theta} &= \cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta + i(\cos \varphi \sin \theta + \sin \varphi \cos \theta) \\ e^{i\varphi} \cdot e^{i\theta} &= e^{i(\varphi+\theta)} = \cos(\varphi + \theta) + i \sin(\varphi + \theta) \end{aligned}$$

Es folgen dann die Additionstheoreme:

$$\begin{aligned} \cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta &= \cos(\varphi + \theta) \\ \cos \varphi \sin \theta + \sin \varphi \cos \theta &= \sin(\varphi + \theta) \end{aligned}$$

6.3.10 Polarkoordinaten

Einführung: Es gilt:

$$\begin{aligned} |e^{it}|^2 &= |\cos t + i \sin t|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &\Rightarrow |e^{it}| = 1 \text{ für } t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Satz: Jedes $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ läßt sich schreiben als

$$z = |z| \cdot e^{i\theta} \text{ mit } \theta \in \mathbb{R}.$$

θ ist dabei eindeutig bestimmt, wenn man sich z. B. auf $0 \leq \theta < 2\pi$ oder $-\pi < \theta < \pi$ beschränkt. θ heißt auch *Argument* von z : $\theta = \arg z$.

Beweis: Sei $|z| = 1$, $z \neq -1, 1$. Schreibe $z = x + iy$, $x^2 + y^2 = 1$, $y \neq 0$. Es existieren genau zwei Stellen $\theta_1 \in (0, \pi)$ und $\theta_2 \in (\pi, 2\pi)$ mit

$$\theta_2 = 2\pi - \theta_1, \quad \sin \theta_1 = -\sin \theta_2.$$

Es gilt:

$$|y| = \sqrt{1 - x^2} = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_j} = |\sin \theta_j|$$

Setze nun $\theta = \theta_1$ für $y > 0$ und $\theta = \theta_2$ für $y < 0$. Es gilt dann $\cos \theta = x$, $\sin \theta = y$. Andere θ 's gibt es nicht.

Für $z = -1$ ($\theta = \pi$) und $z = 1$ ($\theta = 0$) ist θ eindeutig bestimmt.

Sei nun $|z| \neq 1$ und $z \neq 0$. Es ist $z = |z| \cdot \underbrace{\frac{z}{|z|}}_{|\dots|=1} = |z| \cdot e^{i\theta}$.

6.3.11 Potenzen

Für $z = |z| \cdot e^{i\theta}$ ist $z^2 = |z| \cdot |z| \cdot e^{i\theta} \cdot e^{i\theta} = |z|^2 e^{2i\theta}$ und $z^n = |z|^n e^{in\theta}$.

Beweis: Per Induktion (selber machen).

6.3.12 Wurzeln

Problem: Sei $a = |a|e^{i\alpha}$ ($0 \leq \alpha < 2\pi$) gegeben und $z^n = a$. Gesucht ist z . Falls $a = 0$ ist $z = 0$. Sonst wird der Ansatz $z = r \cdot e^{i\theta}$ gemacht:

$$\begin{aligned} z^n = a &\iff r^n e^{in\theta} = |a|e^{i\alpha} \\ &\iff r^n = |a| \text{ und } n\theta = \alpha + 2k\pi \text{ für ein } k \in \mathbb{Z} \\ &\iff r = \sqrt[n]{|a|} \text{ und } \theta = \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \end{aligned}$$

Es gilt nun

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \exp\left(i \frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right) \Rightarrow z_k^n = a \text{ für ein } k \in \mathbb{Z}$$

und $z_{k+n} = z_k$ (dies ist selber zu beweisen).

Zusammenfassung: Sei $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Dann hat die Gleichung $z^n = a$ genau n verschiedene Lösungen in $\mathbb{C}$, nämlich

$$\sqrt[n]{a} = z_k = \sqrt[n]{|a|} \exp\left(i \frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right) \text{ für } k = 0, 1, \dots, n-1$$

Bemerkung: Es ist $\arg z_k = \frac{\alpha+2k\pi}{n}$ und $\arg z_{k+1} - \arg z_k = \frac{2\pi}{n}$. Die Wurzeln liegen also gleichmäßig auf dem Vollkreis verteilt.

6.3.13 Polynome

Das Polynom $z^n - a$ mit festem $a \in \mathbb{C}$ hat die n Nullstellen $z_0, \dots, z_{n-1}$ für $a \neq 0$, bzw. $0, \dots, 0$ für $a = 0$.

6.3.14 Fundamentalsatz der Algebra

Jedes Polynom $P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ ($n \geq 1$, $a_n \neq 0$, $a_\nu \in \mathbb{C}$) besitzt (mindestens) eine Nullstelle $z_0 \in \mathbb{C}$ mit $P(z_0) = 0$.

Beweis: (nach Gauß) Sei $|z| = r \geq r_0$. Dann ist

$$\begin{aligned} |P(z)| &= |a_nz^n + (a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0)| \geq |a_n|r^n - \sum_{\nu=0}^{n-1} |a_\nu|r^\nu \\ &= r^n \cdot \left(|a_n| - \sum_{\nu=0}^{n-1} |a_\nu| \frac{1}{r^{n-\nu}} \right) > |P(0)| \text{ für } r \geq r_0 \text{ (} r_0 \text{ hinreichend groß)} \end{aligned}$$

Das heißt, daß die Nullstelle immer betragsmäßig kleiner als ein r_0 sein muß. Außerdem ist $|P(z)| > |P(0)|$ für betragsmäßig hinreichend großes z .

Annahme: Es ist $P(z) \neq 0$ in $\mathbb{C}$. Setze

$$m = \inf\{|P(z)| : |z| < r_0\}$$

Es existieren dann z_k mit $|z_k| < r_0$ und $|P(z_k)| \rightarrow m$.

Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß sei z_k OBdA konvergent gegen z_0 :

$$m \leftarrow |P(z_k)| \rightarrow |P(z_0)|$$

Es ist also $m = |P(z_0)|$ und aus der Stetigkeit folgt $m \leq |P(0)|$. Für großes $z \in \mathbb{C}$ ist dann also

$$|P(z)| \geq |P(0)| \geq |P(z_0)| \geq m$$

Jetzt ist noch $P(z_0) = 0$ zu zeigen.

Annahme: Es ist $P(z_0) \neq 0$. Setze dann

$$Q(z) = \frac{P(z_0 + z)}{P(z_0)}$$

Es ist $|Q(z)| \geq |Q(0)| = 1$.

Sei nun $z = re^{i\theta}$ mit $0 \leq \theta < 2\pi$ und $r > 0$.

Außerdem sei $Q(z) = 1 + b_s z^s + \dots + b_n z^n$ mit $b_s \neq 0$. Dann ist

$$1 \leq |Q(z)|^2 = \left| 1 + b_s r^s e^{is\theta} + \dots + b_n r^n e^{in\theta} \right|^2$$

(es ist $|a + b|^2 = |a|^2 + 2 \operatorname{Re}(\bar{a}b) + |b|^2$)

$$\begin{aligned} &= 1 + 2 \operatorname{Re}(b_s r^s e^{is\theta} + \dots) + \left| b_s r^s e^{is\theta} + \dots \right|^2 \\ &= 1 + 2 \cdot |b_s| \cdot r^s \cdot |b_s| \cos(s\theta + \beta_s) + \text{Terme von } r^t \text{ mit } t > s. \end{aligned}$$

Also ist

$$0 \leq 2|b_s|r^s \cos(s\theta + \beta_s) + \text{Terme von } r^t \text{ mit } t > s.$$

Dividiere jetzt durch r^s . Dann ist

$$0 \leq 2|b_s| \cos(s\theta + \beta_s) + \text{Terme von } r^{t-s} \text{ mit } t > s.$$

Für $r \rightarrow 0$ ist dann

$$0 \leq 2|b_s| \cos(s\theta + \beta_s) \text{ für } 0 \leq \theta < 2\pi$$

Also ist $\cos(s\theta + \beta_s) \geq 0$ für $0 \leq \theta \leq 2\pi$ und festes $s \in \mathbb{N}$. Wenn man nun $\theta = \frac{\pi - \beta_s}{s}$ setzt, dann ist aber $\cos(s\theta + \beta_s) = \cos \pi = -1$. Widerspruch!

6.3.15 Folgerungen

1. $P(z) = a_n z^n + \dots + a_0$ kann man schreiben als

$$P(z) = a_n(z - z_1) \cdot (z - z_2) \dots (z - z_n) = a_n(z - \zeta_1)^{r_1} \dots (z - \zeta_s)^{r_s}$$

mit $r_1 + \dots + r_s = n$ und paarweise verschiedenen ζ_i .

Beweis: Es gibt $z_1 \in \mathbb{C}$ mit $P(z_1) = 0$. Dann ist

$$\begin{aligned} P(z) &= P(z) - (z_1) = \sum_{j=1}^n a_j(z^j - z_1^j) = (z - z_1) \cdot \sum_{j=1}^n a_j(z^{j-1} + \dots + z_1^{j-1}) \\ &= (z - z_1) \cdot P_1(z) \end{aligned}$$

Folgere nun weiter mit Induktion nach n . Für $n = 1$ ist die Behauptung klar.

$n - 1 \mapsto n$: Es ist $P(z) = (z - z_1) \cdot P_1(z)$ und $\text{grad } P_1 = n - 1$.

$$\text{Dann ist } P_1(z) = a_n \underbrace{(z - z_2) \dots (z - z_n)}_{n-1 \text{ Stück}}.$$

Spezialfall: $P(z) = a_0 + a_1 z^1 + \dots + a_n z^n$ heißt reell, wenn $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sind. Ist P reell und $P(z_0) = 0$ für $z_0 \notin \mathbb{R}$, dann gilt

$$P(\bar{z}_0) = \sum_{j=0}^n a_j \bar{z}_0^j = \sum_{j=0}^n \overline{a_j z_0^j} = \overline{\sum_{j=0}^n a_j z_0^j} = \overline{P(z_0)} = \bar{0} = 0.$$

Die zu z_0 konjugierte Zahl ist für reelles P also auch Nullstelle.

2. Ist $P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$ reell, so gilt

$$P(z) = a_n(z - \xi_1)^{r_1} \dots (z - \xi_k)^{r_k} (z^2 - 2c_1 z + b_1)^{s_1} \dots (z^2 - 2c_\ell z + b_\ell)^{s_\ell}$$

mit $(b_j - c_j^2) > 0$, $\xi_j \in \mathbb{R}$ und $c_j, b_j \in \mathbb{R}$.

Beweis: P hat die Nullstellen $\xi_1, \dots, \xi_k \in \mathbb{R}$, paarweise verschieden, und $\zeta_1, \bar{\zeta}_1, \dots, \zeta_\ell, \bar{\zeta}_\ell$, jeweils konjugiert komplex und paarweise verschieden:

$$\begin{aligned} P(z) &= a_n(z - \xi_1)^{r_1} \dots (z - \xi_k)^{r_k} \\ &\quad \cdot ((z - \zeta_1)(z - \bar{\zeta}_1))^{s_1} \dots ((z - \zeta_\ell)(z - \bar{\zeta}_\ell))^{s_\ell} \end{aligned}$$

Dabei gilt:

$$\begin{aligned} (z - \zeta_1)(z - \bar{\zeta}_1) &= z^2 - z\bar{\zeta}_1 - z\zeta_1 + \zeta_1\bar{\zeta}_1 = z^2 - 2\text{Re}(\zeta_1)z + |\zeta_1|^2 \\ b_1 - c_1^2 &= |\zeta_1|^2 - (\text{Re } \zeta_1)^2 = (\text{Im } \zeta_1)^2 > 0 \end{aligned}$$

6.3.16 Satz über die Partialbruchzerlegung

Sind P und Q reelle Polynome ohne gemeinsame Nullstellen mit $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$ und

$$Q(x) = \prod_{j=1}^k (x - \xi_j)^{r_j} \prod_{j=1}^{\ell} (x^2 - 2c_j x + b_j)^{s_j}.$$

Dann gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $\alpha_{\nu j}$, $\beta_{\nu j}$ und $\gamma_{\nu j}$ mit

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^k \sum_{\nu=1}^{r_j-1} \frac{\alpha_{\nu j}}{(x - \xi_j)^{r_j-\nu}} + \sum_{j=1}^{\ell} \sum_{\nu=1}^{s_j-1} \frac{\beta_{\nu j} x + \gamma_{\nu j}}{(x^2 - 2c_j x + b_j)^{s_j-\nu}}.$$

Beweis: (von Redheffer) In den nächsten Abschnitten.

6.3.17 Hilfssatz 1

Seien P , Q und R Polynome mit den Graden p , q und r , wobei $r < p + q$ ist. Außerdem haben P und Q keine gemeinsamen Nullstellen. Dann gibt es zwei eindeutig bestimmte Polynome A und B mit $\text{grad}(A) < q$, $\text{grad}(B) < p$ und $AP + BQ = R$.

Beweis: Die Koeffizienten von P , Q und R seien c_j , d_j und e_j ($c_j = 0$ für $j > p$, $d_j = 0$ für $j > q$ und $e_j = 0$ für $j > r$). Die gesuchten Polynome A und B haben die Koeffizienten a_j und b_j ($a_j = 0$ für $j \geq q$ und $b_j = 0$ für $j \geq p$).

$AP + BQ = R$ ist äquivalent zum linearen Gleichungssystem

$$\sum_{j=0}^k c_{k-j} a_j + \sum_{j=0}^k d_{k-j} b_j = e_k \quad (6.2)$$

für $k = 0, 1, 2, \dots, p + q - 1$. Dies sind $p + q$ lineare Gleichungen mit den $p + q$ Unbekannten a_j ($0 \leq j < q$) und b_j ($0 \leq j < p$). Ist es eindeutig lösbar?

LINA: Ein LGS $Ax = b$ ist eind. lösbar $\iff Ax = 0$ hat nur die Triviale Lösung $x = 0$.

Mache nun (6.2) homogen (setze $e_k = 0$ für alle k , d. h. $R = 0$). Hat nun $AP + BQ = 0$ nur die Lösung $A = B = 0$?

Sei A, B Lösung: Ist $Q(z_1) = 0$, dann ist $P(z_1) \neq 0$ und damit ist dann $A(z_1) = 0$. Da Q aber q Nullstellen und hat, A aber weniger als $q - 1$ Nullstellen hat, ergibt sich ein Widerspruch. Also muß $A = 0$ und damit auch $B = 0$ sein.

6.3.18 Hilfssatz 2

Seien $P, Q_1, \dots, Q_m$ Polynome, je zwei ohne gemeinsame Nullstellen, $Q = Q_1 \cdot Q_2 \cdot \dots \cdot Q_m$ und $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$. Dann gibt es eindeutig bestimmte Polynome $P_1, \dots, P_m$ mit $\text{grad}(P_j) < \text{grad}(Q_j)$ und

$$\frac{P}{Q} = \sum_{j=1}^m \frac{P_j}{Q_j}.$$

Beweis: Mit Induktion nach m .

$m = 1$: ($Q = Q_1$):

$$\frac{P}{Q} = \frac{P_1}{Q_1} \Rightarrow P_1 = P$$

$m - 1 \mapsto m$: Wende Hilfssatz 1 (6.3.17) an auf:

$$AQ_m + B(Q_1 \dots Q_{m-1}) = P.$$

Die Voraussetzungen für den Hilfssatz sind: Q_m und $Q_1 \dots Q_{m-1}$ haben keine gemeinsame Nullstelle (nach Voraussetzung schon gegeben). Es ist

$$\begin{aligned} \text{grad}(P) &< \text{grad}(Q_1 \dots Q_m) = \left(\sum_{j=1}^{m-1} \text{grad}(Q_j) \right) + \text{grad}(Q_m) \\ &= \text{grad}(Q_1 \dots Q_{m-1}) + \text{grad}(Q_m) \end{aligned}$$

Aus dem Hilfssatz 1 ergibt sich dann A mit $\text{grad}(A) < \text{grad}(Q_1 \dots Q_{m-1})$ und B mit $\text{grad}(B) < \text{grad}(Q_m)$. Setze $P_m := B$. Dann ist $\text{grad}(P_m) < \text{grad}(Q_m)$. Es gilt damit

$$P = AQ_m + P_m Q_1 \dots Q_{m-1}.$$

Nach Division durch Q ist dann

$$\frac{P}{Q} = \frac{A}{Q_1 \dots Q_{m-1}} + \frac{P_m}{Q_m} = \underbrace{\sum_{j=1}^{m-1} \frac{P_j}{Q_j}}_{\odot} + \underbrace{\frac{P_m}{Q_m}}_{\oplus} = \sum_{j=1}^m \frac{P_j}{Q_j}$$

Dabei ist $\odot$ nach Induktionsvoraussetzung und $\oplus$ nach Hilfssatz 1 eindeutig.

6.3.19 Beweis der Partialbruchzerlegung

Sei nun $Q = (H_1)^{r_1} \dots (H_k)^{r_k} \cdot (L_1)^{s_1} \dots (L_\ell)^{s_\ell}$ mit $H_j(x) = (x - \xi_j)$ und $L_j = x^2 - 2c_jx + b_j$. Dann ist $Q_j = (H_j)^{r_j}$ oder $(L_j)^{s_j}$. Mit Hilfssatz 2 gilt dann:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{j=1}^k \frac{P_j(x)}{(x - \xi_j)^{r_j}} + \sum_{j=1}^{\ell} \frac{\tilde{P}_j(x)}{(x^2 - 2c_jx + b_j)^{s_j}}$$

Dabei ist $\text{grad}(P_j) < r_j$ und $P_j(x) = \sum_{\nu=0}^{r_j-1} a_{\nu j}(x - \xi_j)^\nu$:

$$\frac{P_j(x)}{(x - \xi_j)^{r_j}} = \sum_{\nu=0}^{r_j-1} \frac{a_{\nu j}}{(x - \xi_j)^{r_j-\nu}}$$

Damit ist der 1. Teil der Behauptung bewiesen.

Setze $\tilde{P}(x) = \tilde{P}_j(x)$ und $(x^2 - 2c_jx + b_j)^{s_j} = (x^2 - 2cx + b)^s$. Es ist $\text{grad}(\tilde{P}) < 2s$. Gilt nun

$$\tilde{P}(x) \stackrel{?}{=} \sum_{\nu=0}^{s-1} (\beta_\nu + \gamma_\nu x) / (x^2 - 2cx + b)^\nu$$

Dann wäre nämlich

$$\frac{\tilde{P}(x)}{(x^2 - 2cx + b)^s} = \sum_{\nu=0}^{s-1} \frac{\beta_\nu + \gamma_\nu x}{(x^2 - 2cx + b)^{s-\nu}}$$

Diese Frage ist Aufgabe für das konkrete Problem $\tilde{P}(x) = 2x + 2x^2 - x^3$ und $x^2 - 2cx + b = x^2 + 1$.

Es ist

$$\frac{-x^3 - 2x^2 + 2x}{x^2 - 1} = (-x + 2) + \frac{3x - 2}{x^2 - 1}$$

Also ist $\tilde{P}(x) = (-x + 2)(x^2 + 1) + 3x - 2$.

6.4 Trigonometrische Reihen

6.4.1 Definition: Trigonometrische Reihe

Eine Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt} \quad (6.3)$$

heißt *trigonometrische Reihe* ($c_k \in \mathbb{C}$, $t \in \mathbb{R}$). Sie heißt konvergent im Punkt $t \in \mathbb{R}$, wenn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt} =: \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt}$$

existiert.

6.4.2 Bemerkung

(6.3) heißt reell, wenn $c_{-k} = \overline{c_k}$ für $k = 0, \pm 1, \dots$. Dann ist nämlich

$$\begin{aligned} c_{-k} e^{-ikt} + c_k e^{ikt} &= \overline{c_k} \overline{e^{ikt}} + c_k e^{ikt} = 2 \operatorname{Re}(c_k e^{ikt}) \\ \Rightarrow \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt} &= c_0 + \sum_{k=1}^n (c_k e^{ikt} + c_{-k} e^{-ikt}) \\ &= c_0 + 2 \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}(c_k e^{ikt}) \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Wenn nun $c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$ ist, folgt $\operatorname{Re}(c_k e^{ikt}) = \frac{1}{2}(a_k \cos kt + b_k \sin kt)$ und mit $c_{-k} = \overline{c_k}$ ist

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

6.4.3 Beispiel

Sei $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $\alpha_k \downarrow 0$. Dann konvergiert

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \sin kt \text{ für alle } t \in \mathbb{R} \\ &\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cos kt \text{ für alle } t \text{ ausgenommen möglicherweise } t = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi \end{aligned}$$

Beweis: Mit dem Dirichletkriterium ($0 < t < 2\pi$). Es ist

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kt}{\cos kt} \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^n e^{ikt} \right| = \left| e^{it} \sum_{k=0}^{n-1} (e^{it})^k \right| \\ &= \left| \frac{1 - e^{int}}{1 - e^{it}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{it}|} \end{aligned}$$

Die Partialsummen sind beschränkt, also liegt Konvergenz vor.

Die Sinusreihe ist konvergent für $t = 0$ und $\cos(k \cdot 0) = 1$, hier hängt die Konvergenz also von (α_k) ab.

6.4.4 Integration von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ und $f(t) = u(t) + iv(t)$. Wenn $u, v: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar sind, so setzt man

$$\int_a^b f(t) dt := \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

6.4.5 Integrationsregeln

(a)

$$\int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$$

(b)

$$\int_a^b cf(t) dt = c \int_a^b f(t) dt \quad (c \in \mathbb{C})$$

(c)

$$\int_a^b \overline{f(t)} dt = \overline{\int_a^b f(t) dt}$$

(d)

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

Beweis: Setze $I = \int_a^b f(t) dt$. Die Behauptung ist für $I = 0$ klar.

Sei nun $I \neq 0$ mit $I = |I|e^{i\alpha}$ und $\alpha = \arg(I)$:

$$\begin{aligned} |I| &= \operatorname{Re}(e^{-i\alpha} I) = \operatorname{Re} \left(e^{-i\alpha} \int_a^b f(t) dt \right) \\ &= \operatorname{Re} \left(\int_a^b e^{-i\alpha} f(t) dt \right) = \int_a^b \underbrace{\operatorname{Re}(e^{-i\alpha} f(t))}_{\leq |e^{-i\alpha} f(t)| = |f(t)|} dt \end{aligned}$$

(e) f_n konvergiere in $[a, b]$ gleichmäßig gegen f für $n \rightarrow \infty$ und alle f_n seien integrierbar. Dann ist

$$\int_a^b f_n(t) dt \longrightarrow \int_a^b f(t) dt.$$

Beweis:

$$\int_a^b u_n(t) dt + i \int_a^b v_n(t) dt \rightarrow \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt = \int_a^b f(t) dt$$

6.4.6 Beispiel

Sei $\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt} = f(t)$ gleichmäßig konvergent. Dann ist

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-imt} f(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-m)t} dt.$$

Für $\ell \in \mathbb{Z}$ ist dabei

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\ell t} dt = \begin{cases} 2\pi & \ell = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\ell t} dt = \frac{e^{i\ell t}}{i\ell} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{i\ell} (e^{i\pi\ell} - e^{-i\pi\ell}) = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{-imt} f(t) dt = 2\pi c_m.$$

Also ist

$$c_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-imt} f(t) dt.$$

6.5 Fourierreihen

Alle Funktionen in diesem Abschnitt sind vom Typ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und sind 2π -periodisch, d. h. $f(x + 2\pi) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Außerdem sei f integrierbar über $[-\pi, \pi]$, also über beliebige $[a, b]$.

6.5.1 Definition

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt$$

heißt k -ter *Fourierkoeffizient* von f ($k \in \mathbb{Z}$). Die Reihe $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikt}$ ist die von f erzeugte *Fourierreihe*:

$$f \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikt} \tag{6.4}$$

6.5.2 Bemerkung

Es ist $\hat{f}_k = \overline{\hat{f}_{-k}}$, d. h. (6.4) ist reell, denn

$$\begin{aligned} \hat{f}_{-k} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{ikt} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(t)} e^{ikt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(t) e^{-ikt}} dt = \overline{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt} = \overline{\hat{f}_k}. \end{aligned}$$

Setzt man $\hat{f}_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k)$, so ist

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt \, dt \text{ für } k = 0, 1, \dots$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin kt \, dt \text{ für } k = 0, 1, \dots$$

$$a_k = 2 \operatorname{Re} \hat{f}_k = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \operatorname{Re}(e^{-ikt}) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos kt \, dt$$

6.5.3 Beispiel

Sei

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{in } (-\pi, 0] \\ 1 & \text{in } (0, \pi] \end{cases}$$

2π -periodisch fortgesetzt. Es ist $\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} e^{-ikt} \, dt$.

Für $k = 0$ ist

$$\hat{f}_0 = \frac{1}{2}$$

und für $k > 0$ ist

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{-ikt}}{-ik} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi k} \cdot \frac{1}{-i} (e^{-i\pi k} - 1) = \frac{i}{2k\pi} \cdot \begin{cases} 0 & k \text{ gerade} \\ -2 & k \text{ ungerade} \end{cases}$$

Damit ist $a_0 = 1$ und $a_k = 2 \operatorname{Re} \hat{f}_k = 0$.

Es ist $b_k = -2 \operatorname{Im} \hat{f}_k = \frac{-1 \cdot 2}{2k\pi} \cdot \begin{cases} 0 & k \text{ gerade} \\ -2 & k \text{ ungerade} \end{cases}$. Also ist

$$f \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin(2m-1)t}{2m-1}$$

Die Reihe ist überall konvergent nach Dirichlet, insbesondere in $t = 0$ mit dem Wert $\frac{1}{2}$.

6.5.4 Satz

(a) Ist f gerade, so ist $b_k = 0$ und $a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos kt \, dt$.

(b) Ist f ungerade, so ist $a_k = 0$ und $b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin kt \, dt$

Beweis:

$$\begin{aligned}\hat{f}_k &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(s)e^{-iks} ds + \int_0^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt \right] = \left| \begin{array}{l} \text{Subst. im 1. Integral} \\ s = -t \\ ds = -dt \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} f(-t)e^{ikt} dt + \int_0^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt \right] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} [f(t)e^{-ikt} \pm f(t)e^{ikt}] dt\end{aligned}$$

dabei gilt + für gerades f und $-$ für ungerades f

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} f(t) [e^{-ikt} \pm e^{ikt}] dt$$

Dabei ist $[..] = 2 \cos kt$ für gerades f und $= -i2 \sin kt$ für ungerades f

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cdot \begin{array}{l} \cos kt \\ -i \sin kt \end{array} dt$$

Wenn f gerade ist, ist also $\hat{f}_k = \frac{1}{2}a_k$ reell. Wenn f ungerade ist, ist also $\hat{f}_k = \frac{-i}{2}b_k$.

6.5.5 Beispiel

Sei $f(t) = |t|$ in $-\pi < t \leq \pi$, 2π -periodisch fortgesetzt. f ist gerade, also ist $b_k = 0$,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t dt = \pi$$

und für $k > 0$ ist

$$\begin{aligned}a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} t \cos kt dt = \frac{2}{\pi} \cdot t \cdot \frac{\sin kt}{k} \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \frac{\sin kt}{k} dt \\ &= \frac{2}{\pi k \cdot k} \cos kt \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k^2} (\cos(k\pi) - 1).\end{aligned}$$

D. h. $a_0 = \pi$, $a_{2k} = 0$ und

$$a_{2k-1} = \frac{2 \cdot (-2)}{\pi(2k-1)^2} = \frac{-4}{\pi(2k-1)^2}.$$

$$f \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)t)}{(2k-1)^2}$$

ist gleichmäßig konvergent nach dem Majorantenkriterium. Später wird gezeigt:

$$f(t) \stackrel{!}{=} \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos((2k-1)t)}{(2k-1)^2}$$

Für $t = 0$ gilt dann

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 0}{(2k-1)^2} \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m)^2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} + \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

Also ist

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}.$$

6.5.6 Besselsche Ungleichung

Es ist

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(t))^2 dt$$

mit $|\hat{f}_k|^2 = \frac{1}{4}(a_k^2 + b_k^2)$ gilt:

$$\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(t))^2 dt.$$

Insbesondere gilt: $\hat{f}_k \rightarrow 0$ für $|k| \rightarrow \infty$,
d. h. $a_k \rightarrow 0$ und $b_k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$.

Beweis: Sei

$$T(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

ein trigonometrisches Polynom, $c_k \in \mathbb{C}$. Dann ist

$$\begin{aligned} |f(x) - T(x)|^2 &= (f(x))^2 - 2f(x) \operatorname{Re}(\overline{T(x)}) + |T(x)|^2 \\ &= (f(x))^2 - 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{k=-n}^n f(x) \overline{c_k} e^{-ikx} \right) + \sum_{k,\ell=-n}^n c_k \overline{c_\ell} e^{i(k-\ell)x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T(x)|^2 dx &= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx \\
&\quad - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=-n}^n \bar{c}_k \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx}_{=2\pi \hat{f}_k} \\
&\quad + \sum_{k,\ell=-n}^n c_k \bar{c}_\ell \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-\ell)x} dx}_{=0 (\ell \neq k); =2\pi (\ell=k)} \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=-n}^n 2\pi \hat{f}_k \bar{c}_k \\
&\quad + 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T(x)|^2 dx \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx - \sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2 \\
&\quad + \sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2 - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=-n}^n \hat{f}_k \bar{c}_k + \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x))^2 dx - \sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2 + \underbrace{\sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k - c_k|^2}_{\geq 0 (=0 \text{ für } c_k = \hat{f}_k \forall k)}
\end{aligned}$$

Also ist

$$\sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(t))^2 dt$$

Nun Grenzübergang $n \rightarrow \infty$, dann ist die Behauptung beweisen.

Zusatz: Sei $s_n(x) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}_k e^{ikx}$, dann ist

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - s_n(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T(x)|^2 dx.$$

6.5.7 Satz von Riemann-Lebesgue

Sei $g \in R([a, b])$. Dann gilt

$$\int_a^b g(t) \begin{Bmatrix} e^{ikt} \\ \sin kt \\ \cos kt \end{Bmatrix} dt \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \pm\infty.$$

Beweis: Für den Fall, daß $[a, b] \subseteq (-\pi, \pi)$:

Setze

$$f(t) = \begin{cases} g(t) & \text{in } [a, b] \\ 0 & \text{in } (-\pi, \pi) \setminus [a, b] \end{cases}$$

2π -periodisch fortgesetzt. Dann ist

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_a^b g(t) e^{-ikt} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \\ &= \hat{f}_k \rightarrow 0 \end{aligned}$$

6.5.8 Der Dirichletkern

Sei

$$f \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikt}.$$

Dann gilt

$$s_n(x) = \sum_{k=-n}^n \hat{f}_k e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(x-t) f(t) dt.$$

Dabei ist D_n der *Dirichletkern* und ist bestimmt durch

$$D_n(x) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin \frac{1}{2}x}$$

und

$$D_n(0) = 2n + 1 = \lim_{x \rightarrow 0} D_n(x).$$

Beweis: Es ist

$$s_n(x) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} e^{ikx} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\left(\sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} \right)}_{=D_n(x-t)} \cdot f(t) dt$$

$$\begin{aligned} D_n(x) &= \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = e^{-inx} \sum_{k=-n}^n e^{i(k+n)x} \\ &= e^{-inx} \sum_{j=0}^{2n} e^{ijx} = e^{-inx} \cdot \frac{1 - e^{i(2n+1)x}}{1 - e^{ix}} \\ &= \frac{e^{-(n+\frac{1}{2})ix} (1 - e^{i(2n+1)x})}{e^{-\frac{ix}{2}} (1 - e^{ix})} \\ &= \frac{e^{-(n+\frac{1}{2})ix} - e^{i(n+\frac{1}{2})x}}{e^{-i\frac{x}{2}} - e^{i\frac{x}{2}}} = \frac{-2i \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{-2i \sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

6.5.9 Riemannscher Lokalisationsatz

Es ist

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx} = s(x)$$

$$\iff \int_0^{\delta} D_n(t) [f(x+t) + f(x-t) - 2s(x)] dt \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

für ein $\delta > 0$. Das bedeutet: f bestimmt alle

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt.$$

Beweis:

$$\begin{aligned} s_n(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(x-t) f(t) dt = \left| \begin{array}{l} x-t=y \\ dt=-dy \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} \underbrace{D_n(y) f(x-y)}_{2\pi\text{-periodisch in } y} dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(y) f(x-y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 D_n(y) f(x-y) dy + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) f(x-y) dy = \left| \begin{array}{l} \text{Im 1. Integral subst.:} \\ y = -u \\ dy = -du \end{array} \right| \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^0 \underbrace{D_n(-u)}_{\text{gerade}} f(x+u) du + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) f(x-y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) [f(x+y) + f(x-y)] dy \end{aligned}$$

Einschub:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) [f(x+y) + f(x-y)] dy ? \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) (1+1) dy \\ &[\text{setze } f(t) \equiv 1 \text{ und } s_n(x) = 1] \end{aligned}$$

Es ist

$$\begin{aligned} s_n(x) - s(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} D_n(y) [f(x+y) + f(x-y) - 2s(x)] dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\delta} \quad + \int_{\delta}^{\pi} \right]. \end{aligned}$$

Zeige nun noch

$$\int_{\delta}^{\pi} D_n(y) \underbrace{[f(x+y) + f(x-y) - 2s(x)]}_{=:g(y)} dy \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty$$

Dann ist der Beweis erledigt.

Betrachte nun $D_n(y) \cdot g(y)$:

$$D_n(y) \cdot g(y) = \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)y\right) \cdot \underbrace{\frac{g(y)}{\sin \frac{1}{2}y}}_{=:h(y)} \text{ in } \delta \leq y \leq \pi$$

ist integrierbar über $[\delta, \pi]$:

$$\begin{aligned} \int_{\delta}^{\pi} D_n(y) \cdot g(y) dy &= \int_{\delta}^{\pi} \left(\left(n + \frac{1}{2}\right)y\right) \cdot h(y) dy = \left| \begin{array}{l} y = 2t \\ dy = 2dt \end{array} \right| \\ &= 2 \int_{\delta/2}^{\pi/2} \sin((2n+1)t) \cdot h(2t) dt \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

nach dem Satz von Riemann-Lebesgue (siehe 6.5.7, Seite 145).

6.6 Konvergenz- und Approximationssätze

6.6.1 Satz

Sei $f \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx}$. Setzt man $g(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2c$ bei festem x und konvergiert

$$\int_0^{\pi} \frac{|g(t)|}{t} dt,$$

dann gilt

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx} = c.$$

Beweis: Siehe 6.6.3.

6.6.2 Beispiele

1. Sei

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } -\pi < x < 0 \\ 1 & \text{für } 0 < x < \pi \\ \frac{1}{2} & \text{für } x = 0, \pi \end{cases},$$

2π -periodisch fortgesetzt. Es ist

$$f \sim \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)t}{\pi(2k-1)}$$

Nach dem Satz ist überall Gleichheit, denn:

Für $x \neq 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$ ist $g(t) = 0$ in $[0, \delta]$.

Für $x = 0$ und $c = \frac{1}{2}$ ist $g(t) = 1 + 0 - 2\frac{1}{2} = 0$ in $(0, \delta)$.

2. Sei $f(x) = |x|$ in $-\pi < x \leq \pi$, 2π -periodisch fortgesetzt.

Für $0 < x < \pi$ ist

$$f(x+t) + f(x-t) - 2f(x) = x+t + x-t - 2x = 0 \text{ für } 0 \leq t \leq \delta.$$

Für $x = 0$ ist

$$f(t) + f(-t) - 2f(0) = |t| + |t| - 0 = 2|t| = 2f(t)$$

$$\int_0^\delta \frac{g(t)}{t} dt = \int_0^\delta 2 dt \checkmark$$

Also ist

$$\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)t}{(2k-1)^2} = |t| \text{ in } -\pi \leq t \leq \pi.$$

6.6.3 Beweis von 6.6.1

Es ist

$$s_n(x) - c = \frac{1}{2\pi} \int_0^\delta D_n(t)g(t) + \varepsilon_n,$$

wobei $\varepsilon_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ (nach dem Lokalisationssatz) für jedes $\delta > 0$.

Sei $\varepsilon > 0$. Dazu gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$\int_0^\delta \frac{|g(t)|}{t} dt < \varepsilon.$$

Zu diesem δ existiert ein n_0 mit $|\varepsilon_n| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$.

$$\begin{aligned} D_n(t) &= \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{\sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{\frac{t}{2}} + \frac{1}{\frac{t}{2}}\right)}_{=h(t)} \\ &= \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) \cdot \left(\frac{2}{t} + h(t)\right) \end{aligned}$$

(Aufgabe: Zeige, daß $h(t)$ in $t = 0$ stetig ist.)

Nach dem Satz von Riemann-Lebesgue ist

$$\begin{aligned} \int_0^\delta D_n(t)g(t) dt &= 2 \int_0^\delta \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) \frac{g(t)}{t} dt \\ &\quad + \underbrace{\int_0^\delta \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) g(t)h(t) dt}_{\rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty} \end{aligned}$$

Also ist das 2. Integral für $n \geq n_1$ betragsmäßig kleiner als ε . Zusammen gilt also:

$$|s_n(x) - c| \stackrel{\odot}{\leq} \frac{2}{2\pi} \int_0^\delta \left| \sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) t \right) \right| \cdot \frac{|g(t)|}{t} dt + \varepsilon + \varepsilon$$

mit $n \geq \max(n_0, n_1)$ bei $\odot$.

6.6.4 Beispiele

1. Sei

$$h(t) = \begin{cases} a & \text{für } -\pi < t < t_0 \\ b & \text{für } t_0 < t < \pi \end{cases},$$

beliebig in $t = t_0$ und $t = \pi$ und 2π -periodisch fortgesetzt. Dann ist

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{h}_k e^{ikt} = \begin{cases} a & \text{für } -\pi < t < t_0 \\ b & \text{für } t_0 < t < \pi \\ \frac{a+b}{2} & \text{für } t_0 \text{ und } \pi \end{cases}$$

2. Sei

$$f \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikt}$$

mit $\lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) = a$ und $\lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) = b$. Betrachte dann $g(t) = f(t) - h(t)$:

$$\sum \hat{f}_k e^{ikt} = \underbrace{\sum \hat{h}_k e^{ikt}}_{\frac{a+b}{2} \text{ in } t_0} + \sum \hat{g}_k e^{ikt}$$

g ist stetig in t_0 , wenn man $g(t_0) = 0$ setzt.

6.6.5 Satz

Ist f in t_0 Dini-Stetig, d. h. gilt $|f(t) - f(t_0)| \leq \omega(|t - t_0|)$ mit $\int_0^\pi \frac{\omega(h)}{h} dh < \infty$. Dann gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikt_0} = f(t_0).$$

Bemerkung: Beispiele für die Dini-Stetigkeit:

(a) Lipschitz-Stetigkeit: $|f(t) - f(t_0)| \leq L|t - t_0|$. Setze $\omega(h) = Lh$.

(b) Hölder-Stetigkeit: $|f(t) - f(t_0)| \leq L|t - t_0|^\alpha$ für ein $\alpha \in (0, 1)$.
Setze $\omega(h) = Lh^\alpha$ und

$$\int_0^\pi \frac{\omega(h)}{h} dh = L \int_0^\pi h^{\alpha-1} dh$$

existiert.

(c) Sei f differenzierbar in t_0 . Dann gilt (a).

6.6.6 Satz

Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Dini-stetig und 2π -periodisch, d. h. es ist $|f(x) - f(y)| \leq \omega(|x-y|)$ mit $\int_0^\pi \frac{\omega(h)}{h} dh < \infty$.
Dann ist für alle $x \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx} = f(x).$$

6.6.7 Satz

Ist $f \in C^1(\mathbb{R})$, 2π -periodisch, dann konvergiert $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|$. Da $|\hat{f}_k e^{ikx}| = |\hat{f}_k|$ ist, konvergiert also

$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx}$ gleichmäßig gegen $f(x)$.

Beweis: Sei $k \neq 0$. Dann ist

$$\begin{aligned} \hat{f}_k &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\underbrace{f(t) e^{-ikt} \frac{1}{-ik}}_{=0} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} f'(t) \frac{e^{-ikt}}{ik} dt \right] = \frac{1}{ik} c_k \end{aligned}$$

Dabei ist c_k der k -te Fourierkoeffizient von f' . Also ist $c_k = ik \hat{f}_k$.

$$f \sim \sum \hat{f}_k e^{ikx} \Rightarrow f' \sim \sum (\hat{f}_k e^{ikx})'$$

Nach der Besselschen Ungleichung gilt

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 < \infty.$$

Also ist

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} k^2 |\hat{f}_k|^2 < \infty.$$

Und damit gilt dann

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |\hat{f}_k| &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot k |\hat{f}_k| \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n |c_k|^2} \\ &\leq \text{const.}, \text{ unabhängig von } n. \end{aligned}$$

6.6.8 Beispiel

Sei $f(t) = |\sin t|$. f ist gerade ($f(-t) = f(t)$) und Lipschitzstetig:

$$|f(x) - f(y)| = ||\sin x| - |\sin y|| \leq |\sin x - \sin y| = |x - y| \cdot |\cos \xi| \leq |x - y|.$$

Suche die a_k für die Fourierreihe

$$|\sin x| = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) \text{ für } x \in \mathbb{R}.$$

Es ist

$$\frac{a_0}{2} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t \, dt = \frac{4}{\pi}$$

und für $k > 0$ ist

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t \cdot \cos kt \, dt = \frac{2}{\pi} \left[\underbrace{\sin t \frac{\sin kt}{k}}_{=0} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (\cos t) \frac{\sin kt}{k} \, dt \right] \\ &= -\frac{2}{k\pi} \left[\cos t \frac{-\cos kt}{k} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\sin t) \frac{-\cos kt}{k} \, dt \right] \\ &= -\frac{2}{k^2\pi} \left[-1 \cdot (-\cos k\pi) + 1 - \int_0^{\pi} \sin t \cos kt \, dt \right] = -\frac{2}{k^2\pi} (1 + (-1)^k) + \frac{1}{k^2} a_k. \end{aligned}$$

Daraus folgt dann

$$\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) a_k = \frac{-2}{k^2\pi} (1 + (-1)^k) = \begin{cases} 0 & \text{für ungerades } k \\ \frac{-4}{\pi k^2} & \text{für gerades } k \end{cases},$$

also

$$a_{2k} = \frac{-4}{\pi(2k)^2(1 - \frac{1}{(2k)^2})} = \frac{-4}{\pi} \cdot \frac{1}{4k^2 - 1}$$

$$a_{2k+1} = 0$$

und damit

$$|\sin x| = \frac{4}{\pi} \left(1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2 - 1} \right).$$

Für $x = 0$ gilt dabei

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = 1.$$

6.6.9 Satz von Fejer

Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und 2π -periodisch, so gilt

$$\sigma_n(x) \rightarrow f(x) \text{ für } n \rightarrow \infty$$

gleichmäßig auf $\mathbb{R}$. Dabei ist

$$\sigma_n(x) := \frac{s_0(x) + s_1(x) + \cdots + s_n(x)}{n+1}$$

das n -te Fejer-Mittel.

Beweis: Es ist

$$s_k(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_k(x-t) \cdot f(t) dt.$$

Damit ist

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{k=0}^n D_k(x-t) \right) \cdot f(t) dt.$$

Dabei wird

$$F_n(x-t) = \left(\sum_{k=0}^n D_k(x-t) \right) \cdot \frac{1}{n+1}$$

der Fejer-Kern genannt. Es gilt:

$$(n+1)F_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\sin((k+\frac{1}{2})x)}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

Für $z = \exp(\frac{ix}{2})$ ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \sin\left(\left(k+\frac{1}{2}\right)x\right) &= \sum_{k=0}^n \operatorname{Im}(z^{2k+1}) = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^n z^{2k+1}\right) \\ &= \operatorname{Im}(z + z^3 + z^5 + \cdots + z^{2n+1}) = \operatorname{Im}(z(1 + z^2 + z^4 + \cdots + z^{2n})) \\ &= \operatorname{Im}\left(z \cdot \frac{1 - (z^2)^{n+1}}{1 - z^2}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{1 - z^{2n+2}}{\bar{z} \cdot z}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\frac{1 - z^{2n+2}}{-2i \cdot \operatorname{Im} z}\right) = \operatorname{Im} \frac{i}{2} \cdot \frac{1 - z^{2n+2}}{\operatorname{Im} z} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\operatorname{Re}(1 - z^{2n+2})}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \cos((n+1)x)}{\sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

Also ist

$$F_n(x) = \frac{1}{2n+2} \cdot \frac{1 - \cos((n+1)x)}{(\sin \frac{x}{2})^2} \geq 0$$

und

$$|\sigma_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x-t) \cdot (f(t) - f(x)) dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x-t) \cdot |f(t) - f(x)| dt$$

Noch zu zeigen: Für $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \text{ für } |x_1 - x_2| < \delta$$

(gleichmäßige Stetigkeit).

$$\begin{aligned} |\sigma_n(x) - f(x)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x-t) \cdot |f(t) - f(x)| dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{x-\delta}^{x+\delta} F_n(x-t) \cdot |f(t) - f(x)| dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{x-\delta} + \frac{1}{2\pi} \int_{x+\delta}^{\pi} = I_1 + I_2 + I_3 \end{aligned}$$

Schätze nun die I_n ab:

$$\begin{aligned} I_1 &< \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{x-\delta}^{x+\delta} F_n(x-t) dt \leq \varepsilon \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x-t) dt}_{=1} \\ &= \varepsilon \text{ unabhängig von } x \text{ und } n \\ I_2 &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{x-\delta} F_n(x-t) \cdot 2M dt, \end{aligned}$$

da $|f(t)| \leq M$ für alle t ist. Außerdem ist

$$F_n(x-t) \leq \frac{1}{2n+2} \cdot \frac{2}{\sin^2 \frac{\delta}{2}} < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0.$$

Dabei ist $-\pi \leq t \leq x - \delta$, also $x - t \geq \delta$. Zusammen ist also $I_2 < \varepsilon$ für $n \geq n_0$. Mache nun die gleich Abschätzung für I_3 und für alle Integrale gilt zusammen:

$$|\sigma_n(x) - f(x)| \leq 3\varepsilon.$$

6.6.10 Approximationssatz von Weierstraß

Ist f stetig in $[a, b]$, so gibt es eine Polynomfolge (P_n) , die gleichmäßig auf $[a, b]$ gegen f konvergiert. Äquivalent hierzu ist, daß es zu $\varepsilon > 0$ ein Polynom P gibt mit $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$ in $[a, b]$.

Beweis: Für das Intervall $[-1, 1]$.

Anderenfalls wird die Funktion $\tilde{f}(t) = f(a + \frac{b-a}{2}(t+1))$ betrachtet. Dann ergibt sich ein Polynom $\tilde{P}$ mit $|\tilde{f}(t) - \tilde{P}(t)| < \varepsilon$ in $[-1, 1]$ und für das Polynom $P(x) = \tilde{P}(-1 + 2\frac{x-a}{b-a})$ ist dann $|P(x) - f(x)| < \varepsilon$ für $a \leq x \leq b$.

Nun der Beweis: $f(\cos t) = g(t)$ ist stetig auf $\mathbb{R}$, gerade. Sei $\sigma_n(t)$ das n -te Fejer-Mittel für die Funktion g . Es ist $\sigma_n \rightarrow g$ gleichmäßig auf $\mathbb{R}$, d. h. zu $\varepsilon > 0$ gibt es ein n_0 mit $|\sigma_n(t) - f(\cos t)| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$ und $t \in \mathbb{R}$. Da g gerade ist, folgt:

$$\sigma_n(t) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \cdot \cos kt \text{ für } n \geq n_0 \text{ fest}$$

Frage: Gibt es ein Polynom P_n mit $\sigma_n(t) = P_n(\cos t)$?

Falls ja:

$$|P_n(\cos t) - f(\cos t)| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \text{ und } t \in \mathbb{R}$$

$$|P_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \text{ und } -1 \leq x \leq 1.$$

Die Existenz von dieses Polynoms wird im folgenden Satz bewiesen. Hier nun 2 Beispiele:

Für $n = 1$ ist $T_1(x) = x$.

Für $n = 2$ ist $\cos(2t) = \cos^2 t - \sin^2 t = 2 \cos^2 t - 1$, also ist $T_2(x) = 2x^2 - 1$.

6.6.11 Satz

Zu jedem $n \in \mathbb{N}$ gibt es ein Polynom T_n vom Grad n mit $\cos(nt) = T_n(\cos t)$. T_n heißt n -tes *Tschebyscheffpolynom*.

Beweis: Zeige mit Induktion:

$$\cos nt = T_n(\cos t)$$

und

$$\sin nt = U_n(\cos t) \sin t \text{ mit Polynom } U_n.$$

„ $n = 1$ “: $T_1(x)$ und $U_1(x) = 1$.

„ $n \mapsto n + 1$ “:

$$\begin{aligned} \cos((n+1)t) &= \cos(nt+t) = \cos(nt) \cos t - \sin(nt) \sin t \\ &= T_n(\cos t) \cos t - U_n(\cos t) (\sin t)^2 = T_n(\cos t) \cos t - U_n(\cos t) (1 - (\cos t)^2) \\ &= T_{n+1}(\cos t) \end{aligned}$$

$$T_{n+1}(x) = T_n(x) \cdot x - U_n(x)(1 - x^2)$$

$$\begin{aligned} \sin((n+1)t) &= \frac{-1}{n+1} (\cos(n+1)t)' = \frac{-1}{n+1} (T_{n+1}(\cos t))' \\ &= \frac{-1}{n+1} T_{n+1}'(\cos t) (-\sin t) = U_{n+1}(\cos t) \sin t \end{aligned}$$

$$U_{n+1} = \frac{1}{n+1} T_{n+1}'(x)$$

7 Metrische Räume¹

7.1 Der euklidische Raum

7.1.1 Definition von $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{-mal}}$$

Für $x \in \mathbb{R}^n$ wird $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ geschrieben. Dies ist ein n -Tupel. Dabei ist x_ν die ν -te Komponente oder Koordinate von x .

Im $\mathbb{R}^2$ wird allgemein das Paar (x, y) statt (x_1, x_2) benutzt.

Im $\mathbb{R}^3$ wird allgemein das Tripel (x, y, z) statt (x_1, x_2, x_3) benutzt.

Der $\mathbb{R}^n$ ist ein Vektorraum (linearer Raum) über $\mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned}x + y &:= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda x &:= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \text{ mit } \lambda \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

Es ist $\dim \mathbb{R}^n = n$. Die Standardbasis ist

$$e^\nu := (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \text{ mit } \nu = 1, \dots, n$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) = x_1 e^1 + x_2 e^2 + \cdots + x_n e^n$$

$$0 := (0, 0, \dots, 0)$$

7.1.2 Definition des Skalarproduktes und der euklidischen Norm

Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißt $x \cdot y := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$ *Skalarprodukt* (Innenprodukt) zwischen x und y , und $\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$ heißt *euklidische Norm* von x . Ausführlich:

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{\nu=1}^n x_\nu^2}$$

7.1.3 Eigenschaften des Skalarproduktes

(S1) $x \cdot x > 0$ für $x \neq 0$.

(S2) $(\lambda x) \cdot y = \lambda(x \cdot y)$.

(S3) $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

(S4) $x \cdot y = y \cdot x$.

---

¹Version 184 vom 13. Februar 2006

7.1.4 Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung

(Bunjakowskij)

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$$

und „=“ genau dann, wenn x und y linear abhängig sind. Anders geschrieben:

$$\left| \sum_{\nu=1}^n x_{\nu} y_{\nu} \right|^2 \leq \left(\sum_{\nu=1}^n x_{\nu}^2 \right) \cdot \left(\sum_{\nu=1}^n y_{\nu}^2 \right)$$

Beweis: Trivial für $x = 0$ oder $y = 0$.

Zunächst für $\|x\| = \|y\| = 1$: Für $t \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x + ty\|^2 \\ &= (x + ty) \cdot (x + ty) \\ &= \|x\|^2 + 2t(x \cdot y) + t^2\|y\|^2 \\ &= 1 + 2t(x \cdot y) + t^2 \\ &= (t + (x \cdot y))^2 + 1 - (x \cdot y)^2 \end{aligned}$$

Setze nun $t = t_0 := -x \cdot y$. Dann ist

$$\begin{aligned} 0 &\leq 1 - (x \cdot y)^2 \\ \iff (x \cdot y)^2 &\leq 1 = \|x\| \cdot \|y\| \end{aligned}$$

„=“ genau dann, wenn $x + t_0 y = 0$ ist, d. h. wenn x und y linear abhängig sind.

Allgemeiner Fall: Setze

$$\frac{x}{\|x\|} = \xi \quad \text{und} \quad \frac{y}{\|y\|} = \eta \quad \Rightarrow \quad \|\xi\| = \|\eta\| = 1$$

$$\begin{aligned} |x \cdot y| &= |(\|x\|\xi) \cdot (\|y\|\eta)| = \|x\| \|y\| \underbrace{\xi \cdot \eta}_{\leq 1} \\ &\leq \|x\| \|y\| \end{aligned}$$

„=“ genau dann, wenn ξ und η , d. h. x und y linear abhängig sind.

Beachte: Für den Beweis wurden nur die Regeln (S1)-(S4) gebraucht!

7.1.5 Eigenschaften der Euklidnorm

(N1) $\|x\| > 0$ für $x \neq 0$ (Definitheit).

(N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ für $\lambda \in \mathbb{R}$ (Homogenität).

(N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Dreiecksregel).

(N4) $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|$ (Umgekehrte Dreiecksungleichung) (folgt aus (N3)).

Beweis:

(N3)

$$\begin{aligned}
\|x + y\|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + 2x \cdot y + y \cdot y \\
&\stackrel{(1)}{\leq} \|x\|^2 + 2|x \cdot y| + \|y\|^2 \\
&\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\
&= (\|x\| + \|y\|)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{„} = \text{“} &\iff \text{„} = \text{“ bei (1) und CSU} \\
&\iff x \cdot y \geq 0 \text{ und } x, y \text{ linear abhängig} \\
&\iff x = 0 \text{ oder } y = 0 \text{ oder } y = \lambda x \text{ mit } \lambda \geq 0
\end{aligned}$$

(N4) Es ist $x = (x + y) - y$. Damit ist

$$\|x\| = \|(x + y) - y\| \stackrel{(N3)}{\leq} \|x + y\| + \|-y\| = \|x + y\| + \|y\|$$

Damit ist $\|x\| - \|y\| \leq \|x + y\|$. Genauso wird $\|y\| - \|x\| \leq \|x + y\|$ gezeigt und damit folgt die Behauptung.

7.1.6 Satz des Pythagoras

Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ mit $x \cdot y = 0$ ist

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

 (x, y) orthogonal, $x \perp y$.**Beweis:**

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \underbrace{2x \cdot y}_{=0} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

7.1.7 Definition: Norm, Normierter Raum

Sei E ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Abbildung $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|$ heißt *Norm*, wenn sie die Eigenschaften (N1)-(N3) hat (Es gilt immer auch (N4)). E , oder genauer $(E, \|\cdot\|)$ heißt dann *normierter Raum*.

7.1.8 Beispiele

(a) Nehme zu $E = \mathbb{R}^n$ die Euklidnorm.(b) Nehme zu $E = \mathbb{R}^n$ die Maximumsnorm $\|x\|_\infty := \max_{\nu=1}^n |x_\nu|$.**Beweis** für (N3): Für festes $\nu = 1, \dots, n$ ist

$$|x_\nu + y_\nu| \leq |x_\nu| + |y_\nu| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

Also ist insgesamt $\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$.

(c) Nehme zu $E = \mathbb{R}^n$ die Summennorm $\|x\|_1 := \sum_{\nu=1}^n |x_\nu|$.

Beweis für (N3):

$$\sum_{\nu=1}^n \underbrace{|x_\nu + y_\nu|}_{\leq |x_\nu| + |y_\nu|} \leq \sum_{\nu=1}^n |x_\nu| + \sum_{\nu=1}^n |y_\nu|$$

(d) Nehme zu $E = C([a, b]) =$ Raum der stetigen Funktionen $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ die Maximumnorm $\|f\|_\infty := \max\{|f(t)| : a \leq t \leq b\}$.

Beweis für (N3): Für $a \leq t \leq b$ ist

$$\begin{aligned} |f(t) + g(t)| &\leq |f(t)| + |g(t)| \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\ \Rightarrow \|f + g\|_\infty &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \end{aligned}$$

(e) Nehme zu $E = s = \{(a_n) : a_n \in \mathbb{R}, n \geq 1, (a_n) \text{ beschränkt}\}$

die Supremumsnorm $\|(a_n)\|_\infty := \sup\{|a_n| : n \in \mathbb{N}\}$.

Beweis für (N3): Für $n = 1, 2, 3, \dots$ ist

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| \leq \|(a_n)\|_\infty + \|(b_n)\|_\infty$$

Damit ist dann $\|(a_n + b_n)\|_\infty \leq \|(a_n)\|_\infty + \|(b_n)\|_\infty$.

7.1.9 Definition: Skalarprodukt

Sei E ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Abbildung $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \rightarrow x \cdot y$, mit den Eigenschaften (S1)-(S4) heißt *Skalarprodukt* auf E (Innenprodukt).

7.1.10 Satz

Ist $x \cdot y$ ein Skalarprodukt auf E , so gilt die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung und $\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$ ist eine Norm.

7.1.11 Beispiele

1. Sei $E = C([a, b])$ mit dem Innenprodukt

$$(f|g) := \int_a^b f(t)g(t) dt$$

Dann ist

$$\|f\|^2 := \int_a^b (f(t))^2 dt, \quad \|f\| = \sqrt{(f|f)} = \sqrt{\int_a^b (f(t))^2 dt}$$

Es gilt die Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung:

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \int_a^b (f(t))^2 dt \cdot \int_a^b (g(t))^2 dt.$$

Weise die Eigenschaft (S1) nach: $(f|f) > 0$, falls f nicht die Nullfunktion ist: Sei $t_0 \in [a, b]$, so daß $f(t_0) \neq 0$ ist. Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $|f(t)| > k > 0$ in $I = [a, b] \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ und damit ist

$$(f|f) = \int_a^b (f(t))^2 dt \geq k^2 \cdot \text{Länge von } I > 0.$$

2. Sei

$$E = \left\{ (a_n) : \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ konvergiert} \right\}$$

Ist E ein linearer Raum? Zu zeigen ist, daß für $(a_n), (b_n) \in E$ auch $(a_n + b_n) \in E$ ist. Es ist $(a_n + b_n)^2 = a_n^2 + 2a_nb_n + b_n^2$. Dies konvergiert, wenn $2a_nb_n$ konvergiert, da die anderen Terme nach Voraussetzung konvergent sind. Es ist

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N |a_n| \cdot |b_n| &\stackrel{\text{CSU im } \mathbb{R}^n}{\leq} \sqrt{\sum_{n=1}^N |a_n|^2 \cdot \sum_{n=1}^N |b_n|^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2} \cdot \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2} =: C \end{aligned}$$

Also konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} |a_nb_n|$.

Das Skalarprodukt ist hier:

$$((a_n)|(b_n)) := \sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n$$

Aufgabe: Beweise (S1)-(S4) mit Hilfe der Regeln für Reihen.

Bemerkung: Der Raum in diesem Beispiel wird ℓ^2 („L-zwei“) genannt und

$$\|a_n\| = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2}$$

heißt ℓ^2 -Norm.

7.2 Topologische Grundbegriffe

7.2.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge. Eine Abbildung $d: M \times M \rightarrow [0, \infty)$ mit den Eigenschaften

(M1) $d(x, y) > 0$ für $x \neq y$ und $d(x, x) = 0$ (Definitheit)

(M2) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie)

(M3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (Dreiecksungleichung)

heißt *Metrik*. Aus (M2) und (M3) folgt

(M4) $|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y)$ (umgekehrte Dreiecksungleichung).

M mit der Metrik d heißt *metrischer Raum*.

Beweis: Es ist $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$, also ist $d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$. Zeige genauso, daß $d(y, z) - d(x, z) \leq d(y, x) = d(x, y)$ ist. Zusammen ist dann $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$.

7.2.2 Beispiele

(1) E sei normierter Raum mit der Norm $\|\cdot\|$. Dann ist $d(x, y) := \|x - y\|$ eine Metrik, insbesondere

(2) $\mathbb{R}^n$ mit Euklidmetrik:

$$d(x, y) := \sqrt{\sum_{\nu=1}^n (x_\nu - y_\nu)^2}$$

(3) $\mathbb{R}^n$ mit Metrik von Manhattan:

$$d(x, y) = \sum_{\nu=1}^n |x_\nu - y_\nu| = \|x - y\|_1$$

(4) Metrik des französischen Eisenbahnsystems: Wenn man von einem Punkt zum anderen will, muß man entweder über P (Paris) fahren, oder beide Punkte liegen an der gleichen Eisenbahnstrecke nach Paris.

(5) Sei $(E, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann ist

$$d(x, y) = \frac{\|x - y\|}{1 + \|x - y\|}$$

ebenfalls eine Metrik, wobei $d(x, y) < 1$ ist.

Beweise (M1)-(M3) als Aufgabe. Tip zu (M3): $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ ist monoton wachsend für $0 \leq t < \infty$.

(6) (M, d) sei metrischer Raum und $N \subseteq M$, $N \neq \emptyset$. Dann ist (N, d) ein metrischer Raum (N erbt die Metrik von M).

A Offene Mengen

In diesem Abschnitt bedeuten immer M ein metrischer Raum, d eine Metrik, $A, B, C, \dots \subseteq M$, $x, y, a, \dots \in M$ und $r, \rho, \varepsilon, \delta, \dots > 0$.

7.2.3 Definition: Offene Kugel

$K(a, r) = \{x \in M : d(x, a) < r\}$ heißt *offene Kugel um a mit Radius $r > 0$* .

7.2.4 Beispiel

im $\mathbb{R}^2$:

(1) Euklid

(2) Manhattan $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

(3) $d(x, y) = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$

Hier ist jedesmal die Kugel $K((0, 0), 1)$ dargestellt.

7.2.5 Definition: Innerer Punkt, Inneres, offen

- (1) $a \in A$ heißt *innerer Punkt* von A , wenn es eine Kugel $K(a, r) \subseteq A$ gibt.
- (2) $A^0 = \{x : x \text{ ist innerer Punkt von } A\}$ heißt *Inneres* oder *offener Kern* von A .
- (3) A heißt *offen*, wenn A nur aus inneren Punkten besteht.

7.2.6 Beispiel

Im $\mathbb{R}^n$ mit der Euklidmetrik. Behauptung: Für $a \in \mathbb{R}^n$ mit $\|a\| = 1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ ist

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n : a \cdot x > \alpha\}$$

offen. Sei $x \in H$. Dann ist $a \cdot x = \alpha + \delta > \alpha$.

Behauptung: $K(x, \delta) \subseteq H$.

Sei $\xi \in K(x, \delta)$. D. h. $\xi = x + \delta y$ mit $\|y\| < 1$. Ist $\xi \in H$?

$$a \cdot \xi = \underbrace{a \cdot x}_{=\alpha+\delta} + \delta a \cdot y \stackrel{\text{CSU}}{\geq} \alpha + \delta - \delta \underbrace{\|a\|}_{=1} \underbrace{\|y\|}_{<1} > \alpha$$

Also ist $\xi \in H$, $K(x, \delta) \subseteq H$ und x ist innerer Punkt.

7.2.7 Satz

- (a) $\emptyset$, M , $K(a, r)$, A^0 sind offen.
- (b) Sind $A_1, \dots, A_m$ offen, so ist $A_1 \cap \dots \cap A_m$ offen.
- (c) Ist A_λ für $\lambda \in \Lambda$ offen, so ist $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ offen.

Beweis:

- (a) $\emptyset$, M offen ist klar.

K(a, r): Sei $b \in K(a, r)$. Dann ist $\delta = r - d(a, b) > 0$.

Zeige: $K(b, \delta) \subseteq K(a, r)$.

Sei $x \in K(b, \delta)$. Dann ist

$$d(x, a) \leq \underbrace{d(x, b)}_{<\delta} + \underbrace{d(b, a)}_{=r-\delta} < \delta + r - \delta = r,$$

also $x \in K(a, r)$.

A⁰: Sei $a \in A^0$. Dann ist a innerer Punkt von A , also existiert eine Kugel $K(a, r) \subseteq A$. Ist diese Kugel $\subseteq A^0$?

Sei $b \in K(a, r)$. Dann ist b innerer Punkt von $K(a, r)$, d. h. es existiert ein $\delta > 0$ mit $K(b, \delta) \subseteq K(a, r) \subseteq A$.

Für $b \in A^0$ folgt also $K(a, r) \subseteq A^0$, d. h. $(A^0)^0 = A^0$.

- (b) Sei $A_1 \cap \dots \cap A_m = A$. Wenn $a \in A$ ist, existieren $r_j > 0$ mit $K(a, r_j) \subseteq A_j$ für $j = 1, \dots, m$. Setze $r := \min\{r_1, \dots, r_m\}$. Dann ist

$$K(a, r) \subseteq K(a, r_j) \subseteq A_j \text{ für } j = 1, \dots, m,$$

also ist $K(a, r) \subseteq A$, A ist offen.

- (c) Sei $A = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ und $a \in A$, also $a \in A_j$ für ein λ . Dann existiert ein $r > 0$ mit $K(a, r) \subseteq A_\lambda \subseteq A$. A ist offen.

Achtung: Sei $A_j = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < \frac{1}{j} \right\} = K\left(0, \frac{1}{j}\right)$ im $\mathbb{R}^n$.

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_j = \{0\} \text{ ist nicht offen}$$

7.2.8 Bemerkung

Jede Menge A mit $K(a, r) \subseteq A$ für irgendein $r > 0$ heißt *Umgebung* des Punktes a .

B Folgen

In diesem Abschnitt ist M ein metrischer Raum, $a \in M$ und $a_n \in M$ für $n = 1, 2, \dots$

7.2.9 Definition: Folge

Eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow M$, $n \mapsto a_n$, heißt *Folge*, und wird mit (a_n) bezeichnet. (a_n) heißt konvergent gegen A , wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, a) = 0$ ist. Schreibweise: $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein n_0 mit $d(a_n, a) < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$.

7.2.10 Eigenschaften

- (a) Der Grenzwert ist eindeutig bestimmt.
- (b) Aus $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow b$ folgt $d(a_n, b_n) \rightarrow d(a, b)$.
- (c) Aus $a_n \rightarrow a$ folgt $d(a, a_n) \leq \text{const.}$ für alle n . Konvergente Folgen sind auch beschränkt, d. h. es existiert eine Kugel, die alle a_n enthält.

Beweis:

- (a) Gelte $a_n \rightarrow a$ und $a_n \rightarrow b$. Dann ist

$$0 \leq d(a, b) \leq \underbrace{d(a, a_n)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{d(a_n, b)}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0$$

Also ist $d(a, b) = 0$, d. h. $a = b$.

- (b)

$$\begin{aligned} |d(a_n, b_n) - d(a, b)| &= |d(a_n, b_n) - d(a_n, b) + d(a_n, b) - d(a, b)| \\ &\leq |d(a_n, b_n) - d(a_n, b)| + |d(a_n, b) - d(a, b)| \\ &\leq d(b_n, b) + d(a_n, a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

- (c) Sei $\varepsilon = 1$.

Dann ist $d(a_n, a) < \varepsilon$ für $n \geq n_0$ und $d(a_n, a) \leq c$ für $n = 1, 2, \dots, n_0 - 1$. Setze $e = \max(1, c)$.

Dann ist $a_n \in K(a, e)$ für alle n .

Gibt es auch ein r , so daß $a_n \in K(b, r)$ für alle n ist?

$$d(a_n, b) \leq d(a_n, a) + d(a, b) \leq e + d(a, b) =: r$$

7.2.11 Beispiel

Nehme $C([a, b])$ mit der Metrik $d(f, g) := \|f - g\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} |f(t) - g(t)|$. Dann sind äquivalent:

1. $f_n \rightarrow f$ im Raum, d. h. $d(f_n, f) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.
2. $f_n(t) \rightarrow f(t)$ gleichmäßig in $[a, b]$.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “ Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein n_0 , so daß für $n \geq n_0$ gilt:

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon.$$

Dies gilt für $a \leq t \leq b$, d. h. es liegt gleichmäßige Konvergenz vor.

„ $\Leftarrow$ “ Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein n_0 , so daß für $n \geq n_0$ und alle $t \in [a, b]$ gilt:

$$|f(t) - f_n(t)| < \varepsilon$$

Wegen der gleichmäßigen Konvergenz ist $f \in C([a, b])$, also ist

$$\|f_n - f\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} |f_n(t) - f(t)| < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0.$$

7.2.12 Satz

Im $\mathbb{R}^n$ (mit Euklidmetrik) sind äquivalent:

1. Die Folge $(x^{(m)})$ konvergiert gegen $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
2. Die Folgen $(x_\nu^{(m)})$ konvergieren für $\nu = 1, \dots, n$ gegen x_ν .

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “: Gelte $x^{(m)} \rightarrow x$ für $m \rightarrow \infty$ mit $x = (x_1, \dots, x_n)$. Dann ist für $1 \leq \nu \leq n$:

$$|x_\nu^{(m)} - x_\nu| \leq \|x^{(m)} - x\| \rightarrow 0 \text{ für } m \rightarrow \infty,$$

d. h. $x_\nu^{(m)} \rightarrow x_\nu$.

„ $\Leftarrow$ “: Gelte $x_\nu^{(m)} \rightarrow x_\nu$ für $m \rightarrow \infty$ und sei $x := (x_1, \dots, x_n)$. Dann ist

$$\|x^{(m)} - x\| = \sqrt{\sum_{\nu=1}^n (x_\nu^{(m)} - x_\nu)^2} \stackrel{\text{CSU}}{\leq} \sum_{\nu=1}^n |x_\nu^{(m)} - x_\nu| \rightarrow 0 \text{ für } m \rightarrow \infty.$$

7.2.13 Regeln

Im $\mathbb{R}^n$ gelten die folgenden Regeln:

- (1) $x^{(m)} \rightarrow x, \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda x^{(m)} \rightarrow \lambda x$.
- (2) $x^{(m)} \rightarrow x, y^{(m)} \rightarrow y \Rightarrow x^{(m)} + y^{(m)} \rightarrow x + y$.
- (3) $x^{(m)} \rightarrow x, y^{(m)} \rightarrow y \Rightarrow x^{(m)} \cdot y^{(m)} \rightarrow x \cdot y$, insbesondere $\|x^{(m)}\| \rightarrow \|x\|$.

Beweis: Für (1) und (2): Aufgabe. Für (3) in der Globalübung vom 18. April 1994.

Bemerkung: (1) und (2) gelten in jedem normierten Raum, (3) gilt in jedem Vektorraum mit Skalarprodukt.

C Abgeschlossene Mengen

In diesem Abschnitt ist (M, d) ein metrischer Raum, $A, B, \dots \subseteq M$ und $a_n, a \in M$.

7.2.14 Definition: Rand, abgeschlossen, Häufungspkt., abgeschl. Hülle

- (1) $A \subseteq M$ heißt *abgeschlossen*, wenn $M \setminus A$ offen ist.
- (2) $a \in M$ heißt *Häufungspunkt* von $A \subseteq M$, wenn es eine Folge (a_n) in $A \setminus \{a\}$ mit $a_n \rightarrow a$ gibt.
- (3) A' ist die *Menge aller Häufungspunkte* von A .
- (4) $\bar{A} = A \cup A'$ ist die *abgeschlossene Hülle* von A .
- (5) $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$ ist der *Rand* von A , die Punkte von ∂A sind die *Randpunkte*.

7.2.15 Beispiel

Sei $A = \{x: \|x\| \leq 1\}$ im $\mathbb{R}^n$ mit Euklidmetrik.

- (1) A ist abgeschlossen, d. h. $B = \mathbb{R}^n \setminus A$ ist offen.

Sei $x \in B$. Dann ist $\|x\| = 1 + \delta$ mit $\delta > 0$.

Zeige $K(x, \delta) \subseteq B$: Sei $y \in K(x, \delta)$. Dann ist

$$\|y\| = \|y - x + x\| = \|y - x - (-x)\| \geq \|x\| - \|y - x\| > 1 + \delta - \delta = 1.$$

Also ist $K(x, \delta) \subseteq B$, x ist innerer Punkt von B , B ist offen und A abgeschlossen.

- (2) Es ist $A' = A = \bar{A}$.

Beweis: Sei $a \in A$ mit $a \neq 0$ und $a^{(m)} = (1 - \frac{1}{m}) \cdot a \neq a$.

Es ist $a^{(m)} \rightarrow a$ und $\|a^{(m)}\| = |1 - \frac{1}{m}| \cdot \|a\| < 1 \cdot \|a\| \leq 1$, d. h. $a^{(m)} \in A$.

Also ist a Häufungspunkt von A und damit $A \subseteq A'$.

Jetzt ist noch $A' \subseteq A$ zu zeigen:

Sei $a \in A'$. Dann gibt es eine Folge $a^{(m)} \in A$ mit $a^{(m)} \rightarrow a$ (bzw. $a = \lim_{m \rightarrow \infty} a^{(m)}$) und es ist

$$\|a\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \underbrace{\|a^{(m)}\|}_{\leq 1} \leq 1,$$

d. h. $a \in A$. Also ist $A' = A$ und damit auch $\bar{A} = A$.

- (3) Es ist $A^\circ = \{x: \|x\| < 1\} = K(0, 1)$.

Beweis: $K(0, 1) \subseteq A^\circ$ ist klar, da $K(0, 1) \subseteq A$ und $K(0, 1)$ offen ist.

Sei umgekehrt $x \in A^\circ$. Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $K(x, \delta) \subseteq A$. Insbesondere ist $\|x\| \leq 1$.

Wenn $\|x\| = 1$ ist, setze $y = x(1 + \frac{\delta}{2})$ und es ist $\|y - x\| = \frac{\delta}{2}\|x\| < \delta$, d. h. $y \in K(x, \delta)$.

Es ist aber $\|y\| = (1 + \frac{\delta}{2})\|x\| > 1$, d. h. $y \notin A$. Widerspruch!

Somit ist $A^\circ = K(0, 1)$. Also gilt $\partial A = \{x: \|x\| = 1\}$.

7.2.16 Aufgabe

Es ist bereits gezeigt, daß $H = \{x: a \cdot x > \alpha\}$ für $a \in \mathbb{R}^n$, $\|a\| = 1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ offen ist. Zeige: $\bar{H} = \{x: a \cdot x \geq \alpha\}$ ist abgeschlossen. Bestimme die Häufungspunkte, das Innere und den Rand.

7.2.17 Satz

- (a) $\emptyset$, M , A' , $\bar{A}$ und ∂A sind abgeschlossen.
- (b) A abgeschlossen $\iff A' \subseteq A \iff \partial A \subseteq A \iff A = \bar{A}$.
- (c) $a \in M$ ist Randpunkt von $A \iff$ Es gibt Folgen (a_n) in A und b_n in $M \setminus A$ mit $a_n \rightarrow a$ und $b_n \rightarrow a$.
- (d) Sind $A_1, \dots, A_m$ abgeschlossen, so ist auch $A_1 \cup \dots \cup A_m$ abgeschlossen.
- (e) Sind A_λ für $\lambda \in \Lambda$ abgeschlossen, so ist $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ abgeschlossen.

Beweis:

- (a) $\emptyset$ und M klar.

Beweis für $\bar{A}$. Es ist $\bar{A} = A \cup A'$. Sei $B = M \setminus \bar{A}$ und $b \in B$.

Es gilt: $b \notin A$ und $b \notin A'$. Also existiert keine Folge (a_n) in A mit $a_n \neq b$ und $a_n \rightarrow b$. Dann existiert auch keine Folge (a_n) in A mit $a_n \rightarrow b$,

d. h. es existiert $\varepsilon > 0$ mit $K(b, \varepsilon) \cap A = \emptyset$ und $K(b, \varepsilon) \cap A' = \emptyset$.

Es ist also $K(b, \varepsilon) \subseteq B$, d. h. $b \in B^0$. B ist offen, $\bar{A}$ ist geschlossen.

- (b) Zeige hier: A ist abgeschlossen $\iff A = \bar{A}$

„ $\Leftarrow$ “: $A = \bar{A}$, also ist A abgeschlossen.

„ $\Rightarrow$ “: Zeige $A = \bar{A}$.

„ $\subseteq$ “: Es ist $A \subseteq A \cup A' = \bar{A}$

„ $\supseteq$ “: Sei $a \in \bar{A} = A \cup A'$. Dann ist $a \in A$ (o.k) oder $a \in A'$.

Sei also $a \in A'$, d. h. es existiert eine Folge (a_n) in A mit $a_n \neq a$ und $a_n \rightarrow a$.

Wäre $a \notin A$, dann wäre $a \in B = M \setminus A$. Dabei ist B offen.

Somit gibt es $\varepsilon > 0$ mit $K(a, \varepsilon) \subseteq B$.

Für $n \geq n_0$ ist dann $d(a_n, a) < \varepsilon$, d. h. $a_n \in K(a, \varepsilon) \subseteq B = M \setminus A$. Dann wären die $a_n \notin A$. Widerspruch zu $a_n \in A$.

Also muß $a \in A$ sein.

- (c) „ $\Rightarrow$ “: Sei $a \in \partial A = \bar{A} \setminus A^0$. Dann ist $a \in A'$ oder $a \in A$.

Für $a \in A'$ existiert eine Folge $(a_n) \in A \setminus \{a\}$ mit $a_n \rightarrow a$.

Für $a \in A \setminus A'$ Setze $a_n = a$.

Da $a \notin A^0$, folgt daß zu jedem $\varepsilon > 0$, z. B. zu $\varepsilon = \frac{1}{n}$ existiert eine Folge $b_n \notin A$, aber $d(a, b_n) < \frac{1}{n}$.

„ $\Leftarrow$ “: Sei $a_n \in A$ mit $a_n \rightarrow a$ (1) und $b_n \notin A$ mit $b_n \rightarrow a$ (2).

Aus (1) folgt $a \in A'$ oder $a \in A$, also $a \in \bar{A}$.

Aus (2) folgt $a \notin A^0$.

Zusammen gilt: $a \in \bar{A} \setminus A^0 = \partial A$.

(d) Nach deMorgan gilt:

$$M \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_m) = \underbrace{(M \setminus A_1)}_{\text{offen}} \cap (M \setminus A_2) \cap \dots \cap (M \setminus A_m) \text{ ist offen.}$$

(e) Ebenso gilt:

$$M \setminus \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \underbrace{M \setminus A_\lambda}_{\text{offen}} \text{ ist offen.}$$

7.3 Kompakte und vollständige Räume

7.3.1 Definition: Kompakt

Sei (M, d) ein metrischer Raum und $A \subseteq M$. A heißt *kompakt*, wenn jede Folge in A eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in A besitzt.

7.3.2 Satz

Kompakte Mengen sind abgeschlossen und beschränkt, d. h. zu $a \in A$ existiert ein $r > 0$ mit $d(x, a) \leq r$ für alle $x \in A$.

Beweis: Sei $a \in A'$, d. h. es existiert eine Folge (a_n) in A mit $a_n \rightarrow a$. Nach Definition ist aber $a \in A$ und damit $A' \subseteq A$. A ist abgeschlossen.

Zeigen noch: $r := \sup\{d(x, a) : x \in A\} < \infty$.

Es existiert ein Folge (x_n) in A mit $d(x_n, a) \rightarrow r$.

Es existiert ein konvergente Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \rightarrow x \in A$.

Damit ist $r = \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_{n_k}, a) = d(x, a) \in \mathbb{R}$, d. h. $r < \infty$.

7.3.3 Beispiel

Sei $M = C([a, b])$ mit $d(u, v) := \sqrt{\int_a^b (u(t) - v(t))^2 dt} = \|u - v\|$ und $A = \{u \in C([a, b]) : \|u\| \leq 1\}$.

A ist beschränkt. ✓

A ist abgeschlossen: Sei $u \in A'$, d. h. es gibt eine Folge $u_n \in A$ mit $u_n \rightarrow u$, u stetig ($u \in M$) und es ist

$$\|u\| = \sqrt{\int_a^b (u(t))^2 dt} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\|u_n\|}_{\leq 1} \leq 1,$$

d. h. $u \in A$. Also ist A abgeschlossen.

A ist nicht kompakt (zeige dies hier für das Intervall $[a, b] = [-\pi, \pi]$): Setze

$$u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sin nt.$$

Dann ist

$$\|u_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} (\sin nt)^2 dt = 1$$

und

$$\|u_n - u_m\|^2 = 1 + 2 \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\sin nt) \cdot (\sin mt) dt}_{=0 \text{ für } n \neq m} + 1 = 2$$

$$\|u_n - u_m\| = \sqrt{2}$$

keine konvergente Teilfolge u_{n_k} kann existieren, sonst

$$0 \leftarrow \|u_{n_k+q} - u_{n_k}\| = \sqrt{2} \text{ Widerspruch}$$

7.3.4 Satz von Bolzano-Weierstraß

- (a) Im $\mathbb{R}^n$ ist jede beschränkte und abgeschlossene Menge kompakt.
 (b) Im $\mathbb{R}^n$ besitzt jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge (siehe auch 2.3.3, Seite 26).

Beweis:

- (a) Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$ beschränkt und abgeschlossen und $(x^{(m)})$ eine Folge in A . Nach (b) existiert eine konvergente Teilfolge $(x^{(m_k)})$ mit $x^{(m_k)} \rightarrow x \in A \cup A' \stackrel{\otimes}{=} A$. d. h. A ist kompakt. Dabei gilt $\otimes$, da A abgeschlossen ist.

- (b) Induktion nach der Dimension n :

$n = 1$: Siehe 2.3.3, Seite 26.

$n \mapsto n + 1$: Sei $x \in \mathbb{R}^{n+1}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$.

Setze $y = (x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^n$. Spalte die Folgenglieder $x^{(m)}$ auf in $x^{(m)} = (x_1^{(m)}, y^{(m)})$ mit $x_1^{(m)} \in \mathbb{R}$ und $y^{(m)} \in \mathbb{R}^n$. Dann ist

$$\|y^{(m)}\|_{(\text{im } \mathbb{R}^n)} \leq \|x^{(m)}\|_{(\text{im } \mathbb{R}^{n+1})} = \sqrt{(x_1^{(m)})^2 + \|y^{(m)}\|^2}.$$

$(y^{(m)})$ ist beschränkt im $\mathbb{R}^n$, hat also nach Induktionsvoraussetzung eine konvergente Teilfolge $(y^{(m_k)})$. Die reelle Folge $(x_1^{(m_k)})$ ist beschränkt durch $|x_1| \leq \|x\|$, d. h. es existiert eine konvergente Teilfolge $(x_1^{(m_{k_j})})$. $(y^{(m_{k_j})})$ konvergiert, also konvergiert $(x^{(m_{k_j})})$ auch.

Bemerkung: Später wird einfach gesagt: „OBdA² sind beschränkte Folgen im $\mathbb{R}^n$ auch konvergent.“

7.3.5 Definition: Cauchyfolge, vollständig, Banachraum

Eine Folge (x_n) im metrischen Raum (M, d) heißt *Cauchyfolge*, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt mit $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ für $n > m \geq n_0$. M heißt *vollständig*, wenn jede Cauchyfolge in M konvergent ist (mit Grenzwert in M). Ein normierter Raum $(E, \|\cdot\|)$ heißt *vollständig* oder *Banachraum*, wenn er mit der Metrik $d(x, y) := \|x - y\|$ vollständig ist.

²Soll heißen: „Ohne Bedenken des Autors.“

7.3.6 Beispiele/Bemerkungen

(a) Jede konvergente Folge ist Cauchyfolge.

Beweis: Sei $x_n \rightarrow x$. Dann ist

$$d(x_n, x_m) \leq \underbrace{d(x_n, x)}_{\substack{< \varepsilon/2 \\ n \geq n_0}} + \underbrace{d(x, x_m)}_{\substack{< \varepsilon/2 \\ m \geq n_0}} < \varepsilon \text{ für } n > m \geq n_0$$

(b) $\mathbb{R}$ mit $|\cdot|$ ist Banachraum (Cauchy Kriterium).

(c) $\mathbb{R}^n$ ist ein Banachraum (vollständig mit Euklidnorm).

Beweis: Sei $(x^{(m)})$ eine Cauchyfolge. Dann ist für $\nu = 1, \dots, n$

$$|x_\nu^{(m)} - x_\nu^{(k)}| \leq \|x^{(m)} - x^{(k)}\| < \varepsilon \text{ für } m > k \geq k_0.$$

Also sind $(x_\nu^{(m)})$ Cauchyfolgen in $\mathbb{R}$ mit $x_\nu^{(m)} \rightarrow x_\nu$ für $m \rightarrow \infty$ und $\nu = 1, \dots, n$.
Zusammen ist dann $x^{(m)} \rightarrow x = (x_1, \dots, x_n)$.

(d) $C([a, b])$ mit $\|u\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} |u(t)|$ ist ein Banachraum.

Beweis: Sei (u_n) eine Cauchyfolge, d. h. zu $\varepsilon > 0$ existiert ein n_0 mit

$$|u_n(t) - u_m(t)| \leq \|u_n - u_m\|_\infty < \varepsilon \text{ für } n > m \geq n_0 \text{ und } a \leq t \leq b. \quad (7.1)$$

Also konvergiert u_n gleichmäßig gegen die Grenzfunktion $u \in C([a, b])$.

Noch zu zeigen, daß $u_m \rightarrow u$ in der Norm: Aus 7.1 folgt:

$$|u_n(t) - u_m(t)| < \varepsilon.$$

Für $n \rightarrow \infty$ gilt damit

$$|u(t) - u_m(t)| \leq \varepsilon \text{ für } m \geq n_0, a \leq t \leq b.$$

Also ist

$$\|u - u_m\| \leq \varepsilon \text{ für } m \geq n_0,$$

d. h. $u_m \rightarrow u$ im Raum (in der Norm).

(e) $C([a, b])$ mit $\|u\| = \sqrt{\int_a^b (u(t))^2 dt}$ ist **kein** Banachraum.

Beweis: Für das Intervall $[0, 1]$: Setze

$$u_n(t) = \begin{cases} t^{-1/3} & \text{für } 1/n \leq t \leq 1 \\ n^{1/3} & \text{für } 0 \leq t \leq 1/n \end{cases}.$$

Sein nun $n > m$. Dann ist

$$\begin{aligned} \|u_n - u_m\|^2 &= \int_0^{1/m} (u_n(t) - u_m(t))^2 dt = \int_0^{1/n} (n^{1/3} - m^{1/3})^2 dt + \int_{1/n}^{1/m} (t^{-1/3} - m^{1/3})^2 dt \\ &\leq \frac{1}{n} \cdot (n^{1/3})^2 + \int_{1/n}^{1/m} (t^{-1/3})^2 dt = n^{-1/3} + 3t^{1/3} \Big|_{1/n}^{1/m} \\ &< n^{-1/3} + 3 \cdot m^{-1/3} < 4m^{-1/3} < \varepsilon \text{ für } m > \left(\frac{4}{\varepsilon}\right)^3. \end{aligned}$$

Also ist (u_n) eine Cauchyfolge.

Zeige nun, daß (u_n) nicht in $C([0, 1])$ konvergiert.

Annahme: $\|u_n - u\| \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ für ein $u \in C([0, 1])$. Dann gibt es zu $\varepsilon > 0$ ein n_0 mit $\|u_n - u\| < \varepsilon$ für $n \geq n_0$.

Sei nun $\delta \in (0, 1)$ beliebig und n so groß, daß $\frac{1}{n} < \delta$ ist.:

$$\int_{\delta}^1 (t^{-1/3} - u(t))^2 dt \leq \int_0^1 (u_n(t) - u(t))^2 dt < \varepsilon^2$$

Es ist also $u(t) = t^{-1/3}$ in $[\delta, 1]$, d. h. $u(t) = t^{-1/3}$ in $(0, 1]$, aber es ist $u \notin C([0, 1])$. Widerspruch!
Also konvergiert u nicht in $C([0, 1])$.

7.4 Stetige Funktionen

7.4.1 Definition: Stetigkeit

Es seien (M, d) und (N, ϱ) metrische Räume und $f: M \rightarrow N$.

(1) f heißt stetig im Punkt $x_0 \in M$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit

$$\varrho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon \text{ für alle } x \in M \text{ mit } d(x, x_0) < \delta.$$

[Äquivalent ist: $f(\underbrace{K(x_0, \delta)}_{\subseteq M}) \subseteq \underbrace{K(f(x_0), \varepsilon)}_{\subseteq N}$.]

(2) f heißt stetig (in M), wenn f in jedem Punkt $x_0 \in M$ stetig ist.

(3) f heißt gleichmäßig stetig, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit

$$\varrho(f(x), f(y)) < \varepsilon \text{ für } x, y \in M \text{ mit } d(x, y) < \delta.$$

Vergleiche auch mit den entsprechenden Definitionen in $\mathbb{R}$: [3.2.1](#) auf der Seite [48](#) und [3.2.10](#) auf der Seite [50](#).

7.4.2 Bemerkungen

(a) Sei $f: M \setminus \{x_0\} \rightarrow N$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \iff \text{zu jedem } \varepsilon > 0 \text{ gibt es ein } \delta > 0 \text{ mit} \\ \varrho(f(x), y_0) < \varepsilon \text{ für alle } x \in M \text{ mit } d(x, x_0) < \delta, x \neq x_0.$$

(b) f ist in x_0 stetig

$\iff$ für jede Folge (x_n) in $M \setminus \{x_0\}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ hat $(f(x_n))$ einen Grenzwert. Der gemeinsame Grenzwert ist dann $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

(vgl. Folgenkriterium, [3.1.3](#) auf Seite [45](#))

7.4.3 Beispiel

Sei $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^\beta}{x^2 + y^2} \text{ für } \alpha, \beta > 0.$$

Behauptung:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \iff \alpha + \beta > 2$$

und der Grenzwert existiert nicht für $\alpha + \beta \leq 2$.

Beweis: Sei $t = \max(|x|, |y|)$. Dann ist

$$\begin{aligned} |f(x, y) - 0| &= \frac{|x|^\alpha \cdot |y|^\beta}{x^2 + y^2} \\ &\leq \frac{t^{\alpha+\beta}}{t^2} \\ &= t^{\alpha+\beta-2} \rightarrow 0 \text{ falls } \alpha + \beta - 2 > 0 \text{ für } (x, y) \rightarrow (0, 0) \end{aligned}$$

Sei nun $\alpha + \beta \leq 2$. Dann ist

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= 0 \\ f(0, y) &= 0 \\ f(x, x) &= \frac{|x|^{\alpha+\beta}}{2x^2} = \frac{1}{2}|x|^{\alpha+\beta-2} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{für } \alpha + \beta = 2 \\ +\infty & \text{für } \alpha + \beta < 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Also existiert der Grenzwert nicht.

7.4.4 Komposition

Seien (M, d) , (N, ϱ) und (P, σ) metrische Räume, $g: M \rightarrow N$ sei stetig in $x_0 \in M$ und $f: N \rightarrow P$ sei stetig in $y_0 = g(x_0)$. Dann ist $h = f \circ g: M \rightarrow P$, $h(x) := f(g(x))$ stetig in x_0 .

Beweis: Wie in 3.2.2 (e), Seite 48.

7.4.5 Satz

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n$ mit der Euklidmetrik und $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. f ist genau dann stetig in $\xi \in M$, wenn alle $f_\nu: M \rightarrow \mathbb{R}$ in ξ stetig sind.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “: Für $\nu = 1, \dots, n$ gilt:

$$\begin{aligned} |f_\nu(x) - f_\nu(\xi)| &\leq \|f(x) - f(\xi)\| \\ &< \varepsilon \text{ für } \|x - \xi\| < \delta, x \in M \end{aligned}$$

Also ist f_ν stetig in ξ .

„ $\Leftarrow$ “:

$$\|f(x) - f(\xi)\| \leq \sum_{\nu=1}^m \underbrace{|f_{\nu}(x) - f_{\nu}(\xi)|}_{< \varepsilon/m}$$

für $\|x - \xi\| < \delta_{\nu}$.

Gilt nun $\|x - \xi\| < \delta = \min\{\delta_{\nu} : \nu = 1, \dots, m\}$, dann ist

$$\|f(x) - f(\xi)\| \leq \sum_{\nu=1}^m |f_{\nu}(x) - f_{\nu}(\xi)| < \varepsilon.$$

7.4.6 Regeln für Funktionen vom Typ $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\xi \in M$ und f, g stetig in ξ (in ganz M). Dann ist

- (a) $f + g$
- (b) λf für $\lambda \in \mathbb{R}$
- (c) das Skalarprodukt $f \cdot g = f_1 g_1 + \dots + f_m g_m$

stetig in ξ (in ganz M).

Beweis: Wie in $\mathbb{R}$, siehe 3.2.2 auf Seite 48.

7.4.7 Satz

Ist $A \subseteq M$ kompakt und $f: A \rightarrow N$ stetig, so ist $f(A) \subseteq N$ kompakt.

Beweis: Sei (y_n) Folge in $f(A)$, d. h. $y_n = f(x_n)$ mit einem $x_n \in A$. Dann ist (x_n) Folge in A und es existiert eine konvergente Teilfolge $x_{n_k} \rightarrow \xi \in A$. Dann gilt wegen der Stetigkeit von f für $k \rightarrow \infty$

$$y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi) \in f(A).$$

7.4.8 Satz vom Minimum und Maximum

Sei $A \subseteq M$ kompakt, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ sei stetig. Dann gibt es $x_*, x^* \in A$ mit

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \text{ für alle } x \in A.$$

Vergleiche auch mit 3.2.4 auf Seite 49.

Beweis: Da A kompakt ist, ist auch $B = f(A)$ kompakt. Zeige nun noch (als Aufgabe): Aus der Kompaktheit von $B \subseteq \mathbb{R}^n$ folgt $\max B \in B$ und $\min B \in B$.

Idee: Nehme Folge $b_n \in B$ mit $b_n \rightarrow \sup B$. $\sup B < \infty$? $\sup B \in B$? $\Rightarrow \max$.

7.4.9 Definition: Äquivalenz von Normen

Sei E ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Zwei Normen $\|\cdot\|_{\alpha}$ und $\|\cdot\|_{\beta}$ heißen äquivalent, wenn es $A > 0$ und $B > 0$ gibt mit

$$\|x\|_{\beta} \leq B\|x\|_{\alpha} \text{ und } \|x\|_{\alpha} \leq A\|x\|_{\beta} \text{ für alle } x \in E.$$

7.4.10 Beispiel

Sei $E = \mathbb{R}^n$ mit der Euklidnorm $\|\cdot\|$ und der Summennorm $\|\cdot\|_1$. Dann ist

$$\|x\|_1 = \sum_{\nu=1}^n 1 \cdot |x_\nu| \stackrel{\text{CSU}}{\leq} \sqrt{\sum_{\nu=1}^n 1^2} \cdot \sqrt{\sum_{\nu=1}^n x_\nu^2} = \sqrt{n} \cdot \|x\|$$

und

$$\|x\| \leq \|x\|_1.$$

7.4.11 Satz

Im $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent.

Beweis: Für Die Euklidnorm $\|\cdot\|$ und eine beliebige Norm $|\cdot|_N$.

Sei $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ die „Oberfläche der Einheitskugel“.

Sei $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = |x|_N$. Behauptung: f ist stetig:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= ||x|_N - |y|_N| \leq |x - y|_N \\ &= \left| \sum_{\nu=1}^n (x_\nu - y_\nu) e^\nu \right|_N \end{aligned}$$

mit e^ν , dem ν -ten Einheitsvektor

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{\nu=1}^n \underbrace{|x_\nu - y_\nu|}_{a_\nu} \cdot |e^\nu|_N \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \underbrace{\sqrt{\sum_{\nu=1}^n |e^\nu|_N^2}}_{=:C} \cdot \|x - y\| \end{aligned}$$

Wähle für $\varepsilon > 0$ nun $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$. Dann hat f Minimum/Maximum auf S^{n-1} :

$$0 < m \leq f(x) \leq M < \infty \text{ auf } S^{n-1}.$$

$$m \cdot \|x\| \leq |x|_N \leq M \cdot \|x\| \text{ für } x \in S^{n-1}.$$

Sei nun $x \neq 0$, $x \in \mathbb{R}^n$. Setze $\xi = \frac{x}{\|x\|} \in S^{n-1}$. Dann ist $|\xi|_N \leq M$ und

$$M \geq |\xi|_N = \left| \frac{x}{\|x\|} \right|_N = \left| \frac{1}{\|x\|} \cdot x \right|_N = \frac{1}{\|x\|} \cdot |x|_N,$$

also

$$|x|_N \leq M \cdot \|x\| \text{ für } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ (auch für } x = 0)$$

Zeige genauso: $|x|_N \geq m \cdot \|x\|$.

7.4.12 Bemerkung

Die Begriffe „innerer Punkt“, „Häufungspunkt“, „Randpunkt“, A^0 , $\bar{A}$, A' , ∂A , „Konvergenz von Folgen“ und „Stetigkeit von Funktionen“ sind unabhängig definiert von der verwendeten Norm (dies gilt für alle endlich dimensionalen Räume).

7.4.13 Beispiel

Betrachte den Raum $C([a, b])$. Die Normen

$$\|u\|_\infty = \max_{a \leq t \leq b} |u(t)| \quad \text{und} \quad \|u\| = \sqrt{\int_a^b (u(t))^2 dt}$$

sind nicht äquivalent!

Beweis: Hier konkret für das Intervall $[a, b] = [0, 1]$: Es ist

$$\|u\|^2 = \int_0^1 (u(t))^2 dt \leq \max_{0 \leq t \leq 1} |u(t)|^2 = \|u\|_\infty^2,$$

also ist $\|u\| \leq \|u\|_\infty$.

Dagegen ist $\|u\|_\infty \leq C \cdot \|u\|$ für alle $u \in C([0, 1])$ nicht möglich.

Annahme: Ein solches festes $C > 0$ existiert doch. Setze

$$u_n(t) = \begin{cases} t^{-1/3} & \text{in } [\frac{1}{n}, 1] \\ n^{1/3} & \text{in } [0, \frac{1}{n}] \end{cases}.$$

Es ist

$$\|u_n\|_\infty = n^{1/3}$$

und

$$\|u_n\|^2 < \int_0^1 t^{-2/3} dt = 3t^{1/3} \Big|_0^1 = 3,$$

also ist

$$\|u_n\| < \sqrt{3}$$

und es muß gelten:

$$n^{1/3} = \|u_n\|_\infty \leq C \|u_n\| < C\sqrt{3} \quad \text{Widerspruch!}$$

7.5 Mehr über stetige Funktionen

7.5.1 Satz von Heine

Ist $A \subseteq M$ kompakt und $f: A \rightarrow N$ stetig, so ist f gleichmäßig stetig (vergleiche auch mit [3.2.12](#), Seite [51](#)).

Beweis: Annahme: $f: M \rightarrow N$ $[(M, d)$ und $(N, \varrho)]$ ist nicht gleichmäßig stetig.

Zu $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$ existieren die Folgen $x_n, y_n \in A$ mit $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$, aber mit $\varrho(f(x_n), f(y_n)) \geq \eta > 0$.

OBdA sei (x_n) konvergent (Kompaktheit, anderenfalls wähle konvergente Teilfolge):

$$x_n \rightarrow x \in A \quad \text{und} \quad y_n \rightarrow x.$$

$$0 < \eta \leq \varrho(f(x_n), f(y_n)) \xrightarrow{\text{Stetigkeit}} \varrho(f(x), f(x)) = 0 \quad \text{Widerspruch!}$$

7.5.2 Satz über die Umkehrfunktion

Sei $A \subseteq M$ kompakt, $f: A \rightarrow N$ sei stetig und injektiv. Dann ist $f^{-1}: f(A) \rightarrow A$ stetig (siehe auch 3.2.9, Seite 50).

Beweis: Sei $y \in f(A)$ mit $y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$.

Zeige: $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(y_n) = x = f^{-1}(y)$ für jede Folge (y_n) in $f(A)$ mit $y_n \rightarrow y$.

Setze $x_n = f^{-1}(y_n)$. (x_n) ist Folge in A . Sei (x_{n_k}) eine konvergente Teilfolge mit $x_{n_k} \rightarrow x' \in A$. Dann ist

$$f(x') = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y.$$

Da f injektiv ist, ist $x' = x$. Dann gilt sogar (denn alle $x_{n_k} \rightarrow x$): $x_n \rightarrow x$.

Wenn f^{-1} nicht stetig sein soll, dann existiert eine Teilfolge (x_{n_j}) mit

$$d(x, x_{n_j}) \geq \eta > 0 \text{ für } j = 1, 2, 3, \dots$$

(x_{n_j}) hat eine konvergente Teilfolge $(x_{n_{j_k}})$, die auch Teilfolge von (x_n) ist. Damit ist $x_{n_{j_k}} \rightarrow x$ für $j \rightarrow \infty$. Also ist

$$0 < \eta \leq d(x, x_{n_{j_k}}) \rightarrow 0 \text{ Widerspruch!}$$

7.5.3 Definition

Seien $f_n, f: M \rightarrow N$ gegeben ($n = 1, 2, \dots$). f_n heißt gleichmäßig konvergent gegen f , wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$\varrho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0 \text{ und für alle } x \in M.$$

Siehe auch 3.3.1, Seite 52.

7.5.4 Satz

Gilt $f_n \rightarrow f$ gleichmäßig und sind alle f_n stetig [in $\xi \in M$ oder in M], dann ist auch f stetig (siehe auch 3.3.4, Seite 53).

Beweis: Wie bei $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

7.5.5 Banachscher Fixpunktsatz

Sei (M, d) ein vollständiger metrischer Raum und $T: M \rightarrow M$ eine Kontraktion, d. h. zu einem $q \in (0, 1)$ ist $d(Tx, Ty) \leq q \cdot d(x, y)$ für alle $x, y \in M$.

Dann hat T genau einen Fixpunkt x^* mit $x^* = Tx^*$.

Ist $x_0 \in M$ beliebig und $x_{n+1} = Tx_n$, so ist

$$d(x_n, x^*) \leq q^n \cdot \frac{d(x_1, x_0)}{1 - q},$$

insbesondere gilt $x_n \rightarrow x^*$. Man nennt (x_n) Folge der *sukzessiven Approximation*.

Beweis:

Eindeutigkeit: Sei $x = Tx$ und $y = Ty$. Dann ist

$$d(x, y) = d(Tx, Ty) \leq q \cdot d(x, y).$$

Damit ist dann

$$\underbrace{(1 - q)}_{\geq 0} \cdot d(x, y) \leq 0.$$

Es ist also $d(x, y) = 0$, d. h. $x = y$.

Existenz: Sei $x_0 \in M$ und $x_{n+1} = Tx_n$. Für $n \geq 2$ gilt dann:

$$d(x_n, x_{n-1}) = d(Tx_{n-1}, Tx_{n-2}) \leq q \cdot d(x_{n-1}, x_{n-2}).$$

Mit Induktion gilt dann: $d(x_n, x_{n-1}) \leq q^{n-1} \cdot d(x_1, x_0)$.

Sei nun $n > m$ beliebig. Dann ist

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq \sum_{j=m+1}^n \underbrace{d(x_j, x_{j-1})}_{\leq q^{j-1} d(x_1, x_0)} \leq d(x_0, x_1) \sum_{j=m+1}^n q^{j-1} \\ &= d(x_0, x_1) q^m \sum_{k=0}^{n-m-1} q^k < d(x_0, x_1) q^m \cdot \frac{1}{1-q} \end{aligned}$$

Also ist (x_n) eine Cauchyfolge.

Gelte nun $x_n \rightarrow x^*$. Für $n > m$ gilt

$$d(x_n, x_m) < \frac{d(x_0, x_1)}{1-q} \cdot q^m$$

und für $n \rightarrow \infty$ ist dann

$$d(x^*, x_m) \leq \frac{d(x_0, x_1)}{1-q} \cdot q^m$$

Gilt nun $x^* = Tx^*$?

$$Tx^* = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) \stackrel{T \text{ ist stetig}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x^*$$

7.5.6 Beispiel: Fredholmsche Integralgleichung

Sei $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und sei $k: [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Sei

$$f(x) = g(x) + \int_a^b k(x, y) f(y) dy \quad (7.2)$$

Gesucht ist $f \in C([a, b])$ mit (7.2).

Behauptung: Gilt $\max\{|k(x, y)|: a \leq x, y \leq b\} < \frac{1}{b-a}$, dann hat (7.2) genau eine Lösung $f \in C([a, b])$.

Beweis:

(1) Zeige: Aus $f \in C([a, b])$ folgt, daß $\tilde{f}(x) = \int_a^b k(x, y)f(y) dy$ stetig ist in $[a, b]$.

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Da k gleichmäßig stetig ist, gibt es ein $\delta > 0$ mit

$$|k(x, y) - k(x', y)| < \varepsilon \text{ für } a \leq y \leq b, a \leq x, x' \leq b, |x - x'| < \delta.$$

Außerdem ist $|f(x)| \leq M$ in $[a, b]$.

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(x) - \tilde{f}(x')| &= \left| \int_a^b (k(x, y) - k(x', y))f(y) dy \right| \leq \int_a^b \underbrace{|k(x, y) - k(x', y)|}_{< \varepsilon \text{ für } |x-x'| < \delta} \cdot M dy \\ &< M \cdot \varepsilon(b - a) = M(b - a) \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

(2) Setze

$$(Tf)(x) := g(x) + \int_a^b k(x, y)f(y) dy$$

mit $T: C([a, b]) \rightarrow C([a, b])$.

(3) $C([a, b])$ mit $\|f\|_\infty := \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$ ist vollständig.

(4) Ist T eine Kontraktion?

Nach Voraussetzung existiert ein $q \in (0, 1)$ mit $|k(x, y)| \leq \frac{q}{b-a}$ für alle (x, y) .

Seien $f, \varphi \in C([a, b])$:

$$\begin{aligned} |(Tf)(x) - (T\varphi)(x)| &= \left| \int_a^b k(x, y) \cdot (f(y) - \varphi(y)) dy \right| \\ &\leq \int_a^b \underbrace{|k(x, y)|}_{\leq \frac{q}{b-a}} \cdot \underbrace{|f(y) - \varphi(y)|}_{\leq \|f - \varphi\|_\infty} dy \\ &\leq \frac{q}{b-a} \|f - \varphi\|_\infty (b - a) = q \|f - \varphi\|_\infty \end{aligned}$$

Also ist

$$\|Tf - T\varphi\|_\infty \leq q \|f - \varphi\|_\infty$$

Die Bedingungen für den Banachschen Fixpunktsatz sind also erfüllt.

Um die Fixfunktion f^* anzunähern, wählt man ein beliebiges $f_0 \in C([a, b])$ und berechnet iterativ

$$f_{n+1}(x) = g(x) + \int_a^b k(x, y)f_n(y) dy.$$

Dabei gilt als Fehlerabschätzung für $a \leq x \leq b$:

$$|f_n(x) - f^*(x)| \leq \frac{\|f_0 - f_1\|_\infty}{1 - q} \cdot q^n$$

7.5.7 Beispiel: Der Satz von Picard-Lindelöf

Sei $f: [a, b] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und

$$|f(t, u) - f(t, \bar{u})| \leq L \cdot |u - \bar{u}|$$

für $a \leq t \leq b$ und $u, \bar{u} \in \mathbb{R}$.

Gesucht ist die Lösung für das Anfangswertproblem (AWP)

$$u' = f(t, u), \quad u(a) = \alpha.$$

Für die Lösung u gilt: $u \in C^1([a, b])$ mit

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad u(a) = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Behauptung: (AWP) hat genau eine Lösung.

Beweis: (AWP) ist äquivalent zu der Integralgleichung (IGL)

$$u(t) = \alpha + \int_a^t f(s, u(s)) ds,$$

denn für eine Lösung $u \in C^1([a, b])$ von (AWP) gilt:

$$\begin{aligned} u(t) - u(a) &= u(t) - \alpha \\ &= \int_a^t u'(s) ds \\ &= \int_a^t f(s, u(s)) ds \end{aligned}$$

u ist also auch Lösung von (IGL).

Sei nun $u \in C([a, b])$ Lösung von (IGL):

$$u(t) = \alpha + \int_a^t f(s, u(s)) ds$$

Da $u \in C([a, b])$ ist, ist $f(s, u(s))$ stetig in $[a, b]$.

Also ist $\int_a^t f(s, u(s)) ds$ stetig differenzierbar, d. h. auch u ist stetig differenzierbar.

Es ist

$$\frac{d}{dt} u(t) = f(t, u(t)) \quad \text{und} \quad u(a) = \alpha.$$

Damit ist die Äquivalenz von (AWP) und (IGL) gezeigt.

Definiere nun T mit

$$T: \begin{cases} C([a, b]) & \rightarrow C([a, b]) \\ (Tu)(t) & = \alpha + \int_a^t f(s, u(s)) ds \end{cases}.$$

Besitzt T genau einen Fixpunkt? Versuche dies mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes zu zeigen. Definiere dazu folgende Norm auf $C([a, b])$:

$$\|u\| = \max_{a \leq t \leq b} \{|u(t)| \cdot \exp(-2L(t-a))\}$$

(Nachweis der Normeigenschaften als Aufgabe).

Behauptung: T ist eine Kontraktion mit $q = \frac{1}{2}$.

Seien $u, v \in C([a, b])$. Dann ist

$$\begin{aligned} |(Tu)(t) - (Tv)(t)| &= \left| \int_a^t (f(s, u(s)) - f(s, v(s))) ds \right| \\ &\leq \int_a^t \underbrace{|f(s, u(s)) - f(s, v(s))|}_{\leq L|u(s)-v(s)|} ds \\ &\leq L \int_a^t \underbrace{|u(s) - v(s)| \cdot \exp(-2L(s-a))}_{\leq \|u-v\|} \cdot \exp(2L(s-a)) ds \\ &\leq L\|u-v\| \cdot \frac{\exp(2L(s-a))}{2L} \Big|_a^t \\ &< L\|u-v\| \cdot \frac{\exp(2L(t-a))}{2L} \\ &= \|u-v\| \cdot \frac{\exp(2L(t-a))}{2} \end{aligned}$$

Also ist

$$|(Tu)(t) - (Tv)(t)| \cdot \exp(-2L(t-a)) < \frac{1}{2} \|u-v\|$$

und damit

$$\|Tu - Tv\| = \max\{|(Tu)(t) - (Tv)(t)| \cdot \exp(-2L(t-a))\} \leq \frac{1}{2} \|u-v\|.$$

Für den Banachschen Fixpunktsatz fehlt noch die Vollständigkeit von $C([a, b])$ mit der Norm $\|\cdot\|$. Zeige, daß $\|\cdot\|$ äquivalent zu $\|\cdot\|_\infty$ ist.

Es ist

$$\|u\| \leq \|u\|_\infty,$$

da $\exp(-2L(t-a)) \leq 1$ in $[a, b]$. Außerdem ist

$$|u(t)| \cdot \exp(-2L(t-a)) \geq |u(t)| \cdot \underbrace{\exp(-2L(b-a))}_{=:\frac{1}{C}}$$

Damit ist

$$|u(t)| \leq C|u(t)| \exp(-2L(t-a)) \leq C\|u\|.$$

Da dies für $a \leq t \leq b$ gilt, ist

$$\|u\|_\infty \leq C\|u\|.$$

Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \|u_n - u_m\|_\infty &\leq C\|u_n - u_m\| \\ \|u_n - u_m\| &\leq \|u_n - u_m\|_\infty. \end{aligned}$$

Also ist der Raum vollständig, der Banachsche Fixpunktsatz kann angewendet werden, d. h. T hat genau einen Fixpunkt.

7.5.8 Konkretes Beispiel für den Satz von Picard-Lindelöf

Gesucht ist $u \in C([0, t_0])$ mit

$$u' = t + u \text{ und } u(0) = 0 \text{ in } [0, t_0] \times \mathbb{R}.$$

Hier ist $f(t, u) = t + u$.

Setze $L = 1$ und berechne u nach dem folgenden System:

Wähle $u_0 \in C([0, t_0])$ und berechne dann sukzessive

$$u_{n+1} = \int_0^t (s + u_n(s)) ds = \frac{t^2}{2} + \int_0^t u_n(s) ds.$$

Speziell: Wähle $u_0(t) \equiv 0$. Dann ist

$$\begin{aligned} u_1(t) &= \frac{t^2}{2} \\ u_2(t) &= \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3} \\ u_3(t) &= \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3} + \frac{t^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} \\ &\vdots \\ u_n(t) &= \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{t^{n+1}}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)}. \end{aligned}$$

Zeige dies für $u_n(t)$ per Induktion.

Es gilt:

$$\begin{array}{ccc} u_n(t) & = & \sum_{j=2}^{n+1} \frac{t^j}{j!} \\ & \downarrow & \downarrow \\ u(t) & = & e^t - 1 - t \end{array}$$

Führe eine **Probe** durch:

Es ist $u' = e^t - 1$ und $t + u = e^t - 1$, die beiden sind also gleich. Außerdem ist $u(0) = 0$.

7.5.9 Definition

Sei (M, d) ein metrischer Raum, $A \subseteq M$, $A \neq \emptyset$ und (O_λ) sein ein System von offenen Mengen mit $O_\lambda \subseteq M$ für $\lambda \in \Lambda$.

$(O_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ heißt *offene Überdeckung* von A , wenn $A \subseteq \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda$ ist. Gilt bereits $A \subseteq \bigcup_{j=1}^m O_{\lambda_j}$ für gewisse λ_j , so heißt $(O_{\lambda_j})_{j=1, \dots, m}$ eine *endliche Teilüberdeckung*.

7.5.10 Beispiel

Sei $A = (0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ und $I_n = (\frac{1}{n}, 2)$ für $n = 1, 2, \dots$

Es gilt $(0, 1] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n}, 2)$ (Aufgabe!)

und (I_n) enthält keine endliche Teilüberdeckung, denn sonst wäre

$$(0, 1] \subseteq \bigcup_{j=1}^m \left(\frac{1}{j}, 2\right) = \left(\frac{1}{m}, 2\right) \quad \text{Widerspruch!}$$

7.5.11 Satz von Heine-Borel

$A \subseteq M$ ist genau dann kompakt, wenn *jede* offene Überdeckung von A eine endliche Teilüberdeckung enthält.

Beweis:

„ $\Leftarrow$ “: Zu zeigen ist: (x_n) hat eine konvergente Teilfolge (x_{n_k}) mit $x_{n_k} \rightarrow x \in A$.

Widerspruchsbeweis:

Sei (x_n) eine Folge in A , die keine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in A hat.

Sei $a \in A$. Dann existiert ein $r(a) > 0$, so daß

$$K(a) := K(a, r(a))$$

höchstens ein x_n enthält.

$(K(a))_{a \in A}$ ist eine offene Überdeckung von A . Es werden aber unendlich viele U_a benötigt, um $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ zu überdecken, also auch für A . Widerspruch!

„ $\Rightarrow$ “: Sei A kompakt und $(O_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ eine offene Überdeckung.

Sei nun $a \in A$ und

$$r : \begin{cases} A & \rightarrow \mathbb{R} \\ r(a) & := \sup\{\varrho < 1 : K(a, \varrho) \subseteq O_\lambda \text{ für ein } \lambda \in \Lambda\} \end{cases}.$$

Behauptung: r ist stetig.

Beweis: Sei $x \in A$ fest. Dann gilt $0 < \varrho < r(x)$ und $d(y, x) < r(x)$, $d(x, y) < \varrho$.

Suche nun eine Abschätzung

$$r(y) \geq ?$$

Setzt man $\delta = d(x, y)$, so gilt

$$K(y, \varrho - \delta) \subseteq K(x, \varrho) \subseteq O_\lambda.$$

Also ist

$$r(y) \geq \varrho - \delta, \quad \varrho \leq r(y) + d(x, y)$$

$$\Rightarrow r(x) \leq r(y) + d(x, y)$$

$$\rightarrow r(x) - r(y) \leq d(x, y).$$

Dies gilt auch, wenn $d(x, y) \geq r(x)$ ist (trivial!).

Genauso gilt auch

$$r(y) - r(x) \leq d(x, y).$$

Damit gilt dann:

$$|r(x) - r(y)| \leq d(x, y) \quad \text{Bedingung für die Stetigkeit}$$

Also ist r stetig.

Da A kompakt ist, hat r ein positives Minimum $= 2 \cdot r_0$.

Zu jedem $x \in A$ existiert ein λ mit

$$K(x, r_0) \subseteq O_\lambda$$

Also ist $(K(x, r_0))_{x \in A}$ eine offene Überdeckung von A .

Zeige nun noch, daß $(K(x, r_0))_{x \in A}$ eine endliche Teilüberdeckung enthält und damit auch (O_λ) selbst.

Annahme: Es gibt keine endliche Teilüberdeckung.

Sei $x_0 \in A$ beliebig. dann existieren: $x_1 \in A \setminus K(x_0, r_0)$

$x_2 \in A \setminus (K(x_0, r_0) \cup K(x_1, r_0))$

$\vdots$

$x_n \in A \setminus (K(x_0, r_0) \cup \dots \cup K(x_{n-1}, r_0))$.

(x_n) ist eine Folge in A .

Für $n > m$ gilt dann $d(x_n, x_m) \geq r_0$ und $x_n \notin K(x_m, r_0)$.

Es gibt also keine konvergente Teilfolge in A . Widerspruch!

Also enthält $(K(x, r_0))_{x \in A}$ eine endliche Teilüberdeckung und (O_λ) enthält ebenfalls eine endliche Teilüberdeckung.

7.6 Zusammenhang

In diesem Abschnitt ist (M, d) ein metrischer Raum, insbesondere meistens $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Metrik oder $\mathbb{R}$ mit dem absoluten Betrag $|\cdot|$.

7.6.1 Definition: Partition, zusammenhängend

Sei $E \subseteq M$, $E \neq \emptyset$ und $A, B \subseteq M$.

(A, B) heißt *Partition* von E , wenn gilt:

- (1) A und B sind offen
- (2) $E \subseteq A \cup B$
- (3) $E \cap A \cap B = \emptyset$
- (4) $E \cap A \neq \emptyset$ und $E \cap B \neq \emptyset$.

E heißt *zusammenhängend*, wenn es keine Partition von E gibt.

7.6.2 Anschauliche Beispiele

(a) Intervall in $\mathbb{R}$:

(b)

Die hier gezeigte Menge ist nicht zusammenhängend.

(c)

7.6.3 Bemerkung

In der Definition des Zusammenhanges kann man „offen“ durch „abgeschlossen“ ersetzen.

Beweis: Setze $\tilde{A} = M \setminus A$ und $\tilde{B} = M \setminus B$.

$\tilde{A}$ und $\tilde{B}$ sind offen, wenn A und B abgeschlossen sind.

(A, B) ist Partition von E ; A und B sind abgeschlossen.

Zeige: $(\tilde{A}, \tilde{B})$ ist Partition von E .

($\tilde{1}$) $\tilde{A}$ und $\tilde{B}$ sind offen ✓

($\tilde{2}$) Es gilt $E \subseteq A \cup B$, $E \not\subseteq A$ und $E \not\subseteq B$ (wegen (3), (4))
 $\Rightarrow E \subseteq \tilde{A} \cup \tilde{B}$, denn

$$x \in E \Rightarrow \begin{cases} x \in A \Rightarrow x \notin B \Rightarrow x \in \tilde{B} \\ x \in B \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in \tilde{A} \end{cases}$$

($\tilde{3}$) Sei $x \in E \cap \tilde{A} \cap \tilde{B}$.

Dann ist $x \in E$, $x \notin A$ und $x \notin B$.

Das heißt, es gibt ein $x \in E$ mit $x \notin A$ und $x \notin B$.

Dies ist ein Widerspruch zu (2), also kann es so ein x nicht geben.

($\tilde{4}$) Sei $E \cap \tilde{A} = \emptyset$ und sei $x \in E$.

Dann ist $x \in M \setminus \tilde{A} = A$ für alle $x \in E$.

Das heißt, daß $E \subseteq A$ ist. Widerspruch zu (3) und (4),

da $\emptyset \neq E \cap B \subseteq E \cap A \cap B$ Widerspruch zu (3).

7.6.4 Definition: Gebiet

Eine offene und zusammenhängende Menge heißt *Gebiet*.

7.6.5 Satz

Ist $f: E \rightarrow N$ [(N, ρ) sei dabei ein metrischer Raum] stetig und E zusammenhängend, so ist $f(E)$ zusammenhängend.

Beweis: Annahme: $(\tilde{A}, \tilde{B})$ sei Partition von $f(E)$.

Zu $y = f(x) \in \tilde{A}$ und zu $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$ mit

$$f(K(x, \delta) \cap E) \subseteq K(y, \varepsilon), \quad \delta = \delta(\varepsilon, x) = \delta(x) \text{ f\u00fcr festes } \varepsilon$$

$$A = \bigcup_{f(x) \in \tilde{A}} \underbrace{K(x, \delta(x))}_{\text{offen}} \text{ ist offene Menge}$$

Genauso:

$$B = \bigcup_{f(x) \in \tilde{B}} \underbrace{K(x, \delta(x))}_{\text{offen}} \text{ ist offene Menge}$$

Ist (A, B) Partition von E ?

(1) A und B sind offen ✓

(2) ✓ nach Konstruktion

(3) Sei $x \in E \cap A \cap B$

Dann ist $f(x) \in \tilde{A}$ und $f(x) \in \tilde{B}$

Also ist $\tilde{A} \cap \tilde{B} \neq \emptyset$

Daraus folgt, da\u00df $\tilde{A} \cap \tilde{B} \cap f(E) \neq \emptyset$ ist. Widerspruch zu $(\tilde{3})$

Also ist $E \cap A \cap B = \emptyset$.

(4) W\u00e4re $E \cap A = \emptyset$, also $E \subseteq B$,

dann w\u00e4re $\tilde{B} \supseteq f(B \cap E) = f(E)$. Widerspruch! zu $(\tilde{3})$ und $(\tilde{4})$

Also ist $E \cap A \neq \emptyset$ und genauso $E \cap B \neq \emptyset$

Zusammen ist (A, B) damit Partition von E . Widerspruch! zu: E ist zusammenh\u00e4ngend. Es gibt also keine Partition von $f(E)$, d. h. $f(E)$ ist zusammenh\u00e4ngend.

7.6.6 Zwischenwertsatz

Eine Menge E ist genau dann zusammenh\u00e4ngend, wenn jede stetige Funktion $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ die Zwischenwerteigenschaft hat, d. h. wenn $f(E)$ ein Intervall ist.

Beweis:

„ $\Leftarrow$ “: Sei E nicht zusammenh\u00e4ngend und (A, B) Partition von E .

Setze

$$f: E \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 0 & x \in E \cap A \\ 1 & x \in E \cap B \end{cases}$$

$$f(E) = \{0, 1\}$$

Behauptung: f ist stetig.

Sei z. B. $x_0 \in A \cap E$, $f(x_0) = 0$.

Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $K(x_0, \delta) \subseteq A$, da A offen ist.

In $K(x_0, \delta) \cap E$ ist $f(x) = 0$, also ist f stetig in x_0 .

Da $f(E) = \{0, 1\}$ kein Intervall ist, aber nach Voraussetzung ein Intervall sein mu\u00df, erh\u00e4lt man einen Widerspruch!

$\Rightarrow E$ ist doch zusammenh\u00e4ngend.

„ $\Rightarrow$ “: Sei E zusammenhängend, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, aber $f(E)$ kein Intervall.
 Dann gibt es $a < b$ mit $a, b \in f(E)$, aber $c \in (a, b)$ mit $c \notin f(E)$.
 Setze damit

$$A = \{x: f(x) < c\} \text{ und } B = \{x: f(x) > c\}.$$

A und B sind offen. Überprüfe die Definition für die Partition (A, B) :

- (1) ✓
- (2) ✓, da $f(x) \neq c$ für alle $x \in E$.
- (3) ✓, da sogar $A \cap B = \emptyset$.
- (4) Es gibt α mit $f(\alpha) = a$: Es ist $\alpha \in A$.
 Es gibt β mit $f(\beta) = b$: Es ist $\beta \in B$.

Zusammen ist damit (A, B) eine Partition der zusammenhängenden Menge E . Widerspruch!
 Also ist $f(E)$ ein Intervall.

7.6.7 Satz

Die zusammenhängenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ sind genau die Intervalle.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “: Sei $E \subseteq \mathbb{R}$ zusammenhängend und setze $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$. Dann ist nach dem Zwischenwertsatz $f(E) = E$ ein Intervall.

„ $\Leftarrow$ “: Sei $E \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist nach Ana I $f(E)$ ein Intervall und mit dem Zwischenwertsatz ist damit E zusammenhängend.

7.6.8 Hilfssatz

Seien E_λ für $\lambda \in \Lambda$ zusammenhängende Mengen (in M), $E_\lambda \cap E_\nu \neq \emptyset$ für je zwei $\lambda, \nu \in \Lambda$. Dann ist auch $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda =: E$ zusammenhängend.

Beweis: Annahme: E ist nicht zusammenhängend, (A, B) Partition von E , insbesondere

$$E_\lambda \subseteq A \cup B$$

$$E_\lambda \cap A \cap B \subseteq E \cap A \cap B = \emptyset$$

Da E_λ zusammenhängend ist, ist (A, B) keine Partition von E_λ . Also ist $E_\lambda \subseteq A$ oder $E_\lambda \subseteq B$. Sei hier $E_\lambda \subseteq A$.

Sei $\mu \neq \lambda$. Dann ist $E_\mu \subseteq A$ oder $E_\mu \subseteq B$ und $E_\lambda \cap E_\mu \neq \emptyset$.

Damit ist $E_\mu \cap A \neq \emptyset$.

Dann kann $E_\mu \subseteq B$ nicht gelten, da $E_\mu \cap A \cap B = \emptyset$ ist, also ist $E_\mu \subseteq A$.

Zusammen ist dann $E \subseteq A$. Dies ist ein Widerspruch dazu, daß (A, B) Partition von E ist, also ist E zusammenhängend.

7.6.9 Beispiel

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und sternförmig bezüglich 0, d. h. für jedes $x \in E$ gilt:

$$\{tx: 0 \leq t \leq 1\} \subseteq E.$$

Behauptung: E ist zusammenhängend, also ein Gebiet.

Beweis: Sei für $x \in E$

$$S_x = \{tx : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Die Funktion

$$[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto tx$$

ist stetig. Damit ist S_x zusammenhängend. Außerdem ist

$$E = \bigcup_{x \in E} S_x \text{ und } S_x \cap S_y \supseteq \{0\}.$$

Also ist E zusammenhängend.

7.6.10 Satz

Sei $E \subseteq M$, $E \neq \emptyset$. Dann ist

$$x \sim y :\Leftrightarrow \text{„es gibt eine zusammenhängende Teilmenge } F \subseteq E \text{ mit } x, y \in F\text{“}$$

eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklassen $[x]$ sind zusammenhängend. Entweder ist $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] = \emptyset$. Jede Klasse $[x]$ heißt *Zusammenhangskomponente* von E . Es gilt:

$$E = \bigcup_x [x]$$

Beweis: Zeige, daß $\sim$ eine Äquivalenzrelation ist:

(1) Reflexivität: Ist $x \sim x$? Ja, da $x, x \in \{x\}$ =zusammenhängende Teilmenge.

(2) Symmetrie:

$$\begin{aligned} x \sim y &\Rightarrow x, y \in F \subseteq E, F \text{ zusammenhängend} \\ &\Rightarrow y, x \in F \subseteq E, F \text{ zusammenhängend} \\ &\Rightarrow y \sim x \end{aligned}$$

(3) Transitivität:

Sei $x \sim y$ und $y \sim z$, d. h.

$$x, y \in F_1 \subseteq E \text{ und } y, z \in F_2 \subseteq E,$$

F_1 und F_2 sind zusammenhängend.

$$x, z \in F_1 \cup F_2 \subseteq E$$

$y \in F_1 \cap F_2$, also ist $F_1 \cup F_2$ zusammenhängend.

Also ist $x \sim z$.

7.6.11 Bemerkung

Zusammenhangskomponenten sind automatisch maximal zusammenhängend, d. h. ist $F \subseteq E$ zusammenhängend, dann existiert eine Zusammenhangskomponente C mit $F \subseteq C$.

Beweis: Sei $x \in F$, $C = [x]$.

Für $y \in F$ ist dann $x \sim y$, also $y \in [x] = C$, $F \subseteq C$.

7.6.12 Zusatz

Ist $E \subseteq \mathbb{R}^n$ offen [abgeschlossen], dann ist auch jede Zusammenhangskomponente offen [abgeschlossen].

Eine offene Menge $E \subseteq \mathbb{R}^n$ besteht aus endlich oder abzählbar unendlich vielen Gebieten.

Beweis: Zuerst für offenes E :

Sei C Zusammenhangskomponente von E .

Sei $x \in C$. Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $K(x, \delta) \subseteq E$, da $K(x, \delta)$ zusammenhängend ist und x enthält.

Da C maximal zusammenhängend ist, folgt $K(x, \delta) \subseteq C$. Zeige nun, daß es nur endlich oder abzählbar unendlich viele Zusammenhangskomponenten gibt:

Sei C eine Zusammenhangskomponente von E .

C enthält $x \in \mathbb{R}^n$ mit $x_\nu \in \mathbb{Q}$ für $\nu = 1, \dots, n$.

Nenne $x = x_C$ und definiere die Abbildung

$$\{C: C \text{ ist Komponente von } E\} \rightarrow \mathbb{Q}^n \quad C \mapsto x_C.$$

Diese Abbildung ist injektiv, da je zwei Komponenten disjunkt (oder gleich) sind. Da aber $\mathbb{Q}^n$ abzählbar ist, existieren höchstens abzählbar viele Komponenten.

Nun der Beweis für abgeschlossenes E :

Sei C Zusammenhangskomponente von E .

Zu zeigen ist, daß C abgeschlossen ist, d. h. $C = \bar{C}$. Es gilt:

- (1) $\bar{C} \subseteq E$, da E abgeschlossen ist.
- (2) $\bar{C}$ ist zusammenhängend (Dies wird gleich gezeigt).

Zusammen ist also $C \subseteq \bar{C} \subseteq E$, also auch $C = \bar{C}$.

Zeige nun, daß (2) gilt:

Wenn $\bar{C}$ nicht zusammenhängend ist, existiert eine Partition (A, B) von $\bar{C}$ mit:

- (1) A und B sind offen.
- (2) $\bar{C} \subseteq A \cup B$.
- (3) $\bar{C} \cap A \cap B = \emptyset$.
- (4) $\bar{C} \cap A \neq \emptyset$ und $\bar{C} \cap B \neq \emptyset$.

Da $C \subseteq A \cup B$ und $C \cap A \cap B = \emptyset$ und C zusammenhängend ist, folgt: $C \cap A = \emptyset$ [oder $C \cap B = \emptyset$], also ist z. B. $C \subseteq B$.

Andererseits existiert ein $a \in \bar{C} \cap A$. Da $A \subseteq C$ ist, ist $a \in C$,

d. h. es existiert eine Folge (c_n) in C mit $c_n \rightarrow a$, $c_n \neq a$.

Also existiert eine Kugel $K(a, \delta) \subseteq A$.

Für $n \geq n_0$ gilt dann:

$$c_n \in K(a, \delta) \subseteq A$$

und

$$c_n \in C \subseteq B.$$

Damit ist dann $c_n \in C \cap A \cap B = \emptyset$. Widerspruch!

Also ist $\bar{C}$ zusammenhängend.

7.6.13 Testbeispiel

Sei Λ Indexmenge und I_λ seien für $\lambda \in \Lambda$ offene Intervalle.

Setze

$$E = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \subseteq \mathbb{R}.$$

E besteht nach dem Satz aus höchstens Abzählbar vielen Intervallen (Komponenten).

7.6.14 Definition: Weg

M sei ein metrischer Raum, $E \subseteq M$.

Eine stetige Abbildung

$$\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow E$$

heißt *Weg* in E . $\gamma(\alpha)$ heißt *Anfangspunkt*, $\gamma(\beta)$ heißt *Endpunkt* von γ .

Man sagt γ verbindet $\gamma(\alpha)$ mit $\gamma(\beta)$ in E .

Beachte:

$$|\gamma| := \{\gamma(t) : \alpha \leq t \leq \beta\} \subseteq E$$

ist zusammenhängend, $|\gamma|$ heißt *Träger* von γ .

7.6.15 Beispiel

Sei $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

7.6.16 Definition: Wegzusammenhang

$E \subseteq M$ heißt *wegzusammenhängend*, wenn es zu $a, b \in E$ einen Weg γ gibt, der a mit b in E verbindet.

7.6.17 Beispiel

Dies gilt zum Beispiel für konvexe und sternförmige Mengen.

7.6.18 Satz

Wegzusammenhängende Mengen sind immer zusammenhängend.

Beweis: Sei E wegzusammenhängend und $a \in E$ fest.

Zu jedem $x \in E$ existiert ein Weg γ_x in E , der in a beginnt und in x endet, $|\gamma_x|$ ist zusammenhängend, $|\gamma_x| \cap |\gamma_y| \supseteq \{a\}$. Also ist $E = \bigcup_{x \in E} |\gamma_x|$ zusammenhängend.

7.6.19 Beispiel/Aufgabe

Seien

$$E_1 = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq 1 \right\}$$

$$E_2 = \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\}$$

Weise nach: E_1 und E_2 sind wegzusammenhängend, $E_1 \cup E_2$ ist zusammenhängend, aber nicht wegzusammenhängend. Z. B. existiert kein Weg von $(0, 0)$ zu $(1, \sin 1)$.

7.6.20 Satz

Jedes Gebiet im $\mathbb{R}^n$ ist wegzusammenhängend. (Gebiet=open und wegzusammenhängend)

Beweis: Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet und $a \in E$ sei fest. Setze

$A = \{x \in E : \text{es gibt einen (achsenparallelen) Weg in } E \text{ von } a \text{ nach } x\}$

$B = E \setminus A$.

1. Zeige: A ist offen! Sei $x \in A$.

Dann existiert ein $\delta > 0$ mit $K(x, \delta) \subseteq E$. Es existiert ein Weg γ_x von a nach x mit $|\gamma_x| \subseteq E$.

Sei $y \in K(x, \delta)$: γ_x verlängert um die Strecke von x nach y ist ein Weg von a nach y in E .

D. h. $y \in A$, also $K(x, \delta) \subseteq A$. Also ist A offen, da $x \in A$ beliebig ist.

2. $A \neq \emptyset$, da $a \in A$.

3. Zeige: B ist offen!

Es ist $B = \{x : \text{es existiert kein Weg von } a \text{ nach } x \text{ in } E\}$.

Sei $x \in B$, $\delta > 0$, so daß $K(x, \delta) \subseteq E$ ist.

Wäre $y \in K(x, \delta)$ von a aus erreichbar durch einen Weg γ_x , so auch x durch γ_y , verlängert um die Strecke von y nach x . Also ist B offen. Daraus folgt

4. $E = A \cup B$. Dabei sind A und B offen, $A \cap B = \emptyset$, $A \neq \emptyset$ und $A \cap B \cap E = \emptyset$, da E zusammenhängend ist. Also ist $B = \emptyset$, da $a \in A$ ist.

Gezeigt: Jedes $x \in E$ ist Endpunkt eines Weges in E , der in a beginnt.

Desgleichen gilt auch für achsenparallele Streckenzüge.

7.7 Gleichgradige Stetigkeit

7.7.1 Definition: gleichgradig stetig

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $E \neq \emptyset$. $\mathcal{F}$ sei eine Menge (Familie) von Funktionen $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$. $\mathcal{F}$ heißt

(a) *beschränkt*, wenn es ein $M > 0$ gibt mit $\|f(x)\| \leq M$ für alle $x \in E$ und für alle $f \in \mathcal{F}$.

(b) *gleichgradig stetig*, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit: Ist $x, y \in E$, $\|x - y\| < \delta$, so ist

$$\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon \text{ für alle } f \in \mathcal{F}.$$

7.7.2 Beispiele

(a) Ist für alle $f \in \mathcal{F}$ und $x, y \in E$

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|,$$

wobei L unabhängig von f , x und y ist, so ist $\mathcal{F}$ gleichgradig stetig. Setze dabei $\delta := \frac{\varepsilon}{L}$.

(b) Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt, $f_k: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig und $f_k \rightarrow f$ gleichmäßig in E .

Behauptung: $\mathcal{F} = \{f_k: k \in \mathbb{N}\}$ ist gleichgradig stetig.

Beweis: Da alle f_k gleichmäßig konvergieren, ist f stetig.

Da aber auch E kompakt ist, ist f sogar gleichmäßig stetig.

Also gibt es zu $\varepsilon > 0$ ein $\sigma > 0$ mit

$$\|f(x) - f(y)\| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ für } x, y \in E, \|x - y\| < \sigma.$$

Weiter existiert ein k_0 mit

$$\|f_k(x) - f(x)\| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ für } k \geq k_0, x \in E.$$

Für $1 \leq k \leq k_0$ existiert ein δ_k mit

$$\|f_k(x) - f_k(y)\| < \varepsilon \text{ für } x, y \in E, \|x - y\| < \delta_k.$$

Setze $\delta := \min(\delta_1, \dots, \delta_{k_0}, \sigma) > 0$. Für $\|x - y\| < \delta$ gilt dann:

$$\|f_k(x) - f_k(y)\| < \varepsilon \text{ ist erfüllt für } k \leq k_0.$$

Sei nun $k \geq k_0$. Dann ist

$$\begin{aligned} \|f_k(x) - f_k(y)\| &= \|f_k(x) - f(x) + f(x) - f(y) + f(y) - f_k(y)\| \\ &\leq \underbrace{\|f_k(x) - f(x)\|}_{< \varepsilon/3 \text{ glm. Konv.}} + \underbrace{\|f(x) - f(y)\|}_{< \varepsilon/3 \text{ glm. Stetigkeit}} + \underbrace{\|f(y) - f_k(y)\|}_{< \varepsilon/3 \text{ glm. Konv.}} < \varepsilon \end{aligned}$$

Also ist $\mathcal{F}$ gleichgradig stetig.

Aufgabe: Zeige, daß $\mathcal{F}$ beschränkt ist.

7.7.3 Satz von Arzela-Ascoli

Es sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ (offen und beschränkt oder der Abschluß einer offenen und beschränkten Menge $M \subseteq \mathbb{R}^n$) und $\mathcal{F}$ sei beschränkt und gleichgradig stetig.

Dann hat jede Folge (f_k) in $\mathcal{F}$ eine gleichmäßig konvergente Teilfolge.

Beweis:

(a) Teilfolgenauswahl nach dem Cantorschen Diagonalverfahren.

$E \cap \mathbb{Q}^n$ ist eine abzählbare Menge, dicht, d. h. $\overline{E \cap \mathbb{Q}^n} = \bar{E} = \{\xi^1, \xi^2, \xi^3, \dots\}$

1.: $(f_k(\xi^1))$ ist beschränkt (im $\mathbb{R}^m$): es ex. TF $(f_{1,k}(\xi^1))$

2.: $(f_{1,k}(\xi^2))$ ist beschränkt (im $\mathbb{R}^m$): es ex. TF $(f_{2,k}(\xi^2))$

⋮

ℓ .: $(f_{\ell-1,k}(\xi^\ell))$ ist beschränkt (im $\mathbb{R}^m$): es ex. TF $(f_{\ell,k}(\xi^\ell))$. Wir haben also:

$$\begin{array}{ccccccc} f_{1,1} & f_{1,2} & f_{1,3} & f_{1,4} & \cdots & & \\ f_{2,1} & f_{2,2} & f_{2,3} & f_{2,4} & \cdots & & \\ f_{3,1} & f_{3,2} & f_{3,3} & f_{3,4} & \cdots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Wähle nun $\varphi_k := f_{k,k}$.

(φ_k) ist Teilfolge von (f_k) .

$(\varphi_k)_{k \geq l}$ ist Teilfolge von $(f_{\ell,k})$.

$\varphi_k(\xi^\ell)$ ist Teilfolge von $(f_{\ell,k}(\xi^\ell))$,

d. h. $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(\xi^\ell)$ existiert für alle $l = 1, 2, \dots$

(b) Konvergenzbeweis:

Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein $\delta > 0$ mit

$$\|\varphi_k(x) - \varphi_k(y)\| < \varepsilon \text{ für } x, y \in E, \|x - y\| < \delta \text{ und für alle } k \in \mathbb{N}$$

(gleichgradige Stetigkeit).

Sei $D_j = K(\xi^j, \delta)$:

$$E \subseteq \bar{E} \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} D_j \text{ (da } \{\xi^j\} \text{ dicht ist).}$$

Da $\bar{E}$ kompakt ist, gibt es ein p mit

$$\bar{E} \subseteq D_1 \cup \dots \cup D_p \text{ (Heine-Borel).}$$

Zu $\varepsilon > 0$ existiert ein Index k_0 mit

$$\begin{aligned} \|\varphi_k(x) - \varphi_\ell(x)\| &= \|\varphi_k(x) - \varphi_k(\xi^j) + \varphi_k(\xi^j) - \varphi_\ell(\xi^j) + \varphi_\ell(\xi^j) - \varphi_\ell(x)\| \\ &\leq \|\varphi_k(x) - \varphi_k(\xi^j)\| + \|\varphi_k(\xi^j) - \varphi_\ell(\xi^j)\| + \|\varphi_\ell(\xi^j) - \varphi_\ell(x)\| \\ &< \underbrace{\varepsilon}_{(1)} + \underbrace{\varepsilon}_{(2)} + \underbrace{\varepsilon}_{(3)} = 3\varepsilon \end{aligned}$$

Dabei gilt:

(1), da $\|x - \xi^j\| < \delta$ für alle k (gleichgradige Stetigkeit)

(3), da $\|x - \xi^j\| < \delta$ für alle l (gleichgradige Stetigkeit)

(2), da $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(\xi^j)$ existiert.

Also ist das Cauchy Kriterium erfüllt, es liegt gleichmäßige Konvergenz vor.

7.7.4 Beispiel: Existenzsatz von Peano

Sei $S = [a, b] \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$ und $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ sei stetig und beschränkt.

Gesucht ist u mit

$$u' = f(t, u) \text{ und } u(a) = \alpha. \quad (7.3)$$

Das Anfangswertproblem (7.3) hat mindestens eine Lösung in $[a, b]$, d. h.

$$u \in C^1([a, b]), \quad u(a) = \alpha \text{ und } u'(t) = f(t, u(t)).$$

Äquivalent zu diesem Problem ist

$$u(t) = \alpha + \int_a^t f(s, u(s)) ds \text{ mit } u \in C([a, b]).$$

Beweis: Setze

$$u_n(t) = \alpha \text{ in } [a-1, a]$$

und

$$u_n(t) = \alpha + \int_a^t f\left(s, u_n\left(s - \frac{1}{n}\right)\right) ds \text{ in } (a, b].$$

Behauptung: $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ ist beschränkt und gleichgradig stetig.

Dann existiert eine Teilfolge $u_{n_k} \rightarrow u$ gleichmäßig in $[a, b]$.

Für $|u_n(t)| \leq K$ ist f gleichmäßig stetig auf $[a, b] \times [-K, K]$

$$f\left(s, u_{n_k}\left(s - \frac{1}{n_k}\right)\right) \xrightarrow{\text{glm.}} f(s, u(s)).$$

$$\begin{aligned} u_{n_k}(t) &= \alpha + \int_a^t f\left(s, u_{n_k}\left(s - \frac{1}{n_k}\right)\right) ds \\ \downarrow \quad \downarrow & \\ u(t) &= \alpha + \int_a^t f(s, u(s)) ds \end{aligned}$$

Beweis der Beschränktheit: Es gilt: $|f(t, u)| \leq M$ in S .

$$u_n(t) \leq |\alpha| + \int_a^t M ds \leq |\alpha| + M(b-a) =: K \text{ für } a \leq t \leq b.$$

Beweis der gleichgradigen Stetigkeit: Sei $\tau < t$. Dann ist

$$\begin{aligned} |u_n(t) - u_n(\tau)| &= \left| \int_a^t f\left(s, u_n\left(s - \frac{1}{n}\right)\right) ds - \int_a^\tau f\left(s, u_n\left(s - \frac{1}{n}\right)\right) ds \right| \\ &= \left| \int_\tau^t \underbrace{f\left(s, u_n\left(s - \frac{1}{n}\right)\right)}_{|\cdot| \leq M} ds \right| \leq M \cdot (t - \tau) \text{ Lipschitzbedingung für } u_n \end{aligned}$$

Also sind die u_n gleichgradig stetig.

7.7.5 Beispiel für den Existenzsatz von Peano

Beispiel mit mehreren Lösungen:

Sei $S = [0, 1] \times \mathbb{R}$ und f wie folgt definiert:

$$f(t, u) = \begin{cases} 2 & \text{für } u > 1 \\ 2\sqrt{|u|} & \text{für } -1 < u < 1 \\ 2 & \text{für } u < -1 \end{cases}$$

Gesucht ist ein u mit

$$u' = f(t, u) \text{ und } u(0) = 0.$$

Eine Lösung ist

$$u(t) = 0.$$

Eine andere Lösung ist

$$u(t) = t^2.$$

Die weiteren Lösungen sind

$$u(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq \tau \\ (t - \tau)^2 & \tau \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

8 Mehrdimensionale Differentialrechnung¹

8.1 Matrizen und quadratische Formen

8.1.1 Definition: Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & & & \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

ist eine $m \times n$ -Matrix mit $a_{\mu,\nu} \in \mathbb{R}$.

m ist die Zahl der Zeilen: $(a_{\mu,1} \ a_{\mu,2} \ \cdots \ a_{\mu,n})$ ist eine $1 \times n$ -Matrix.

n ist die Zahl der Spalten: $\begin{pmatrix} a_{1,\nu} \\ a_{2,\nu} \\ \vdots \\ a_{m,\nu} \end{pmatrix}$ ist eine $m \times 1$ -Matrix.

8.1.2 Rechenregeln für Matrizen

1. Für $C := A + B$ gilt: $c_{\mu,\nu} := a_{\mu,\nu} + b_{\mu,\nu}$.
2. Für $C := \lambda A$ gilt: $c_{\mu,\nu} := \lambda a_{\mu,\nu}$.
3. Sei A eine $m \times n$ -Matrix und B eine $n \times p$ -Matrix. Dann ist $C := A \cdot B$ eine $m \times p$ -Matrix mit

$$c_{\mu,\varrho} = \sum_{\nu=1}^n a_{\mu,\nu} b_{\nu,\varrho}$$

für $\mu = 1, \dots, m$ und $\varrho = 1, \dots, p$.

8.1.3 Transponierte Matrizen

Die Transponierte von A (siehe oben) ist

$$A^T := \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & & a_{m,2} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1,n} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Wenn $x \in \mathbb{R}^n$ ist, wird oft

$$x^T = (x_1, \dots, x_n)$$

---

¹Version 184 vom 13. Februar 2006

geschrieben. Dies ist als Spaltenvektor gemeint:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

8.1.4 Skalarprodukt

$$x^T y = (x_1, \dots, x_n) \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = x \cdot y$$

ist das Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$.

8.1.5 Matrizenorm

Sei A eine $m \times n$ -Matrix, $\|\cdot\|_n$ eine Norm im $\mathbb{R}^n$ und $\|\cdot\|_m$ eine Norm im $\mathbb{R}^m$. Dann ist

$$\|A\| := \sup\{\|A \cdot x\|_m : x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_n = 1\}$$

die von $\|\cdot\|_n$ und $\|\cdot\|_m$ erzeugte Matrixnorm.

Beachte:

$$\|Ax\|_m \leq \|A\| \cdot \|x\|_n \text{ f\"ur alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

8.1.6 Beispiele

(1) Beidesmal die Euklidnorm: Zeige (als Aufgabe)

$$\|A\| \leq \sqrt{\sum_{\substack{\mu=1, \dots, m \\ \nu=1, \dots, n}} a_{\mu, \nu}^2}.$$

(2) Beidesmal Maximumnorm:

F\"ur $y = Ax$ ist

$$y_\mu = \sum_{\nu=1}^n a_{\mu, \nu} x_\nu.$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned} |y_\mu| &\leq \sum_{\nu=1}^n |a_{\mu, \nu}| \cdot \underbrace{|x_\nu|}_{\leq \|x\|_\infty} \\ &\leq \left(\sum_{\nu=1}^n |a_{\mu, \nu}| \right) \cdot \|x\|_\infty \end{aligned}$$

Also ist

$$\|y\|_\infty \leq \left(\max_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n |a_{\mu, \nu}| \right) \cdot \|x\|_\infty$$

Es ist damit

$$\|A\| \stackrel{(*)}{\leq} \max_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n |a_{\mu,\nu}|.$$

Zeige, daß für (*) Gleichheit gilt:

Sei

$$\max_{\mu=1}^m \sum_{\nu=1}^n |a_{\mu,\nu}| = \sum_{\nu=1}^n |a_{\varrho,\nu}|$$

Setze

$$x_\nu = \begin{cases} 1 & \text{wenn } a_{\varrho,\nu} \geq 0 \\ -1 & \text{wenn } a_{\varrho,\nu} < 0 \end{cases}.$$

Dann ist

$$\left| \sum_{\nu=1}^n a_{\varrho,\nu} x_\nu \right| = \sum_{\nu=1}^n |a_{\varrho,\nu}| \cdot \underbrace{\|x\|_\infty}_{=1}$$

und damit

$$\|A\| \stackrel{\odot}{\geq} \sum_{\nu=1}^n |a_{\varrho,\nu}|.$$

Aus $\odot$ und (*) folgt insgesamt die Gleichheit bei (*).

8.1.7 Definition: Quadratische Formen

Sei A eine symmetrische $n \times n$ -Matrix ($A = A^T$, $a_{\mu,\nu} = a_{\nu,\mu}$). Dann heißt

$$Q_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q_A(x) := x^T A x = \sum_{\mu,\nu=1}^n a_{\mu,\nu} x_\mu x_\nu$$

quadratische Form.

8.1.8 Bemerkung

Wenn $A^T = A$ ist, sind alle Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ reell. Man kann die Eigenvektoren $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$ orthonormal wählen, d. h. es gilt

$$x^{(j)} \cdot x^{(k)} = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}.$$

$x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$ bilden eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^n$.

Sei nun $x \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$x = \sum_{j=1}^n \xi_j x^{(j)} \quad \text{und} \quad Ax = \sum_{j=1}^n \xi_j \lambda_j x^{(j)}.$$

Damit ist

$$x^T A x = x \cdot (Ax) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \xi_j^2.$$

8.1.9 Definition: positiv/negativ (semi-)definit

A heißt

$$\left. \begin{array}{l} \text{positiv definit} \\ \text{negativ definit} \\ \text{positiv semidefinit} \\ \text{negativ semidefinit} \\ \text{indefinit} \end{array} \right\} \iff x^T Ax \begin{cases} > 0 & \text{für } x \neq 0 \\ < 0 & \text{für } x \neq 0 \\ \geq 0 & \text{für } x \neq 0 \\ \leq 0 & \text{für } x \neq 0 \\ \text{sonst} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \text{alle } \lambda_j > 0 \\ \text{alle } \lambda_j < 0 \\ \text{alle } \lambda_j \geq 0 \\ \text{alle } \lambda_j \leq 0 \\ \text{mind. ein } \lambda_j > 0, \text{ ein } \lambda_j < 0 \end{cases}$$

8.1.10 Bemerkungen

A ist positiv definit („ $A > 0$ “)

$$\iff \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0 \text{ für } k = 1, 2, \dots, n,$$

bzw. negativ definit („ $A < 0$ “)

$$\iff (-1)^k \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} > 0 \text{ für } k = 1, 2, \dots, n.$$

Es gilt $A > 0 \iff (-A) < 0$.

Ohne Beweis.

Insbesondere ist die Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ genau dann positiv definit, wenn $a > 0$ und $ac > b^2$, bzw. genau dann negativ definit, wenn $a < 0$ und $ac > b^2$ ist.

8.1.11 Beispiele

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \text{ ist positiv semidefinit, d. h. } A \geq 0.$$

$$x^T Ax = \sum_{\mu, \nu=1}^n x_\mu x_\nu = \sum_{\mu=1}^n x_\mu \cdot \sum_{\nu=1}^n x_\nu = \left(\sum_{\nu=1}^n x_\nu \right)^2 \geq 0$$

$$\text{„} = 0 \text{“} \iff \sum_{\nu=1}^n x_\nu = 0$$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q_A(x) &= x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + 2x_3^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{„} = 0 \text{“} &\Leftrightarrow x_3 = 0 \wedge x_2 + x_3 = 0 \wedge x_1 - x_2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow A > 0. \end{aligned}$$

8.1.12 Definition: Landau-Symbole

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$, ξ Häufungspunkt von E , $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ und $\psi: E \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) $\varphi(x) = O(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$ bedeutet:
Es gibt ein $C > 0$ und ein $\delta > 0$ mit

$$\|\varphi(x)\| \leq C\psi(x) \text{ in } x \in E, 0 < \|x - \xi\| < \delta.$$

- (b) $\varphi(x) = o(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$ bedeutet:
Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$ mit

$$\|\varphi(x)\| \leq \varepsilon\psi(x) \text{ in } x \in E, 0 < \|x - \xi\| < \delta.$$

8.1.13 Beispiele

1. Sei $\varphi(x) = x^T Ax$.
Es gilt: $\phi(x) = O(\|x\|^2)$ für $x \rightarrow 0$.
Äquivalent ist: $|x^T Ax| \leq C\|x\|^2$ für $\|x\| < \delta$.

$$\begin{aligned} |x^T Ax|^2 &= |x \cdot (Ax)|^2 \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|x\|^2 \cdot \|(Ax)\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 \cdot (C\|x\|^2) = C^2\|x\|^4 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|x^T Ax\| \leq C\|x\|^2 \text{ für } x \in \mathbb{R}^n.$$

2. Sei $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig in $\xi \in E$.
 $\Leftrightarrow$ Zu $\varepsilon > 0$ ex. ein $\delta > 0$ mit

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(\xi)\| &< \varepsilon \text{ für } \|x - \xi\| < \delta, x \in E \\ \Leftrightarrow f(x) - f(\xi) &=: \tilde{\varphi}(x) \text{ mit } \tilde{\varphi}(x) \rightarrow 0 \text{ für } x \rightarrow \xi \\ \Leftrightarrow f(x) - f(\xi) &= o(1) \text{ für } x \rightarrow \xi \\ \Leftrightarrow f(x) &= f(\xi) + o(1) \text{ für } x \rightarrow \xi \end{aligned}$$

8.1.14 Regeln für Landau-Symbole

(Die Regeln unter (a) und (b) gelten sowohl für O als auch für o .)

(a) Sei $\varphi_j(x) = O(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$ und $j = 1, \dots, k$.

Dann ist

$$\sum_{j=1}^k \varphi_j(x) = O(\psi(x)) \text{ für } x \rightarrow \xi.$$

Anwendungsbeispiel:

Seien f_1 und f_2 stetig in ξ . Dann ist $f_1 + f_2$ stetig in ξ ,

denn: $f_j(x) = f_j(\xi) + o(1)$ für $j = 1, 2$.

$$f_1(x) + f_2(x) = f_1(\xi) + f_2(\xi) + o(1)$$

(b) Sei $\varphi_j(x) = O(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$ und $j = 1, \dots, k$.

Dann gilt

$$\varphi(x) = \max_1^k \|\varphi_j(x)\| \Rightarrow \varphi(x) = O(\psi(x)) \text{ für } x \rightarrow \xi$$

(c) Gilt $\varphi(x) = o(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$, dann ist auch $\varphi(x) = O(\psi(x))$ für $x \rightarrow \xi$. Dies gilt i. A. aber nicht umgekehrt.

8.1.15 Beispiel

Sei $f \in C^k(-r, r)$. Dann ist für $x \rightarrow 0$

$$f(x) = \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + \begin{cases} o(|x|^k) & , \text{ falls } f \in C^k(-r, r) \\ O(|x|^{k+1}) & , \text{ falls } f \in C^{k+1}(-r, r) \end{cases}$$

8.2 Differenzierbare Funktionen

Für diesen Abschnitt ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet.

Funktionen $D \rightarrow \mathbb{R}^m$ werden üblicherweise mit $f, g, \psi, \varphi, \dots$ bezeichnet.

Funktionen $D \rightarrow \mathbb{R}$ werden üblicherweise mit $u, v, w, \dots$ bezeichnet.

$\|\cdot\|$ ist die Euklidnorm.

8.2.1 Definition: Differenzierbarkeit

$f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt *differenzierbar* in $x \in D$, wenn es eine $m \times n$ -Matrix A gibt mit

$$f(x+h) - f(x) - Ah = o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0 \text{ (} h \in \mathbb{R}^n \text{)}.$$

Äquivalent hierzu ist:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) - A \cdot h}{\|h\|} = 0.$$

Interpretation:

$$f(x+h) = \underbrace{f(x) + A \cdot h}_{\otimes} + \underbrace{o(\|h\|)}_{\odot}$$

$\otimes$: Affine Funktion von h .

$\odot$: Fehlerterm: $< \varepsilon \cdot \|h\|$ für $\|h\| < \delta$.

8.2.2 Bemerkungen

(a) Sei $n = m = 1$:

$$f(x+h) - f(x) = a \cdot h + o(|h|)$$

$$\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = a =: f'(x)$$

(b) Man nennt A die Ableitung von f und schreibt $f'(x) = A$. Andere Schreibweise:

$$A = \frac{\partial f}{\partial x} \text{ ist die Jacobi-Matrix.}$$

8.2.3 Beispiele

(1) Sei $f(x) = c$ konstant mit $c \in \mathbb{R}^m$.
Dann ist $f'(x) = 0$ die $m \times n$ -Nullmatrix,
denn $f(x+h) - f(x) - 0 \cdot h = 0 = o(\|h\|)$.

(2) Sei $f(x) = Ax$ mit einer $m \times n$ -Matrix A .

$$f(x+h) - f(x) = A \cdot h = A \cdot h + o(\|h\|),$$

also ist $f'(x) = A$ für $x \in \mathbb{R}^n$.

(3) Sei $f(x) = x^T A x$ mit einer symmetrischen $n \times n$ -Matrix A .
Es ist $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Also ist $f'(x)$ eine $1 \times n$ -Matrix, ein Zeilenvektor.

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (x+h)^T A (x+h) - x^T A x \\ &= x^T A h + h^T A x + h^T A h \\ &= (x^T A)h + (x^T A^T)h + h^T A h \\ &= (x^T A)h + (x^T A)h + h^T A h \end{aligned}$$

Da $|h^T A h| = O(\|h\|^2) = o(\|h\|)$ für $h \rightarrow 0$ ist, ist

$$f'(x) = x^T A + x^T A = 2x^T A = 2(Ax)^T.$$

8.2.4 Satz

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix} : D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

ist genau dann in x differenzierbar, wenn alle $f_\mu: D \rightarrow \mathbb{R}$ in x differenzierbar sind. Es gilt:

$$f'(x) = \begin{pmatrix} f'_1(x) \\ \vdots \\ f'_m(x) \end{pmatrix}.$$

Beweis: Sei $A = f'(x)$ und $a^\mu := f'_\mu(x)$.

„ $\Rightarrow$ “: $f'(x)$ existiere nach Voraussetzung. Dann ist

$$\begin{aligned} |f_\mu(x+h) - f_\mu(x) - a^\mu h| &\leq \|f(x+h) - f(x) - A \cdot h\| \\ &= o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0, \mu = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Also ist $f'_\mu(x) = a^\mu$.

„ $\Leftarrow$ “: $f'_\mu(x) = a^\mu$ existieren nach Voraussetzung. Setze

$$A = \begin{pmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^m \end{pmatrix} \text{ ist } m \times n\text{-Matrix}$$

$$\begin{aligned} \|f(x+h) - f(x) - A \cdot h\| &\leq \sum_{\mu=1}^m \underbrace{|f_\mu(x+h) - f_\mu(x) - a^\mu \cdot h|}_{=o(\|h\|)} \\ &= o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Also ist $f'(x) = A$.

8.2.5 Satz: Die Ableitung ist eindeutig

Die Ableitung ist eindeutig bestimmt. Ist f differenzierbar in x , so ist f auch stetig in x .

Beweis:

Eindeutigkeit: Sei

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + A \cdot h + o(\|h\|) \\ f(x+h) &= f(x) + B \cdot h + o(\|h\|) \end{aligned}$$

Subtraktion der beiden Gleichungen liefert:

$$\mathbb{R}^m \ni 0 = (A - B) \cdot h + o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0, h \in \mathbb{R}^n$$

Folgt daraus $A = B$?

Setze $h = t \cdot e$ mit $t \in \mathbb{R}$, $e \in \mathbb{R}^n$ und $\|e\| = 1$.

Es gilt: $h \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$.

$$t(A - B)e = o(|t|) \text{ für } t \rightarrow 0$$

$$(A - B)e = \frac{1}{t} o(|t|) = o(1) \text{ für } t \rightarrow 0$$

Für $t \rightarrow 0$ gilt dann:

$$(A - B) \cdot e = 0 \text{ für alle } e \in \mathbb{R}^n \text{ mit } \|e\| = 1.$$

Also ist $A - B = 0$, d. h. $A = B$.

Stetigkeit:

$$\begin{aligned}\|f(x+h) - f(x)\| &= \|A \cdot h + o(\|h\|)\| \\ &\leq \|A\| \cdot \|h\| + \varepsilon \|h\| \text{ für } \|h\| < \delta \text{ bei vorgegebenem } \varepsilon \\ &= \text{const} \cdot \|h\| \text{ für } \|h\| < \delta\end{aligned}$$

Setze nun $y = x + h$. Dann ist

$$\|f(y) - f(x)\| \leq \text{const} \cdot \|x - y\| \text{ für } \|x - y\| < \delta.$$

Also ist f stetig.

8.2.6 Regeln für differenzierbare Funktionen

Sind $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar in x , so auch $f + g$, $\lambda \cdot f$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) und $f \cdot g: D \rightarrow \mathbb{R}$ (Skalarprodukt). Im Punkt x gilt:

$$\begin{aligned}(f + g)' &= f' + g' \\ (\lambda f)' &= \lambda f' \\ (f \cdot g)' &= f^T g' + g^T f'\end{aligned}$$

Vergleiche mit den eindimensionalen Regeln (4.1.3, Seite 70).

Beweis: Als Aufgabe.

8.2.7 Kettenregel für differenzierbare Funktionen

Zur Wiederholung zuerst die Kettenregel im 1-dimensionalen: Seien $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Sei nun $g: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow G \subseteq \mathbb{R}^m$ differenzierbar in $x \in D$ und $f: G \rightarrow \mathbb{R}^p$ sei differenzierbar in $y = g(x)$. Dann ist $f \circ g: D \rightarrow \mathbb{R}^p$ differenzierbar in x mit

$$(f \circ g)'(x) = f'(y) \cdot g'(x) \text{ mit } y = g(x).$$

Beweis: Sei $\Phi = f \circ g$, $B = g'(x)$ und $A = f'(y)$. Dann ist

$$g(x+h) = g(x) + B \cdot h + o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0$$

und

$$f(y+k) = f(y) + A \cdot k + o(\|k\|) \text{ für } k \rightarrow 0.$$

Es ist $y = g(x)$, $y+k = g(x+h)$, also $k = g(x+h) - g(x)$. Damit ist

$$\begin{aligned}\Phi(x+h) &= f(g(x+h)) = f(y+k) = f(y) + A \cdot k + o(\|k\|) \text{ für } k \rightarrow 0 \\ &= f(g(x)) + A \cdot (g(x+h) - g(x)) + o(\|g(x+h) - g(x)\|) \text{ für } h \rightarrow 0 \\ &= \Phi(x) + A \cdot (g(x+h) - g(x)) + o(\|g(x+h) - g(x)\|) \text{ für } h \rightarrow 0\end{aligned}$$

Außerdem ist $\|k\| = O(\|h\|)$ für $h \rightarrow 0$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}\Phi(x+h) &= \Phi(x) + A \cdot (B \cdot h + o(\|h\|)) + \underbrace{o(O(\|h\|))}_{=o(\|h\|)} = \Phi(x) + A \cdot B \cdot h + o(\|h\|) + o(\|h\|) \\ &= \Phi(x) + A \cdot B \cdot h + o(\|h\|) = \Phi(x) + f'(y)g'(x)h + o(\|h\|)\end{aligned}$$

Also ist $\Phi'(x) = f'(y)g'(x)$ mit $y = g(x)$.

8.2.8 Mittelwertsatz I

Sei $u: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und S sei eine Strecke in D mit Anfangspunkt a und Endpunkt b . Ist u differenzierbar in D , so gibt es ein $\xi \in S \setminus \{a, b\}$ mit

$$u(b) - u(a) = u'(\xi)(b - a).$$

Beweis: Sei $\varphi(t) := u(a + t \cdot (b - a))$ für $0 \leq t \leq 1$. Nach dem 1-dimensionalen Mittelwertsatz (4.2.4, Seite 74) gibt es ein $\tau \in (0, 1)$ mit

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\tau)(1 - 0).$$

Mit der Kettenregel gilt dann:

$$u(b) - u(a) = u'(\underbrace{a + \tau(b - a)}_{=: \xi}) \cdot (b - a).$$

8.2.9 Mittelwertsatz II

Ist $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar und sind a, b und S wie im MWS I, so gilt:

$$f(b) - f(a) = J(\xi^1, \dots, \xi^m) \cdot (b - a).$$

Dabei ist

$$J(\xi^1, \dots, \xi^m) = \begin{pmatrix} f'_1(\xi^1) \\ f'_2(\xi^2) \\ \vdots \\ f'_m(\xi^m) \end{pmatrix} \text{ mit } \xi^1, \dots, \xi^m \in S \setminus \{a, b\}.$$

Beweis: Mittelwertsatz I anwenden auf f_μ :

$$f_\mu(b) - f_\mu(a) = f'_\mu(\xi^\mu)(b - a).$$

Dabei ist $\xi^\mu \in S \setminus \{a, b\}$ für $\mu = 1, \dots, m$.

Daraus folgt dann die Behauptung.

8.2.10 Definition: Integrierbarkeit von Matrizen

Seien $a_{\mu,\nu}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ für $\mu = 1, \dots, m$ und $\nu = 1, \dots, n$ integrierbar und $A(t) = (a_{\mu,\nu}(t))_{\substack{\mu=1, \dots, m \\ \nu=1, \dots, n}}$.

Man setzt

$$\int_0^1 A(t) dt := \left(\int_0^1 a_{\mu,\nu}(t) dt \right)$$

und nennt A integrierbar. Das Ergebnis ist eine $m \times n$ -Matrix.

8.2.11 Mittelwertsatz III

Ist $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar, sind a, b und S wie im MWS I und ist $f'(a + t \cdot (b - a))$ integrierbar über $[0, 1]$, dann gilt:

$$f(b) - f(a) = \underbrace{\left(\int_0^1 f'(a + t(b - a)) dt \right)}_{m \times n\text{-Matrix}} \cdot (b - a).$$

Beweis: Hier für $m = 1$. Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$.

Setze $\varphi(t) = u(a + (b - a)t)$. Es ist $\varphi'(t) = u'(a + t(b - a)) \cdot (b - a)$.

Mit dem Hauptsatz gilt dann

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt,$$

also

$$u(b) - u(a) = \int_0^1 u'(a + t(b - a)) \cdot (b - a) dt.$$

8.2.12 Satz

Ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar mit $f'(x) = 0$ in D , so ist f konstant.

Beweis: Zuerst als Erinnerung für $m = n = 1$:

$$f(y) - f(x) = \underbrace{f'(\xi)}_{=0} (y - x) = 0.$$

Seien nun $x, y \in D$ und sei s ein achsenparalleler Streckenzug in D von x nach y .

Die Ecken von s seien $x = a^1, a^2, \dots, a^k = y$. Es gilt:

$$f(a^j) - f(a^{j-1}) \stackrel{\text{MWS II}}{=} J(\xi^1, \dots, \xi^m) \cdot (a^j - a^{j-1}) = 0.$$

Daraus folgt:

$$f(y) - f(x) = f(a^k) - f(a^1) = \sum_{j=2}^k f(a^j) - f(a^{j-1}) = 0.$$

Also ist f konstant.

8.3 Partielle Ableitungen

8.3.1 Vorüberlegungen

Sei $u: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in x .

Dann ist

$$u'(x) = (a_1, a_2, \dots, a_n) = a$$

und

$$u(x + h) = u(x) + a \cdot h + o(\|h\|) = u(x) + a_1 h_1 + \dots + a_n h_n + o(\|h\|)$$

mit $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$.

Was ist dann a_1 ?

Setze $h = (t, 0, \dots, 0)$. Dann gilt $h \rightarrow 0$ genau für $t \rightarrow 0$. Es ist

$$\begin{aligned} u(x_1 + t, x_2, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n) &= a_1 \cdot t + o(|t|) \\ \Rightarrow \frac{u(x_1 + t, x_2, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n)}{t} &= a_1 + \frac{o(|t|)}{t} \\ \Rightarrow a_1 &= \frac{u(x_1 + t, x_2, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n)}{t} + o(1) \text{ für } t \rightarrow 0 \\ \Rightarrow a_1 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_1 + t, x_2, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n)}{t} + o(1) \right] \end{aligned}$$

8.3.2 Definition: Partielle Ableitung, Gradient

Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $x \in D$. Dann heißt

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x_1, \dots, x_{\nu-1}, x_{\nu} + t, x_{\nu+1}, \dots, x_n) - u(x_1, \dots, x_n)}{t}$$

partielle Ableitung von u nach x_{ν} . Sie wird bezeichnet mit

$$D_{\nu}u(x) \text{ oder } \frac{\partial u}{\partial x_{\nu}}(x) \text{ oder } u_{x_{\nu}}(x).$$

Existieren alle partiellen Ableitungen, so heißt

$$\text{grad } u(x) := (u_{(x_1)}(x), \dots, u_{(x_n)}(x))$$

der *Gradient* von u .

Bemerkung: Der Gradientenvektor ist ein Zeilenvektor.

8.3.3 Satz

Ist u differenzierbar in x , so ist

$$u'(x) = \text{grad } u(x).$$

Beweis: Oben in 8.3.1.

8.3.4 Definition: Richtungsableitung

Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $x \in D$ und $e \in \mathbb{R}^n$ mit $\|e\| = 1$. Dann heißt

$$\frac{\partial u}{\partial e}(x) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x + te) - u(x)}{t}$$

die *Richtungsableitung* von u in Richtung e .

Spezialfall: Für $e = e^{\nu}$ ist $\frac{\partial u}{\partial e^{\nu}} = \frac{\partial u}{\partial x_{\nu}}$.

8.3.5 Satz

Ist $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ in x differenzierbar, so existieren alle Richtungsableitungen $\frac{\partial u}{\partial e}(x)$ und es ist

$$\frac{\partial u}{\partial e}(x) = e \cdot \text{grad } u(x).$$

Es gilt dann:

$$-\|\operatorname{grad} u(x)\| \leq \frac{\partial u}{\partial e}(x) \leq \|\operatorname{grad} u(x)\|.$$

Falls $\operatorname{grad} u(x) \neq 0$ ist, so ist Gleichheit nur für

$$e = \pm \frac{\operatorname{grad} u(x)}{\|\operatorname{grad} u(x)\|}.$$

Beweis: u ist differenzierbar. Damit ist

$$u(x+h) = u(x) + u'(x) \cdot h + o(\|h\|) \text{ für } h \rightarrow 0.$$

Setze $h = t \cdot e$ mit $e \in \mathbb{R}^n$, $\|e\| = 1$ und $t \in \mathbb{R}$. Damit ist

$$\begin{aligned} u(x+te) - u(x) &= tu'(x)e + o(|t|) \text{ für } t \rightarrow 0 \\ \Rightarrow \frac{u(x+te) - u(x)}{t} &= u'(x) \cdot e + o(1) \text{ für } t \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial e}(x) = u'(x) \cdot e = \operatorname{grad} u(x) \cdot e \end{aligned}$$

Beweis der Ungleichung:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial e} &= \operatorname{grad} u \cdot e \stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|\operatorname{grad} u\| \cdot \underbrace{\|e\|}_{=1} \\ \frac{\partial u}{\partial e} &= \operatorname{grad} u \cdot e \stackrel{\text{CSU}}{\geq} -\|\operatorname{grad} u\|. \end{aligned}$$

Falls $\operatorname{grad} u \neq 0$ ist, gilt:

$$\begin{aligned} \text{,,} = \text{“} &\iff \operatorname{grad} u \text{ und } e \text{ sind linear abhängig} \\ &\iff e = \lambda \operatorname{grad} u \text{ mit } \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Für positives λ liegt rechts, für negatives λ liegt links Gleichheit vor. Es ist also $\lambda = \pm \frac{1}{\|\operatorname{grad} u\|}$.

8.3.6 Satz

Ist $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenzierbar, so ist

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(x) \\ \operatorname{grad} f_2(x) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Beweis: Ohne.

8.3.7 Beispiele

1. Sei $u(x, y) = e^x \cos(y - x)$. Dann ist

$$u_x = e^x \cos(y - x) + e^x (-\sin(y - x)) \cdot (-1) = e^x (\cos(y - x) + \sin(y - x))$$

und

$$u_y = -e^x \sin(y - x).$$

Frage: Ist u nun differenzierbar?

2. Sei

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y} & \text{für } |y| > x^2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

u' und u sind unstetig in $(0, 0)$.

Alle Richtungsableitungen $\frac{\partial u}{\partial e}$ existieren in $(0, 0)$. Es ist

$$\frac{\partial u}{\partial e}(0, 0) = \begin{cases} 0 & \text{für } e = (\pm 1, 0) \\ \frac{a^2}{b} & \text{für } e = (a, b), a^2 + b^2 = 1, b \neq 0 \end{cases},$$

denn für $e = (\pm 1, 0)$ ist

$$\frac{u(\pm t, 0) - u(0, 0)}{t} = \frac{0 - 0}{t} \rightarrow 0 \text{ für } t \rightarrow 0$$

und für $e = (a, b)$ mit $b \neq 0$ ist

$$\begin{aligned} \frac{u(at, bt) - u(0, 0)}{t} &= \frac{\frac{a^2 t^2}{bt} - 0}{t} \text{ für kleines } |t| \\ &= \frac{a^2}{b} \rightarrow \frac{a^2}{b} \text{ für } t \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Zeige nun, daß u in $(0, 0)$ nicht stetig ist:

Es ist $u(x, 0) = 0$ und $u(x, 2x^2) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$.

Also ist u nicht stetig und damit nicht differenzierbar in $(0, 0)$.

8.3.8 Satz

Existiert $\text{grad } u$ von $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ und sind $u_{x_1}, \dots, u_{x_n}$ im Punkt x stetig, so ist u in x differenzierbar.

Beweis: Sei $h = (h_1, \dots, h_n)$ und $h^\nu = (h_1, \dots, h_\nu, 0, \dots, 0)$.

Insbesondere sind dann:

$$h^0 = (0, \dots, 0)$$

$$h^1 = (h_1, 0, \dots, 0)$$

$$h^2 = (h_1, h_2, 0, \dots, 0).$$

Es gilt dann:

$$\begin{aligned} u(x+h) - u(x) - \text{grad } u(x) \cdot h &= \sum_{\nu=1}^n \underbrace{u(x+h^\nu) - u(x+h^{\nu-1})}_{h_\nu u_{x_\nu}(x+\xi_\nu)} - u_{x_\nu}(x)h_\nu \\ &= \sum_{\nu=1}^n h_\nu [u_{x_\nu}(x+\xi_\nu) - u_{x_\nu}(x)]. \end{aligned}$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert (Stetigkeit des Gradienten) ein $\delta > 0$ mit

$$\|\text{grad } u(x) - \text{grad } u(y)\| < \varepsilon \text{ für } \|x - y\| < \delta.$$

Setze nun $y = x + h$ mit $\|h\| < \delta$. Dann ist

$$\begin{aligned} |u(x+h) - u(x) - \text{grad } u(x) \cdot h| &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|h\| \cdot \sqrt{\sum_{\nu=1}^n (u_{x_\nu}(x+\xi_\nu) - u_{x_\nu}(x))^2} \\ &< \varepsilon \cdot \|h\| \text{ für } \|h\| < \delta. \end{aligned}$$

Also ist $u'(x) = \text{grad } u(x)$.

8.3.9 Bemerkungen

Sei $u: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar im Punkt x . Dann gilt

$$u(x+h) = u(x) + u'(x) \cdot h + o(\|h\|).$$

Für $n = 1$ ist $z = u(x) + u'(x) \cdot t$ die Gleichung der Tangenten an den Graphen an der Stelle x .

Für $n \geq 2$ ist

$$z = u(a) + u'(a) \cdot (x - a)$$

die Gleichung einer Hyperebene im $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$.

$$T_a := \{(x, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : z = u(a) + u'(a) \cdot (x - a)\}$$

ist eine Tangentialhyperebene. Für diese Ebene gilt

$$(z - u(a)) - u'(a) \cdot (x - a) = 0.$$

Setze nun

$$\nu = \begin{pmatrix} -u_{x_1}(a) \\ \vdots \\ -u_{x_n}(a) \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

Für $(x, z) \in T_a$ gilt nun

$$\nu \cdot \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \\ z - u(a) \end{pmatrix} = 0, \quad \nu \text{ ist orthogonal zu } \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \\ z - u(a) \end{pmatrix}.$$

Also ist ν Normalenvektor zur Tangentialhyperebene.

8.4 Höhere Ableitungen

8.4.1 Definition: Stetig differenzierbar

Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, Gebiet. u heißt *stetig differenzierbar*, wenn $u_{x_1}, \dots, u_{x_n}$ in D stetig sind: $u \in C^1(D)$. $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ heißt stetig differenzierbar, wenn $f_1, \dots, f_m \in C^1(D)$ sind: $f \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$.

8.4.2 Definition: Mehrfach stetig differenzierbar

$u: D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt k -mal stetig differenzierbar, geschrieben: $u \in C^k(D)$, wenn alle Ableitungen $D_{j_1} \cdot D_{j_2} \dots D_{j_k} u$ für $j_1, \dots, j_k \in \{1, \dots, n\}$ in D stetige Funktionen sind.

8.4.3 Beispiele

- Es ist z. B. $D_1 D_2 u = (u_{x_2})_{x_1} =: u_{x_2 x_1}$
und $D_3 D_7 D_4 u = ((u_{x_4})_{x_7})_{x_3} =: u_{x_4 x_7 x_3}$.

- Sei $u(x, y) = x^2 - e^{xy}$. Dann ist

$$\begin{aligned} u_x &= 2x - ye^{xy} & u_y &= -xe^{xy} \\ u_{xx} &= 2 - y^2 e^{xy} & u_{xy} &= -e^{xy} - xye^{xy} \\ u_{yy} &= -x^2 e^{xy} & u_{yx} &= -e^{xy} - xye^{xy}. \end{aligned}$$

8.4.4 Satz von H. A. Schwarz (1. Version)

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^2$ offen, $u: D \rightarrow \mathbb{R}$, $u \in C^1(D)$ und u_{xy} existiere in D und ist stetig in $(a, b) \in D$. Dann existiert auch $u_{yx}(a, b) = u_{xy}(a, b)$.

Beweis: Für $(a, b) = (0, 0)$:
Es gilt

$$\begin{aligned} R(x, y) &:= (u(x, y) - u(x, 0)) - (u(0, y) - u(0, 0)) \\ &= x \cdot [u_x(\xi, y) - u_x(\xi, 0)] \text{ mit } \xi \text{ aus dem MWS zwischen } 0 \text{ und } x \\ &= x \cdot y \cdot u_{xy}(\xi, \eta) \text{ mit } \eta \text{ zwischen } 0 \text{ und } y \text{ (MWS)} \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} u_{xy}(\xi, \eta) &= \frac{R(x, y)}{xy} = \frac{u(x, y) - u(x, 0) - u(0, y) + u(0, 0)}{xy} \\ &= \frac{1}{x} \cdot \frac{(u(x, y) - u(x, 0)) - (u(0, y) - u(0, 0))}{y} \end{aligned}$$

Für $y \rightarrow 0$ ist damit

$$\rightarrow \frac{1}{x} (u_y(x, 0) - u_y(0, 0))$$

und danach für $x \rightarrow 0$:

$$\rightarrow u_{yx}(0, 0)$$

Dabei geht die linke Seite wegen der Stetigkeit von $u_{x,y}$ gegen $u_{xy}(0, 0)$.

8.4.5 Satz von H. A. Schwarz (2. Version)

Ist $u \in C^k(D)$, so ist

$$D_{j_1} D_{j_2} \dots D_{j_k} u \text{ für } j_1, \dots, j_k \in \{1, \dots, n\}$$

unabhängig von der Reihenfolge der Differentiation.

Beweis: Als Aufgabe.

8.4.6 Definition und Regeln: Multiindex

$p \in \mathbb{N}_0^n$ heißt Multiindex. Es gilt:

$$\begin{aligned} p &= (p_1, p_2, \dots, p_n) \text{ mit } p_\nu \in \mathbb{N}_0 \\ |p| &:= p_1 + p_2 + \dots + p_n \text{ ist die Länge von } p \\ p! &:= p_1! \cdot p_2! \cdot \dots \cdot p_n! \end{aligned}$$

Für $x \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$x^p := x_1^{p_1} x_2^{p_2} \dots x_n^{p_n}.$$

8.4.7 Definition: Polynom, Taylorpolynom

$$\sum_{|p| \leq k} a_p x^p \text{ mit festem } k \text{ und } a_p = a_{p_1, \dots, p_n}$$

ist ein Polynom in $x \in \mathbb{R}^n$.

Z. B. ist für $n = 2$

$$a_{00} + a_{10}x_1 + a_{01}x_2 + a_{20}x_1^2 + a_{11}x_1x_2 + a_{02}x_2^2.$$

Sei nun $u \in C^k(D)$ und $p \in \mathbb{N}_0^n$ mit der Länge $|p| = k$.

Dann bedeutet

$$\frac{\partial^k u}{\partial x^p} = \frac{\partial^k u}{\partial x_1^{p_1} \partial x_2^{p_2} \dots \partial x_n^{p_n}}$$

differenziere p_1 -mal nach x_1 ,

differenziere p_2 -mal nach x_2 ,

⋮

differenziere p_n -mal nach x_n .

Sei nun $u \in C^k(D)$ und $a \in D$. Dann ist

$$T_k(x; a) := \sum_{|p| \leq k} c_p (x - a)^p$$

mit

$$c_p := \frac{1}{p!} \cdot \frac{\partial^{|p|} u}{\partial x^p}(a)$$

das k -te Taylorpolynom von u an der Stelle a .

8.4.8 Satz von Taylor

Ist $u \in C^k(D)$ und ist $a \in D$, so gilt:

$$|u(x) - T_k(x; a)| = o(\|x - a\|^k)$$

für $x \rightarrow a$.

Beweis: Wähle $r > 0$ so, daß $K(a, r) \subseteq D$ ist. Sei dann $x \in K(a, r)$.

Setze

$$\varphi(t) := u(a + t(x - a)) \text{ für } 0 \leq t \leq 1.$$

Es ist $\varphi \in C^k([0, 1])$. Damit ist nach dem eindimensionalen Satz von Taylor (4.4.5, Seite 87):

$$\begin{aligned} \varphi(1) &= \sum_{\ell=0}^{k-1} \frac{\varphi^{(\ell)}(0)}{\ell!} 1^\ell + \frac{\varphi^{(k)}(\tau)}{k!} 1^k \text{ mit } 0 < \tau < 1 \\ &= \sum_{\ell=0}^k \frac{\varphi^{(\ell)}(0)}{\ell!} + \frac{\varphi^{(k)}(\tau) - \varphi^{(k)}(0)}{k!}. \end{aligned}$$

Mit Induktion (wird weiter unten gezeigt) gilt dann:

$$\frac{\varphi^{(\ell)}}{\ell!}(t) = \sum_{|p|=\ell} \frac{1}{p!} \cdot \frac{\partial^\ell u}{\partial x^p}(a + t(x - a))(x - a)^p. \quad (8.1)$$

Wenn (8.1) gilt, dann folgt:

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{\ell=0}^k \sum_{|p|=\ell} \frac{1}{p!} \cdot \frac{\partial^\ell u}{\partial x^p}(a)(x-a)^p \\ &+ \left[\sum_{|p|=k} \frac{1}{p!} \left(\frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a + \tau(x-a)) - \frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a) \right) (x-a)^p \right] \\ &= T_k(x; a) + R_k(x; a). \end{aligned}$$

Es gilt:

$$|R_k(x; a)| \leq \sum_{|p|=k} \frac{1}{p!} \cdot \left| \frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a + \tau(x-a)) - \frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a) \right| \cdot \|x-a\|^k,$$

weil

$$\|h^p\| = |h_1^{p_1} \dots h_n^{p_n}| \leq \|h\|^{p_1+p_2+\dots+p_n} = \|h\|^{|p|}.$$

Sei nun $\varepsilon > 0$. Dazu existiert (wegen der Stetigkeit) ein $\delta > 0$ mit

$$\left| \frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a+h) - \frac{\partial^k u}{\partial x^p}(a) \right| < \varepsilon \text{ f\"ur } \|h\| < \delta.$$

F\"ur $\|x-a\| < \delta$ gilt dann:

$$|R_k(x; a)| \leq \varepsilon \|x-a\|^l \cdot (\# \text{Anzahl der Summanden}).$$

Beweise nun die Gleichung (8.1): Hier f\"ur $a = 0$.

$\ell = 1$: Es ist

$$\varphi(t) \stackrel{!}{=} u(tx) \checkmark$$

$\ell \mapsto \ell + 1 \leq k$:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi^{(\ell+1)}}{(\ell+1)!}(t) &= \frac{1}{\ell+1} \left(\frac{\varphi^{(\ell)}(t)}{\ell!} \right)' \\ &= \frac{1}{\ell+1} \sum_{|p|=\ell} \frac{1}{p!} \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial}{\partial x_\nu} \cdot \frac{\partial^\ell u}{\partial x^p}(tx) \cdot x_\nu x^p \\ &= \frac{1}{\ell+1} \sum_{\nu=1}^n \sum_{|p|=\ell} \frac{1}{p!} \cdot \frac{\partial^{\ell+1} u}{\partial x^{p+e^\nu}}(tx) x^{p+e^\nu} \end{aligned}$$

mit e^ν , dem ν -ten Einheitsvektor. Es gilt:

$$|p+e^\nu| = |p| + 1 = \ell + 1.$$

Sei nun q ein Multiindex der L\"ange $\ell + 1$. Dann ist

$$M_q := \{p: |p| = \ell \text{ und } q = p + e^\nu \text{ f\"ur ein } \nu\}.$$

Mit

$$\sum_{p \in M_q} \frac{1}{p!} = \sum_{q_\nu > 0} \frac{p_\nu + 1}{q!} = \sum_{q_\nu > 0} \frac{q_\nu}{q!} = \frac{1}{q!} (\ell + 1)$$

gilt dann:

$$\begin{aligned} \frac{\varphi^{(\ell+1)}}{(\ell+1)!}(t) &= \frac{1}{\ell+1} \sum_{|q|=\ell+1} \sum_{p \in M_q} \frac{1}{p!} \cdot \frac{\partial^{\ell+1} u}{\partial x^q}(tx) x^q \\ &= \frac{1}{\ell+1} \sum_{|q|=\ell+1} \frac{1}{q!} \cdot \frac{\partial^{\ell+1} u}{\partial x^q}(tx) x^q (\ell+1) \\ &= \sum_{|q|=\ell+1} \frac{1}{q!} \cdot \frac{\partial^{\ell+1} u}{\partial x^q}(tx) x^q. \end{aligned}$$

8.4.9 Spezialfall für den Satz von Taylor

Sei $u \in C^2(D)$ und $a \in D$. Dann ist

$$\begin{aligned} u(x) &= u(a) + \sum_{\nu=1}^n u_{x_\nu}(a)(x_\nu - a_\nu) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu=1}^n u_{x_\nu x_\mu}(a)(x_\nu - a_\nu)(x_\mu - a_\mu) \\ &\quad + o(\|x - a\|^2). \end{aligned}$$

8.4.10 Definition: Hesse-Matrix

Für $u \in C^2(D)$ heißt

$$H_u(a) := \begin{pmatrix} u_{x_1 x_1} & u_{x_1 x_2} & \cdots & u_{x_1 x_n} \\ \vdots & & & \vdots \\ u_{x_n x_1} & u_{x_n x_2} & \cdots & u_{x_n x_n} \end{pmatrix} (a)$$

Hesse-Matrix. H_u ist symmetrisch, da $u_{x_\mu x_\nu} = u_{x_\nu x_\mu}$.

Setze man $Q_u(h) := h^T H_u(a) h$, dann gilt mit Taylor:

$$u(a+h) = u(a) + u'(a) \cdot h + \frac{1}{2} Q_u(h) + o(\|h\|^2).$$

8.4.11 Definition: Extremum

Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$. $a \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt Stelle eines Maximums bzw. Minimums (zusammen: Extremums) der Funktion u , wenn

$$u(x) \leq u(a) \text{ bzw. } u(x) \geq u(a) \text{ für alle } \|x - a\| < \delta.$$

8.4.12 Satz

Sei $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ und $a \in D$.

- (1) Ist a Stelle eines Extremums und existiert $u'(a)$, so ist $u'(a) = 0$.
- (2) Ist sogar $u \in C^2(D)$, so gilt im Falle eines Maximums bzw. Minimums, daß $H_u(a)$ negativ bzw. positiv semidefinit ist.

Beweis:

(1) $\varphi(t) = u(a_1 + t, a_2, \dots, a_n)$ hat Extremum für $t = 0$, d. h. $\varphi'(0) = 0 = u_{x_1}(a)$, also ist $u'(a) = 0$.

(2) Gilt:

$$\begin{aligned} \text{Minimum: } & \varphi''(0) \leq 0 \quad u_{x_1 x_1}(a) \leq 0 \quad ? \\ \text{Maximum: } & \varphi''(0) \geq 0 \quad u_{x_1 x_1}(a) \geq 0 \end{aligned}$$

Z. B. für das Minimum: Sei $\|h\| \leq \delta$:

$$u(a) \leq u(a+h) = u(a) + \underbrace{u'(a) \cdot h}_{=0} + \frac{1}{2} Q_u(h) + o(\|h\|^2)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} Q_u(h) + o(\|h\|^2) \geq 0 \text{ für } \|h\| < \delta.$$

Wähle nun $e \in \mathbb{R}^n$ und setze $h = te$ mit kleinem $t \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$o \leq \frac{1}{2} Q_u(te) + o(\|te\|^2) = \underbrace{t^2}_{>0} \underbrace{\left(\frac{1}{2} Q_u(e) + o(1) \right)}_{\geq 0} \text{ für } t \rightarrow 0$$

Für $t \rightarrow 0$ ist damit dann $Q_u(e) \geq 0$ für $e \in \mathbb{R}^n$, d. h. Q_u ist positiv semidefinit.

8.4.13 Satz

Sei $u \in C^2(D)$, $a \in D$, $u'(a) = 0$ und $H_u(a)$ positiv bzw. negativ definit. Dann ist a Stelle eines Minimums bzw. Maximums.

Ist H_u indefinit, so liegt in a weder ein Maximum noch ein Minimum.

Beweis: Sei Q_u positiv definit. Dann ist

$$\begin{aligned} u(a+h) - u(a) &= \underbrace{\frac{1}{2} Q_u(h)}_{\substack{\geq \alpha \|h\|^2 \\ \text{mit } \alpha > 0}} + \underbrace{o(\|h\|^2)}_{\substack{|\cdot| < \frac{\alpha}{2} \|h\|^2 \\ \text{für } \|h\| < \delta}} \\ &\geq \left(\alpha - \frac{\alpha}{2} \right) \|h\|^2 > 0 \text{ für } 0 < \|h\| < \delta \end{aligned}$$

Also ist in a ein Minimum.

8.4.14 Beispiele

(1) Sei $u(x, y) = x^2 - y^2$. Dann ist $u_x = 2x$ und $u_y = -2y$. $u' = 0$ gilt genau für $(x, y) = (0, 0)$.

Es ist $u_{xx} = 2$, $u_{xy} = 0 = u_{yx}$ und $u_{yy} = -2$.

Also ist $H_u = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. H_u ist indefinit.

Also gibt es keine Extrema.

(2) Sei $u(x, y) = xy(1 - x - y)$.

Dann ist $u_x = y(1 - x - y) + xy(-1) = y(1 - 2x - y)$ und $u_y = x(1 - 2y - x)$.

$u_x = 0$, $u_y = 0 \iff (x, y) \in \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})\}$.

Es ist $u_{xx} = -2y$, $u_{yy} = -2x$

und $u_{xy} = u_{yx} = -2x - 2y$.

$H_u(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ist indefinit.

$H_u(1,0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ ist indefinit.

$H_u(0,1) = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ist indefinit.

$H_u(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ ist negativ definit, also liegt ein Maximum vor.

- (3) Sei $u(x, y, z) = x^2 + y^2 - xy - x + z^2 - z$.
Es sind dann

$$u_x = 2x - y - 1$$

$$u_y = 2y - x$$

$$y_z = 2z - 1 = 0$$

Es ist $(u_x, u_y, u_z) = (0, 0, 0)$ für $(x, y, z) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$

und $H_u = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ist positiv definit,

also liegt in $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2})$ ein Minimum vor.

8.5 Implizite Funktionen und Umkehrfunktionen

8.5.1 Beispiel

Die Gleichung $x^y = y^x$ hat für $x, y > 0$ z. B. folgende Lösungen:

$$y = x$$

$$x = 4, y = 2$$

$$y = 4, x = 2$$

Gibt es weitere Lösungen?

8.5.2 Schreibweisen

Im Folgenden ist $\mathbb{R}^{n+m} := \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$. Für $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ oder (x, y) ist $x \in \mathbb{R}^n$ und $y \in \mathbb{R}^m$.

8.5.3 Satz über implizit definierte Funktionen

Es sei $U = K(x^0, r) \subseteq \mathbb{R}^n$ und $V = K(y^0, \varrho) \subseteq \mathbb{R}^m$.

Außerdem sei $f: U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $f(x^0, y^0) = 0$ gegeben.

f sei stetig,

$$f_y := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$$

sei stetig und $\det f_y(x^0, y^0) \neq 0$.

Dann gibt es Kugeln $U_0 = K(x^0, r_0)$ und $V_0 = K(y^0, \varrho_0)$, sowie eine stetige Funktion $g: U_0 \rightarrow V_0$ mit

$$\{(x, y): x \in U_0, y \in V_0, f(x, y) = 0\} = \{(x, g(x)): x \in U_0\}.$$

Ist f_x stetig, so ist $g \in C^1(U_0, \mathbb{R}^m)$ und in U_0 ist

$$g'(x) = -(f_y(x, g(x)))^{-1} \cdot f_x(x, g(x)).$$

Beweis: Sei OBdA $x_0 = 0 \in \mathbb{R}^n$ und $y^0 = 0 \in \mathbb{R}^m$ (sonst betrachte $f(x^0+x, y^0+y) = \tilde{f}(x, y) = 0$).
Setze

$$A := (f_y(0, 0))^{-1}.$$

Dann ist

$$f(x, y) = 0 \iff y = y - Af(x, y) =: F(x, y).$$

Beachte: Es ist $F(0, 0) = 0 \in \mathbb{R}^m$ und $F_y(0, 0) = 0$ ist $(m \times n)$ -Nullmatrix.

Wähle nun U_0 und V_0 so, daß $\|F(x, 0)\| < \varrho_0/2$ für $x \in U_0$ ist (dies ist wegen der Stetigkeit von F möglich), und daß $\|F_y(x, y)\| < \frac{1}{2}$ ist für $(x, y) \in U_0, V_0$.

Eindeutigkeit von g :

Zeige: Zu $x \in U_0$ gibt es höchstens ein $y \in V_0$ mit $f(x, y) = 0$.

Annahme: Es gibt $y, z \in V_0$ mit $f(x, y) = f(x, z) = 0$. Es gilt dann:

$$y = F(x, y)$$

$$z = F(x, z)$$

Nach Subtraktion gilt dann:

$$y - z = F(x, y) - F(x, z) \stackrel{\text{MWS III}}{=} \left[\int_0^1 F_y(x, ty + (1-t)z) dt \right] \cdot (y - z).$$

Daraus folgt dann:

$$\begin{aligned} \|y - z\| &\leq \left\| \int_0^1 \underbrace{F_y(x, ty + (1-t)z)}_{\|\cdot\| < \frac{1}{2}} dt \right\| \cdot \|y - z\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|y - z\|, \end{aligned}$$

also ist $y = z$.

Existenz von g :

Setze

$$M = \{u: u \text{ ist stetig in } U_0, u: U_0 \rightarrow V_0, u(0) = 0\}.$$

Definiere folgende Metrik auf M :

$$d(u, v) := \sup \{\|u(x) - v(x)\| : x \in U_0\}.$$

Anmerkung zur Definition dieser Norm:

Sei $B = \{u \in C(u_0, \mathbb{R}^m) : u(0) = 0\}$.

Auf B ist folgende Norm definiert: $\|u\|_\infty := \sup \{\|u(x)\| : x \in U_0\}$.

B ist ein Banachraum.

M ist abgeschlossene Teilmenge von B mit $d(u, v) = \|u - v\|_\infty$.

Also ist M vollständig.

Definiere nun eine Kontraktion T auf M :

$$T : \begin{cases} u \in M & \mapsto Tu \\ (Tu)(x) & := F(x, u(x)) \end{cases}$$

Zeige nun:

1. $T: M \rightarrow M$, T ist Selbstabbildung
2. $d(Tu, Tv) \leq \frac{1}{2}d(u, v)$, T ist eine Kontraktion.

Dann gibt es nach dem Banachschen Fixpunktsatz (7.5.5, Seite 176) (genau) ein $u \in M$, stetig mit $u = Tu$, d. h.

$$\begin{aligned} u(x) &= F(x, u(x)) = u(x) - Af(x, u(x)) \\ \iff f(x, u(x)) &= 0 \text{ in } U_0. \end{aligned}$$

Setze dann $g = u$.

Beweise nun, daß T eine Selbstabbildung (1) und Kontraktion(2) ist:

- (1) $\bar{u}(x) := (Tu)(x) = F(x, u(x))$ ist wohldefiniert, da $\|u(x)\| < \varrho_0$ ist, und da F in $U_0 \times V_0$ definiert ist.
 Es gilt: $\bar{u}(0) = F(0, 0) = 0$.
 $\bar{u}$ ist stetig.
 Ist $\|\bar{u}\| < \varrho_0$, d. h. gilt $\bar{u}: U_0 \rightarrow V_0$?

$$\begin{aligned} \|\bar{u}(x)\| &\leq \|F(x, 0)\| + \|F(x, u(x)) - F(x, 0)\| \\ &< \frac{\varrho_0}{2} + \frac{1}{2}\|u(x) - 0\| < \varrho_0. \end{aligned}$$

- (2) Beweis der Kontraktion:

Seien $u, v \in M$, $\bar{u} = Tu$ und $\bar{v} = Tv$. Dann ist

$$\begin{aligned} \|\bar{u}(x) - \bar{v}(x)\| &= \|F(x, u(x)) - F(x, v(x))\| \\ &\leq \frac{1}{2}\|u(x) - v(x)\| \leq \frac{1}{2}d(u, v) \end{aligned}$$

für alle $x \in U_0$.

Also ist $d(\bar{u}, \bar{v}) \leq \frac{1}{2}d(u, v)$.

Differenzierbarkeit von g (zunächst in $x = 0$). (Es ist $F \in C^1(U_0 \times V_0, \mathbb{R}^m)$)

Es gilt die Approximation

$$F(x, y) = F_x(0, 0)x + o(\|(x, y)\|) \text{ für } (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

Beachte dabei, daß $F_y(0, 0) = 0$ ist.

Insbesondere gilt:

$$g(x) = F(x, g(x)) = F_x(0, 0)x + o(\|(x, g(x))\|),$$

also ist $g(x) = O(\|x\|)$ für $x \rightarrow 0$.

Es ist dann

$$\begin{aligned} g(x) - F_x(0, 0)x &= o(\|(x, g(x))\|) = o(\|x\|) \text{ für } x \rightarrow 0 \\ g(x) - g(0) - F_x(0, 0)x &= o(\|x\|), \end{aligned}$$

d. h.

$$g'(0) = +F_x(0, 0) = -Af_x(0, 0) = (f_y(0, g(0)))^{-1} f_x(0, g(0)).$$

Also gilt die Behauptung für $x = 0$.

Differenzierbarkeit von g für $\xi \in U_0$: Es ist zu zeigen:

$$g'(\xi) = -(f_y(\xi, g(\xi)))^{-1} f_x(\xi, g(\xi)) \text{ für } \xi \in U_0.$$

Die Rolle, die (x^0, y^0) gespielt hat, kann jeder Punkt $(\xi, g(\xi))$ übernehmen.

8.5.4 Beispiel

Für $n = 2$ und $m = 1$. Die Gleichung

$$\sin(x + z) + \sin(y + z) = z$$

ist in einer Umgebung von $(x, y) = (0, 0)$ in der Form $z = g(x, y)$ aufzulösen, wobei $g(0, 0) = 0$ ist. Überprüfe die Voraussetzungen: Es ist $f(x, y, z) = \sin(x + z) + \sin(y + z) - z$.

$$f(0, 0, 0) = 0$$

$$\text{Außerdem ist } f_z(x, y, z) = \cos(x + z) + \cos(y + z) - 1$$

$$f_z(0, 0, 0) = 1 + 1 - 1 = 1 \neq 0.$$

Also existiert eine Funktion $g: U_0 \rightarrow V_0$ mit $g(0, 0) = 0$ und $f(x, y, g(x, y)) = 0$ für alle $(x, y) \in U_0$.

Dabei ist $U_0 = K((0, 0), r_0) \subseteq \mathbb{R}^2$ und $V_0 = (-\varrho, \varrho)$.

Berechne nun $g_x(0, 0)$ und $g_y(0, 0)$:

Es ist $f(x, y, g(x, y)) = 0$ in U_0 . Differenziere nach x und y .

Dann ist

$$f_x + f_z \cdot g_x = 0$$

und

$$f_y + f_z \cdot g_y = 0.$$

In $(x, y) = (0, 0)$, $z = 0$ gilt dann:

$$1 \cdot g_x(0, 0) = -f_x(0, 0, 0) = -\cos(0 + 0) = -1$$

$$1 \cdot g_y(0, 0) = -f_y(0, 0, 0) = -\cos(0 + 0) = -1.$$

8.5.5 Satz über die Umkehrfunktion

Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ Gebiet, $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$.

Außerdem sei $\xi \in D$ und $\det f'(\xi) \neq 0$. Dann gibt es in einer Kugel $V_0 = K(\eta, r)$ eine Umkehrfunktion g von f mit $g(\eta) = \xi$.

g ist dadurch eindeutig bestimmt und es gilt:

$$g'(y) = (f'(x))^{-1} \Big|_{x=g(y)}$$

Beweis: Setze $F: D \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $F(x, y) := f(x) - y$.

$F \in C^1(D \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ und $F(\xi, \eta) = 0$.

$F_x(x, y) = f'(x)$, also ist $\det F_x(\xi, \eta) = \det f'(\xi) \neq 0$.

Nach dem Satz über implizite Funktionen existiert V_0 sowie $g \in C^1(V_0, \mathbb{R}^n)$ mit

$$g(\eta) = \xi$$

und

$$F(g(y), y) = 0 \text{ für alle } y \in V_0.$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} f(g(y)) - y &= 0, \quad g = f^{-1} \text{ in } V_0 \\ f(g(y)) &= y \\ f'(g(y)) \cdot g'(y) &= I = \text{diag}(1, \dots, 1). \end{aligned}$$

Daraus folgt die Behauptung für $g'(y)$.

8.5.6 Definition: Diffeomorphismus

Eine bijektive C^1 -Funktion $f: D \rightarrow G$ mit $f^{-1} \in C^1(G, \mathbb{R}^n)$ heißt *Diffeomorphismus*.

8.5.7 Satz über die Gebietstreue

Ist $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$ mit einem Gebiet $D \subseteq \mathbb{R}^n$ und regulärem $f'(x)$ in D , so ist $f(D)$ wieder ein Gebiet. ($f'(x)$ ist regulär, wenn die Determinante ungleich Null ist.)

Beweis: $G = f(D)$ ist zusammenhängend, weil D zusammenhängend und weil f stetig ist.

Sei nun $\eta \in G = f(D)$ und $\eta = f(\xi)$.

Da $\det f'(\xi) \neq 0$ ist, existiert eine Kugel $V_0 = K(\eta, r_0)$ sowie $f^{-1}: V_0 \rightarrow D$.

Es gilt: $V_0 \subseteq f(D)$, η ist innerer Punkt, beliebig.

Also ist $f(D) = G$ offen.

8.6 Extrema mit Nebenbedingungen

8.6.1 Allgemeines Problem

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $m < n$.

Gesucht sind Maxima bzw. Minima von f auf

$$M = \{x: g(x) = 0\}.$$

Extremum von f unter der Nebenbedingung $g = 0$.

8.6.2 Konkrete Probleme

(a) A sei eine symmetrische $n \times n$ -Matrix.

Maximiere bzw. Minimiere $x^T A x$ auf der Menge $\{x: \|x\| = 1\}$.

Hier: $f(x) = x^T A x$, $D = \mathbb{R}^n$, $g(x) = \|x\|^2 - 1$.

(b) Maximiere $x_1 x_2 \dots x_n$ unter der NB $x_1 + \dots + x_n = n$, alle $x_\nu > 0$.

Hier: $f(x) = x_1 \dots x_n$, $g(x) = x_1 + \dots + x_n - n$, $D = \{x: x_1 > 0, \dots, x_n > 0\}$.

8.6.3 Lagrangesche Multiplikationsregel

$f \in C^1(D)$ habe in $\xi \in D$ ein Extremum unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$, wobei $g \in C^1(D, \mathbb{R}^m)$ und $\operatorname{rg} g'(\xi) = m$, $m < n$.

Dann gibt es ein $\lambda^0 \in \mathbb{R}^m$ mit: Die Ableitung von

$$H(x, \lambda) := f(x) - \lambda \cdot g(x)$$

$H: D \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ verschwindet in (ξ, λ^0) .

λ^0 heißt Lagrangemultiplikator.

Beweis: Sei $\operatorname{rg} g'(\xi) = m$. Dann enthält die $m \times n$ -Matrix eine reguläre $m \times m$ -Matrix. Nach Ummumerierung sei OBdA $\left(\frac{\partial g_\mu}{\partial x_\nu}\right)_{\mu, \nu=1, \dots, m}$ regulär.

Schreibe $x = (y, z)$ und $\xi = (\eta, \zeta)$. Dabei ist $y = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $z = (x_{m+1}, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-m}$, $\eta \in \mathbb{R}^m$ und $\zeta \in \mathbb{R}^{n-m}$.

Es ist $g(y, z) = 0$, $g(\eta, \zeta) = 0$ und $g_y(\eta, \zeta)$ regulär.

Nach dem Satz über implizite Funktionen gibt es eine Kugel $U = (\zeta, r) \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ und $h \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ mit

$$g(h(z), z) = 0 \text{ in } U$$

$$g(y, z) \neq 0 \text{ für } z \in U, y \neq h(z)$$

$\Phi(z) = f(h(z), z)$, definiert in U , hat Extremum in $z = \zeta \in U$, also

$$\Phi'(\zeta) = 0.$$

Es ist $\Phi'(z) = f_y(h(z), z) \cdot h'(z) + f_z(h(z), z)$ und $g(h(z), z) = 0$ in U .

$$\Rightarrow \underbrace{g_y(h(z), z)}_{m \times n\text{-Matrix}} \cdot \underbrace{h'(z)}_{m \times (n-m)} + g_z(h(z), z) = 0$$

$g_y(h(\zeta), \zeta) = g_y(\eta, \zeta)$ ist regulär.

Mit Einsetzen von (2) in (1) ergibt sich

$$\begin{aligned} h'(\zeta) &= (g_y(\eta, \zeta))^{-1} \cdot g_z(\eta, \zeta) \\ -f_y(\eta, \zeta) \cdot (g_y(\eta, \zeta))^{-1} g_z(\eta, \zeta) + f_z(\eta, \zeta) &= 0 \\ -f_y(\xi) \cdot (g_y(\xi))^{-1} g_z(\xi) + f_z(\xi) &= 0 \end{aligned}$$

Setze $(\lambda^0)^T := -f_y(\xi) \cdot (g_y(\xi))^{-1} \in \mathbb{R}^m$. Daraus folgt dann:

$$f_z + \lambda^0 g_z = 0 \text{ in } \xi$$

$$f_y + \lambda^0 g_y = 0 \text{ in } \xi$$

8.6.4 Beispiel

Maximiere bzw. Minimiere $x^T A x$ unter der NB $\|x\|^2 = 1$.

(1) $S^{n-1} = \{\|x\|^2 = 1\}$ ist kompakt.

Also existieren Maximum und Minimum von $x^T A x$ auf S^{n-1} .

(2) Setze

$$g(x) = \|x\|^2 - 1 = \left(\sum_{\nu=1}^n x_\nu^2 \right) - 1$$

Es ist $m = 1 < n$,

$$g'(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n) \neq 0 \text{ auf } S^{n-1}$$

und $\text{rg } g'(x) = 1$.

(3) Es ist

$$H(x, \lambda) = \sum_{\nu, \mu=1}^n a_{\nu\mu} x_\nu x_\mu - \lambda \cdot \left(\left(\sum_{\nu=1}^n x_\nu^2 \right) - 1 \right)$$

Dann ist

$$H_{x_\varrho} = \sum_{\nu=1}^n a_{\varrho\nu} x_\nu + \sum_{\mu=1}^n a_{\mu\varrho} x_\mu - 2\lambda x_\varrho = 2 \left(\left(\sum_{\nu=1}^n a_{\varrho\nu} x_\nu \right) - \lambda x_\varrho \right) \stackrel{!}{=} 0 \text{ für } \varrho = 1, \dots, n$$

$$H_\lambda = \sum_{\nu=1}^n x_\nu^2 - 1 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\iff Ax - \lambda x = 0 \text{ und } \|x\|^2 = 1$$

Minimum und Maximum von $x^T Ax$ werden *nur* in Eigenvektoren auf S^{n-1} angenommen. Dabei ist λ der zugehörige Eigenwert.

$$\min_{S^{n-1}}, \max_{S^{n-1}} x^T Ax \in \{x^T Ax : x \in S^{n-1}, x \text{ Eigenvektor}\}$$

$\max, \min x^T Ax =$ größter bzw. kleinster Eigenwert.

8.6.5 Praktisches Vorgehen

Gesucht: Extremum von $f(x)$ unter der NB $g(x) = 0$.

1. Ansatz: $H(x, \lambda) := f(x) + \lambda g(x)$.
2. Ableitung berechnen und gleich 0 setzen:

$$H_x = f' + \lambda g' \stackrel{!}{=} 0 \qquad H_\lambda = g \stackrel{!}{=} 0$$

Dies sind $n + m$ Gleichungen mit $n + m$ Unbekannten.

3. Auflösen nach (x, λ) . λ nicht unbedingt explizit erforderlich: Lösungen (ξ, λ) .
4. Ist $\text{rg } g'(\xi) = m$? Hat f unter NB überhaupt Extrema? Wenn ja, suche unter den Werten $f(\xi)$.

8.6.6 Beispiele

1. Maximiere $x_1 x_2 \dots x_n$ unter der NB $x_1 + x_2 + \dots + x_n = n$ ($x_1, \dots, x_n > 0$).
 Es ist $f(x) = x_1 \dots x_n$, $g(x) = x_1 + \dots + x_n - n$ und $D = \{x: x_\nu > 0 \text{ für } \nu = 1, \dots, n\}$.
 Ansatz:

$$\begin{aligned} H(x, \lambda) &= x_1 \dots x_n + \lambda(x_1 + \dots + x_n - n) \\ H_{x_j} &= \frac{x_1 \dots x_n}{x_j} + \lambda \stackrel{!}{=} 0 \text{ für alle } j \\ H_\lambda &= x_1 + \dots + x_n - n = 0 \end{aligned}$$

Also ist $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$, da $x_1 + \dots + x_n = n$ ist und alle x_ν gleich sein müssen.
 Es ist $\xi = (1, \dots, 1)$. Ist

$$f(\xi) = 1 \dots 1 = 1 = \text{Maximum unter NB?}$$

Es ist $g'(x) = (1, \dots, 1) \neq 0$ und $\text{rg } g'(x) = 1 = m$.
 Existenz des Maximums:

$$\{x: x_1 + \dots + x_n = n, x_1, \dots, x_n > 0\}$$

ist kompakt. Darauf hat f ein Maximum. Es wird *nicht* angenommen, wenn ein $x_\nu = 0$, also angenommen, wo alle $x_\nu > 0$ sind, also in D .

2. A sei eine $n \times n$ -Matrix mit

$$\sum_{\mu, \nu=1}^n a_{\mu, \nu}^2 = n.$$

Gesucht ist A , so daß $\det A$ maximal wird.

- (a) $\{(a_{11}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{n1}, \dots, a_{nn}) : a_{\mu, \nu} \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^{(n^2)}$
 (b) $\{a_{\mu, \nu} : \sum_{\mu, \nu=1}^n a_{\mu, \nu}^2 = n\}$ ist kompakt.
 (c) $A \mapsto \det A$ ist stetig. Somit existiert das Maximum.
 (d) Es gilt $\det A = \sum_{k=1}^n a_{jk} A_{jk}$ (LaPlace'scher Entwicklungssatz).
 (e) Setze $f(A) = \det A$ und $g(A) = \sum_{\mu, \nu=1}^n a_{\mu, \nu}^2 - n$.

Ansatz:

$$\begin{aligned} H(A, \lambda) &= \det A + \lambda \left(\sum_{\mu, \nu=1}^n a_{\mu, \nu}^2 - n \right) \\ &= \sum_{k=1}^n a_{jk} A_{jk} + \lambda \left(\sum_{\mu, \nu=1}^n a_{\mu, \nu}^2 - n \right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial H}{\partial a_{j\ell}} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial a_{jk}}{\partial a_{j\ell}} A_{jk} + 2\lambda a_{j\ell} = A_{j\ell} + 2\lambda a_{j\ell} = 0$$

$$A_{j\ell} = -(2\lambda) a_{j\ell}$$

$$\det A = \sum_{\ell=1}^n a_{j\ell} A_{j\ell} = -2\lambda \sum_{\ell=1}^n a_{j\ell}^2$$

für $j = 1, \dots, n$.
Dann ist

$$n \cdot \det A = -2\lambda \cdot \sum_{\ell=1}^n \sum_{j=1}^n a_{j\ell}^2 = n(-2\lambda)$$

$$\det A = -2\lambda.$$

Es gilt:

$$\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = A^{-1}$$

$$\frac{-2\lambda}{\det A} A^T = A^{-1} \Rightarrow A^{-1} = A^T$$

A ist Orthogonalmatrix, also ist $\det A = 1$.

8.6.7 Satz

Unter allen $n \times n$ -Matrizen mit $\sum_{\mu,\nu=1}^n a_{\mu,\nu}^2 = n$ haben genau die Orthogonalen maximale Determinanten $\det A = 1$.

Hadamardsche Determinantengleichung: Sei A eine $n \times n$ -Matrix:

$$(\det A)^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk}^2.$$

„=“ genau dann, wenn $\sum_{k=1}^n a_{jk}a_{\ell k} = 0$ ist für $j \neq \ell$.

Beweis: Ist o.k., wenn $\det A = 0$ ist.

Sei $\det A > 0$ und setze

$$S_j^2 := \sum_{k=1}^n a_{jk}^2.$$

Es ist $S_j > 0$. Setze

$$b_{jk} = \frac{a_{jk}}{x_j}.$$

Dann ist

$$\sum_{j,k=1}^n b_{jk}^2 = n \Rightarrow (\det B)^2 \leq 1$$

$$(\det A)^2 = s_1^2 \cdots s_n^2 (\det B)^2 \leq x_1^2 \cdots x_n^2.$$

Gleichheit ist dabei genau für orthogonales B . Rest als Aufgabe.

9 Kurvenintegrale¹

9.1 Riemann-Stieltjes Integrale

9.1.1 Feste Bezeichnungen, Riemann-Stieltjes-Summe

$[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ist ein Intervall. $Z = \{t_0, t_1, \dots, t_m\}$ ist Zerlegung von $[a, b]$ mit $a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b$. $\tau = \{\tau_1, \dots, \tau_m\}$ ist ein passendes Zwischenpunktsystem mit $t_{j-1} \leq \tau_j \leq t_j$, $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sind Funktionen und

$$\sigma(Z, \tau, f, g) := \sum_{j=1}^m f(\tau_j) \cdot [g(t_j) - g(t_{j-1})]$$

ist *Riemann-Stieltjes-Summe* für f, g .

Bemerkung: Für $g(t) = t$ ist die Riemann-Stieltjes-Summe eine Riemannsche Zwischensumme.

9.1.2 Definition: Riemann-Stieltjes-Integral

f heißt integrierbar bezüglich g und

$$A := \int_a^b f dg$$

heißt *Riemann-Stieltjes-Integral* von f bezüglich g , wenn gilt:
Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, so daß

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - A| < \varepsilon$$

für alle Zerlegungen Z mit $|Z| := \max_{j=1}^m (t_j - t_{j-1}) < \delta$ und alle Zwischenpunktsysteme τ .

9.1.3 Bemerkung

Für $g(t) = t$ ist das Riemann-Stieltjes-Integral gleich dem Riemann-Integral.

9.1.4 Beispiel

Seien $f, g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, f stetig in $t = 0$ und

$$g(t) = \begin{cases} \alpha & \text{in } [-1, 0) \\ \beta & \text{in } [0, 1]. \end{cases}$$

Behauptung:

$$\int_{-1}^1 f dg = f(0) \cdot (\beta - \alpha)$$

---

¹Version 184 vom 13. Februar 2006

Beweis: Sei Z Zerlegung und τ Zwischenpunktsystem. Wähle j so, daß $t_{j-1} < 0 \leq t_j$. Dann ist

$$\sigma(Z, \tau, f, g) = f(\tau_j) \cdot [g(t_j) - g(t_{j-1})] = [\beta - \alpha] \cdot (f(0) + f(\tau_j) - f(0))$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $\delta > 0$ so, daß

$$|f(\tau) - f(0)| < \varepsilon \text{ für } |\tau| < \delta.$$

Für $|Z| < \delta$ gilt dann:

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - (\beta - \alpha) \cdot f(0)| \leq |\beta - \alpha| \cdot \varepsilon.$$

9.1.5 Cauchy Kriterium

$\int_a^b f dg$ existiert genau dann, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt mit

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - \sigma(Z', \tau', f, g)| < \varepsilon \tag{9.1}$$

für alle Z, Z', τ und τ' mit $|Z| < \delta$ und $|Z'| < \delta$.

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “: Wie immer.

„ $\Leftarrow$ “: Wähle Folgen (Z_n) und $(\tau^{(n)})$ so, daß $|Z_n| \rightarrow 0$.

Es ist

$$\sigma_n := \sigma(Z_n, \tau^{(n)}, f, g) \in \mathbb{R}.$$

(σ_n) ist Cauchyfolge in $\mathbb{R}$. Also ist $\sigma_n \rightarrow A \in \mathbb{R}$.

Sei $\varepsilon > 0$ und Z beliebig mit $|Z| < \delta$ und ZPS τ .

Aus (9.1) folgt dann für Z und Z_n mit $|Z_n| < \delta$:

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - \sigma(Z_n, \tau^{(n)}, f, g)| < \varepsilon.$$

Für $n \rightarrow \infty$ ist dann $|\sigma(Z, \tau, f, g) - A| \leq \varepsilon$, also ist $A = \int_a^b f dg$.

9.1.6 Eigenschaften des RS-Integrales

(a) f -Linearität:

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2) dg = \alpha_1 \int_a^b f_1 dg + \alpha_2 \int_a^b f_2 dg$$

(b) g -Linearität:

$$\int_a^b f d(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = \alpha_1 \int_a^b f dg_1 + \alpha_2 \int_a^b f dg_2$$

(c) Existiert

$$\int_a^b f dg,$$

so existiert für $[c, d] \subseteq [a, b]$ auch

$$\int_c^d f dg.$$

(d) Es gilt:

$$\int_a^b f dg = \int_a^c f dg + \int_c^b f dg.$$

Beweis:

(a) ✓

(b) ✓

(c) Sei $\varepsilon > 0$. Wähle dazu $\delta > 0$ so, daß (9.1) aus dem Cauchy Kriterium gilt.

Wähle nun eine Zerlegung Z von $[c, d]$ mit ZPS τ und $|Z| < \delta$.

Ergänze nun Z zur Zerlegung $\tilde{Z}$ von $[a, b]$ mit $|\tilde{Z}| < \delta$.

Ergänze entsprechend τ zum ZPS $\tilde{\tau}$ von $[a, b]$.

Wähle nun Z_1 wie Z , $\tau^{(1)}$ wie τ .

Ergänze Z_1 und $\tau^{(1)}$ genauso wie Z und τ zu $\tilde{Z}_1$ und $\tilde{\tau}^{(1)}$. Dann ist

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - \sigma(Z_1, \tau^{(1)}, f, g)| = |\sigma(\tilde{Z}, \tilde{\tau}, f, g) - \sigma(\tilde{Z}_1, \tilde{\tau}^{(1)}, f, g)| < \varepsilon,$$

d. h. das Cauchy-Kriterium ist für $[c, d]$ erfüllt.

(d) Aufgabe.

9.1.7 Partielle Integration

Zuerst noch einmal für das Riemann-Integral. Es ist

$$\int_a^b f \cdot g' dt = f \cdot g \Big|_a^b - \int_a^b f' \cdot g dt.$$

Für das Riemann-Stieltjes-Integral gilt: Existiert $\int_a^b f dg$, so existiert auch

$$\int_a^b g df = f \cdot g \Big|_a^b - \int_a^b f dg.$$

Beweis: Sei Z Zerlegung und τ ein Zwischenpunktsystem.

$$\begin{aligned} \sigma(Z, \tau, g, f) &= \sum_{j=1}^m g(\tau_j) \cdot [f(t_j) - f(t_{j-1})] = \sum_{j=1}^m g(\tau_j) f(t_j) - \sum_{j=0}^{m-1} g(\tau_{j+1}) f(t_j) \\ &= - \sum_{j=0}^m f(t_j) [g(\tau_{j+1}) - g(\tau_j)] - g(\tau_0) f(t_0) + g(\tau_{m+1}) f(t_m) \\ &= -\sigma(Z', \tau', f, g) + f g \Big|_a^b \end{aligned}$$

Dabei ist $\tau_0 = t_0$ und $\tau_{m+1} = t_m$.

Damit ist $Z' = \{\tau_0, \dots, \tau_{m+1}\}$ Zerlegung und $\tau' = \{t_0, \dots, t_m\}$ ZPS.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $\delta > 0$ so, daß

$$\left| \sigma(\tilde{Z}, \tilde{\tau}, f, g) - \int_a^b f dg \right| < \varepsilon$$

für alle $\tilde{Z}$ mit $|\tilde{Z}| < \delta$ und alle $\tilde{\tau}$ ist.

Sei nun $|Z| < \frac{\delta}{2}$. Dann ist $|Z'| < 2 \cdot \frac{\delta}{2} = \delta$ und damit ist

$$\left| \sigma(Z', \tau', f, g) - \int_a^b f dg \right| < \varepsilon,$$

also ist für $|Z| < \frac{\delta}{2}$

$$\left| \sigma(Z, \tau, g, f) - fg \Big|_a^b + \int_a^b f dg \right| < \varepsilon.$$

Daraus folgt die Behauptung.

9.1.8 Zusammenhang zwischen RS- und R-Integralen

Sind f und g' Riemann-integrierbar, dann ist

$$\int_a^b f dg = \int_a^b f(t) \cdot g'(t) dt.$$

Beweis: Sei Z Zerlegung mit Zwischenpunktsystem τ . Dann ist

$$\begin{aligned} \sigma(Z, \tau, f, g) &= \sum_{j=1}^m f(\tau_j) \cdot \underbrace{[g(t_j) - g(t_{j-1})]}_{\substack{\text{MWS:} \\ =(t_j - t_{j-1})g'(\tilde{\tau}_j)}} \\ &= \sum_{j=1}^m f(\tau_j) g'(\tau_j) (t_j - t_{j-1}) \\ &\quad + \sum_{j=1}^m f(\tau_j) (g'(\tilde{\tau}_j) - g'(\tau_j)) (t_j - t_{j-1}) \\ &= \sigma(Z, \tau, f \cdot g') + \tilde{\sigma} \end{aligned}$$

Sei $\varepsilon > 0$ und $\delta > 0$ so, daß

1. $|\sigma(Z, \tau, f \cdot g') - \int_a^b f(t)g'(t) dt| < \varepsilon$ für $|Z| < \delta$ und alle τ .
2. $|S(Z, g') - s(Z, g')| < \varepsilon$ für $|Z| < \delta$.

f ist beschränkt, d. h. $|f| < M$.

$$\begin{aligned} \left| \sigma(Z, \tau, f, g) - \int_a^b f(t)g'(t) dt \right| &\leq \underbrace{\left| \sigma(Z, \tau, fg') - \int_a^b fg' dt \right|}_{< \varepsilon, |Z| < \delta} + |\tilde{\sigma}| \\ &< \varepsilon + \sum_{j=1}^m M \cdot \left[\sup_{t_{j-1} \leq \tau \leq t_j} g'(\tau) - \inf_{t_{j-1} \leq \tau \leq t_j} g'(\tau) \right] \cdot (t_j - t_{j-1}) \\ &< \varepsilon + M \cdot \varepsilon \text{ für } |Z| < \delta, \text{ alle } \tau. \end{aligned}$$

9.1.9 Satz: Existenz des RS-Integrales

Ist $f \in C([a, b])$ und ist g monoton, dann existiert $\int_a^b f dg$.

Beweis: Für monoton wachsendes g .

Sei $\varepsilon > 0$.

1. Dazu existiert ein $\delta > 0$ mit

$$|f(s) - f(t)| < \varepsilon$$

für $x, t \in [a, b]$, $|s - t| < \delta$ (gleichmäßige Stetigkeit).

2. Sind Z und Z' Zerlegungen mit $Z \subseteq Z'$ und $|Z| < \delta$, so gilt:

$$|\sigma(Z, \tau, f, g) - \sigma(Z', \tau', f, g)| \leq \varepsilon(g(b) - g(a)).$$

Beweis:

Berechne die Beiträge von $[t_{\mu-1}, t_\mu]$ zu den $\sigma(Z, \dots)$ und berechne die Beiträge von $[t_{\mu-1}, t_\mu]$ zu den $\sigma(Z', \dots)$:

$$Z : f(\tau_\mu) \cdot [g(t_\mu) - g(t_{\mu-1})] = \sum_{j=\nu+1}^{\nu+k} f(\tau_\mu) \cdot [g(t'_j) - g(t'_{j-1})]$$

$$Z' : \sum_{j=\nu+1}^{\nu+k} f(\tau'_j) \cdot [g(t'_j) - g(t'_{j-1})]$$

Dann ist für $|\tau_\mu - \tau'_j| < \delta$:

$$\begin{aligned} |\sigma(Z, \tau, f, g) - \sigma(Z', \tau', f, g)| &< \varepsilon \sum_{j=1}^{m'} \underbrace{(g(t'_j) - g(t'_{j-1}))}_{\geq 0} \\ &= \varepsilon \cdot (g(b) - g(a)) \end{aligned}$$

3. Seien nun Z' und Z'' beliebige Zerlegungen mit $|Z'| < \delta$, $|Z''| < \delta$ und Zwischenpunktsystemen τ' und τ .

Setze $Z = Z' \cup Z''$ und $\tau = \tau' \cup \tau''$.

Dann ist $|Z| < \delta$ und

$$\begin{aligned} |\sigma(Z', \tau', f, g) - \sigma(Z'', \tau'', f, g)| &\leq |\sigma(Z') - \sigma(Z)| + |\sigma(Z) - \sigma(Z'')| \\ &\leq 2\varepsilon(g(b) - g(a)) \end{aligned}$$

Das Cauchy Kriterium ist also erfüllt, d. h. das Integral $\int_a^b f dg$ existiert.

9.2 Funktionen von endlicher Variation

9.2.1 Definition: Variation

Sei $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Ist $Z = \{t_0, t_1, \dots, t_m\}$ eine Zerlegung von $[a, b]$, so setzt man

$$\text{var}(Z, g) := \sum_{j=1}^m |g(t_j) - g(t_{j-1})|$$

und

$$V_a^b(g) := \sup\{\text{var}(Z, g) : Z \text{ ist Zerlegung von } [a, b]\}.$$

$V_a^b(g)$ heißt (Total-)Variation von g . Ist $V_a^b(g) < \infty$, so heißt g von *endlicher (beschränkter) Variation*.

9.2.2 Beispiele

(1) Sei g monoton ($\oplus$). Dann ist

$$\begin{aligned} \text{var}(Z, g) &= \sum_{j=1}^m |g(t_j) - g(t_{j-1})| \\ &\stackrel{\oplus}{=} \left| \sum_{j=1}^m g(t_j) - g(t_{j-1}) \right| \\ &= |g(b) - g(a)| \\ \Rightarrow V_a^b(g) &= |g(b) - g(a)|. \end{aligned}$$

(2) Sei $g' \in R([a, b])$. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{var}(Z, g) &= \sum_{j=1}^m \underbrace{|g(t_j) - g(t_{j-1})|}_{=(t_j - t_{j-1})g'(\tau_j)} \\ &\leq S(Z, g') \text{ Obersumme} \\ &\geq s(Z, g') \text{ Untersumme} \\ \Rightarrow V_a^b(g) &= \int_a^b |g'(t)| dt. \end{aligned}$$

(3) Sei

$$g(t) = \begin{cases} t \cos \frac{\pi}{t} & \text{für } 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

in $[a, b] = [0, 1]$. g ist stetig, aber nicht von endlicher Variation.

Wähle folgende Zerlegung Z für $m \in \mathbb{N}$:

$$Z := \left\{ 0, \frac{1}{m}, \dots, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1 \right\}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m |g(t_j) - g(t_{j-1})| &= \left| \frac{1}{m} \cos(\pi m) \right| + \sum_{j=2}^m \frac{1}{j} + \frac{1}{j-1} \\ &> \sum_{j=1}^m \frac{1}{j} \\ &\rightarrow \infty \text{ für } m \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

(4) Aufgabe: Zeige, daß

$$g(t) = \begin{cases} t^2 \cos \frac{\pi}{t} & \text{für } 0 < t \leq 1 \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

von endlicher Variation ist.

9.2.3 Satz

Ist g von endlicher Variation, so ist

$$v(t) = \begin{cases} V_a^t(g) & \text{für } a < t \leq b \\ 0 & \text{für } t = 0 \end{cases}$$

monoton wachsend und dort stetig, wo g stetig ist.

Beweis: Sei $a \leq c < b$. Dann gilt:

$$V_a^b = V_a^c + V_c^b$$

Beweis hierfür:

Seien Z' und Z'' Zerlegungen von $[a, c]$ bzw. $[c, b]$, $Z = Z' \cup Z''$. Es ist dann:

$$V_a^b(g) \geq \text{var}(Z, g) = \text{var}(Z', g|_{[a,c]}) + \text{var}(Z'', g|_{[c,b]}).$$

Also ist $V_a^b \geq V_a^c + \text{var}(Z'', g|_{[c,b]})$ und auch $V_a^b \geq V_a^c + V_c^b$.

Nun die Umkehrung: Z sei Zerlegung von $[a, b]$, $Z_c = Z \cup \{c\}$.

Damit ist ($\oplus$ als Aufgabe):

$$\begin{aligned} \text{var}(Z, g) &\stackrel{\oplus}{\leq} \text{var}(Z_c, g) \\ &= \text{var}(Z', g|_{[a,c]}) + \text{var}(Z'', g|_{[c,b]}) \end{aligned}$$

mit $Z' = Z_c \cap [a, b]$ und $Z'' = Z_c \cap [c, b]$.

Also ist $\text{var}(Z, g) \leq V_a^c(g) + V_c^b(g)$ und damit $V_a^b \leq V_a^c + V_c^b$.

Zusammen ergibt sich die Behauptung.

Monotonie von v : Sei $a \leq s < t \leq b$. Dann ist

$$v(t) = v(s) + \underbrace{V_s^t(g)}_{\geq 0} \geq v(s).$$

Stetigkeit von v : Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert eine Zerlegung Z von $[a, b]$ mit

$$\text{var}(Z, g) > V_a^b(g) - \varepsilon.$$

Sei nun $a < c < d < b$. Setze dann

$$\tilde{Z} = (Z \cap [c, d]) \cup \{c, d\}$$

$$Z_1 = (Z \cap [a, c]) \cup \{c\}$$

$$Z_2 = (Z \cap [d, b]) \cup \{d\}.$$

Dann ist

$$\text{var}(\tilde{Z}, g|_{[c,d]}) > V_c^d(g) - \varepsilon,$$

denn es ist

$$\begin{aligned} V_a^b(g) &< \text{var}(Z, g) + \varepsilon \\ &= \text{var}(Z_1, g) + \text{var}(\tilde{Z}, g) + \text{var}(Z_2, g) + \varepsilon \\ &< V_a^c(g) + \text{var}(\tilde{Z}, g) + V_c^b(g) + \varepsilon \end{aligned}$$

Also ist $V_c^d(g) < \text{var}(\tilde{Z}, g) + \varepsilon$.

Zeige nun: Wenn g in $\tau \in [a, b]$ stetig ist, so ist v rechtsseitig stetig in τ .

(Zeige dann genauso, daß v auch linksseitig stetig ist).

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Wähle Z mit

$$\text{var}(Z, g) > V_a^b(g) - \varepsilon.$$

Wähle $\delta > 0$ so, daß $(\tau, \tau + \delta)$ keinen Teilpunkt von Z enthält.

$\{\tau, t\}$ ist Zerlegung von $[\tau, t]$. Es ist

$$\begin{aligned} |g(t) - g(\tau)| &> V_\tau^t(g) - \varepsilon \\ &= v(t) - v(\tau) - \varepsilon. \end{aligned}$$

Damit ist dann

$$\begin{aligned} 0 &\leq v(t) - v(\tau) \\ &< \underbrace{|g(t) - g(\tau)|}_{< \varepsilon \text{ für } |t-\tau| < \delta'} + \varepsilon. \end{aligned}$$

Also ist

$$|v(t) - v(\tau)| < 2\varepsilon$$

für $\tau < t < \min(\tau + \delta, \tau + \delta')$.

Das heißt, daß v stetig ist.

9.2.4 Zerlegungssatz

g ist genau dann von endlicher Variation, wenn es eine Darstellung

$$g = g_1 - g_2$$

mit monoton wachsenden Funktionen g_1 und g_2 gibt.

Es gilt dann:

$$V_a^b(g) \leq V_a^b(g_1) + V_a^b(g_2).$$

Beweis:

„ $\Leftarrow$ “: Setze $g = g_1 - g_2$. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{var}(Z, g) &\leq \sum_{j=1}^m |g_1(t_j) - g_1(t_{j-1})| + |g_2(t_j) - g_2(t_{j-1})| \\ &\leq \text{var}(Z, g_1) + \text{var}(Z, g_2) \\ &\leq V_a^b(g_1) + V_a^b(g_2) \end{aligned}$$

Daraus folgt dann die Behauptung.

„ $\Rightarrow$ “: Konstruiere g_1 und g_2 wachsend mit $g = g_1 - g_2$ und

$$V_a^b(g) = V_a^b(g_1) + V_a^b(g_2).$$

Es wird definiert:

$$v_\pm(t) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^m (g(t_j) - g(t_{j-1}))^\pm : \{t_0, \dots, t_n\} \text{ bel. Zerl. von } [a, b] \right\}$$

sind die positive bzw. negative Variation.

Es gelten:

$$(1) v_+(t) + v_-(t) = V_a^t(g)$$

$$(2) v_+(t) - v_-(t) = g(t) - g(a), \text{ denn es ist}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^m (g(t_j) - g(t_{j-1}))^+ - \sum_{j=1}^m (g(t_j) - g(t_{j-1}))^- \\ &= \sum_{j=1}^m (g(t_j) - g(t_{j-1})) \\ &= g(b) - g(a). \end{aligned}$$

Es gilt dann:

$$g(t) = \underbrace{(g(a) + v_+(t))}_{:=g_1} - \underbrace{v_-(t)}_{:=g_2}$$

g_1 und g_2 sind monoton wachsend wie V_a^t .

Es ist:

$$\begin{aligned} V_a^b(g_1) &= v_+(b) \\ V_a^b(g_2) &= v_-(b). \end{aligned}$$

Nach Addition gilt:

$$V_a^b(g_1) + V_a^b(g_2) = v_+(b) + v_-(b) = V_a^b(g).$$

9.2.5 Satz

Ist f stetig auf $[a, b]$ und g von endlicher Variation, so existiert $\int_a^b f dg$, und es ist

$$\left| \int_a^b f dg \right| \leq \|f\|_\infty \cdot V_a^b(g).$$

Beweis:

Existenz: Es ist $g = g_1 - g_2$ mit monoton wachsenden g_1 und g_2 . Dann existieren

$$\int_a^b f dg_j \text{ f\"ur } j = 1, 2.$$

Also existiert auch

$$\int_a^b f dg = \int_a^b f dg_1 - \int_a^b f dg_2.$$

Abschätzung: Es ist

$$\begin{aligned} |\sigma(Z, \tau, f, g)| &= \left| \sum_{j=1}^m f(\tau_j)(g(t_j) - g(t_{j-1})) \right| \\ &\leq \|f\|_\infty \cdot \text{var}(Z, g) \leq \|f\|_\infty \cdot V_a^b(g). \end{aligned}$$

Also ist auch

$$\left| \int_a^b f dg \right| \leq \|f\|_\infty \cdot V_a^b(g).$$

9.2.6 Folgerung aus dem Zerlegungssatz

Man kann g_1 und g_2 so wählen, daß sie überall dort stetig sind, wo auch g stetig ist. Ist insbesondere $g \in C([a, b])$, so kann man $g_1, g_2 \in C([a, b])$ wählen.

Beweis: Wie bei $v(t)$ zeige:

v_+ und f_- sind dort stetig, wo auch g stetig ist. Setze dann $g_1 = v_+ + g(a)$ und $g_2 = v_-$.

9.2.7 Mittelwertsatz

Sei $f: [a, b] \rightarrow [m, M]$ und $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sei monoton. Außerdem existiere $\int_a^b f dg$.

(a) Dann existiert ein $\mu \in [m, M]$ mit

$$\int_a^b f dg = \mu \cdot (g(b) - g(a)).$$

(b) Ist $f \in C([a, b])$, so gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$\int_a^b f dg = f(\xi) \cdot (g(b) - g(a)).$$

Beweis: Als Aufgabe (Riemann-Integral: $g(t) = t$).

9.2.8 Beispiel zum RS-Integral

Sei $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, stetig differenzierbar mit $f \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$.

Dann ist

$$\begin{aligned} L &= \int_{\delta}^T f(t) d\left(\underbrace{t - [t] - \frac{1}{2}}_{=g(t)} \right) \\ &\quad \text{endliche Variation} \\ &= f(t) \cdot g(t) \Big|_{\delta}^T - \int_{\delta}^T f'(t) \cdot \left(t - [t] - \frac{1}{2} \right) dt \\ L &= \int_{\delta}^T f(t) dt - \int_{\delta}^T f(t) d\left([t] - \frac{1}{2} \right) \\ &= \int_{\delta}^T f(t) dt - \sum_{k=1}^{[T]} f(k). \end{aligned}$$

Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{[T]} f(k) &= \int_{\delta}^T f(t) dt + f(T)g(T) - f(\delta)g(\delta) - \int_{\delta}^T f'(t) \left(t - [t] - \frac{1}{2} \right) dt \\ &\xrightarrow{\delta \rightarrow 1} \int_1^T f(t) dt - \int_1^T f'(t) \left(t - [t] - \frac{1}{2} \right) dt + f(T)g(T) - \frac{1}{2}f(1). \end{aligned}$$

Für $T \rightarrow \infty$ gilt dann:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \int_1^{\infty} f(t) dt - \frac{1}{2}f(1) + \int_1^{\infty} f'(t) \left(t - [t] - \frac{1}{2} \right) dt,$$

falls $\int_1^{\infty} f(t) dt$ existiert. Also ist

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \int_1^{\infty} f(t) dt - \frac{1}{2}f(1) - R$$

mit

$$\begin{aligned} |R| &= \left| \int_1^{\infty} f'(t) \left(t - [t] - \frac{1}{2} \right) dt \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_1^{\infty} |f'(t)| dt. \end{aligned}$$

9.3 Wege und Weglängen

9.3.1 Definition: Weg

Eine stetige Abbildung $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *Weg*. $\gamma(a)$ ist der *Anfangspunkt* und $\gamma(b)$ ist der *Endpunkt*.

$$|\gamma| := \{\gamma(t) : a \leq t \leq b\}$$

ist der *Träger* von γ .

9.3.2 Definition: rektifizierbarer Weg, Länge

Ein Weg γ heißt *rektifizierbar*, wenn

$$L(\gamma) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| : \{t_0 < t_1 < \dots < t_m\} \text{ bel. Zerl. von } [a, b] \right\}$$

endlich ist. $L(\gamma)$ heißt *Länge* von γ .

9.3.3 Satz

γ ist genau dann rektifizierbar, wenn die $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ von endlicher Variation sind.

Beweis: Sei $Z = \{t_0, \dots, t_m\}$ Zerlegung.

$$\sum_{j=1}^m |\gamma_{\varrho}(t_j) - \gamma_{\varrho}(t_{j-1})| \leq \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| \leq \sum_{j=1}^m \sum_{\nu=1}^n |\gamma_{\nu}(t_j) - \gamma_{\nu}(t_{j-1})|$$

für $\varrho = 1, \dots, n$.

Es gilt dann:

$$\text{var}(Z, \gamma_{\varrho}) \leq \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| \leq \sum_{\nu=1}^n \text{var}(Z, \gamma_{\nu})$$

für $\varrho = 1, \dots, n$. Also ist

$$V_a^b(\gamma_\varrho) \leq L(\gamma) \leq \sum_{\nu=1}^n V_a^b(\gamma_\nu).$$

9.3.4 Satz

(a) Ist γ rektifizierbar, so ist die *Bogenlänge*

$$s(t) := L(\gamma|_{[a,t]})$$

stetig und monoton wachsend und

$$L(\gamma) = \int_a^b 1 \, ds \quad (\text{Riemann-Stieltjes-Integral}).$$

(b) Ist γ stetig differenzierbar, so gilt

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau.$$

Insbesondere ist

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau.$$

Beweis:

(a) Sei $a \leq t' < t \leq b$. Dann ist

$$\begin{aligned} s(t) - s(t') &= L(\gamma|_{[t',t]}) \geq 0 \Rightarrow s \nearrow \\ 0 \leq s(t) - s(t') &\leq \sum_{\nu=1}^n V_{t'}^t(\gamma_\nu) \rightarrow 0 \text{ für } t - t' \rightarrow 0. \end{aligned}$$

(b) Ist γ' stetig, so sind $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ von endlicher Variation, d. h. γ ist rektifizierbar. Sei nun $a \leq t' < t \leq b$:

(a) $s(t) - s(t') \geq \|\gamma(t) - \gamma(t')\|$.
Sei Z Zerlegung von $[t', t]$, $Z = \{t_0, \dots, t_m\}$.

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| &= \sum_{j=1}^m \left\| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(\tau) \, d\tau \right\| \\ &\leq \sum_{j=1}^m \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau \\ &= \int_{t'}^t \|\gamma'(\tau)\| \, d\tau. \end{aligned}$$

$$(b) \quad s(t) - s(t') \leq \int_{t'}^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau.$$

Also ist

$$\left\| \frac{\gamma(t) - \gamma(t')}{t - t'} \right\| \leq \frac{s(t) - s(t')}{t - t'} < \frac{1}{t - t'} \int_{t'}^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau.$$

Für $t' \rightarrow t$ gilt dann:

$$\begin{aligned} \|\gamma'(t)\| &\leq s'(t) \leq \|\gamma'(t)\| \\ \Rightarrow s'(t) &= \|\gamma'(t)\|, \text{ also } s \in C^1([a, b]). \end{aligned}$$

Deshalb gilt:

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$$

und

$$L(\gamma) = s(b) = \int_a^b \|\gamma'(\tau)\|, d\tau.$$

9.3.5 Beispiele

(1) Kreislinie im $\mathbb{R}^2$:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 + r \cos t \\ y_0 + r \sin t \end{pmatrix} \text{ für } 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\gamma' = \begin{pmatrix} -r \sin t \\ r \cos t \end{pmatrix}$$

$$\|\gamma'\| = r$$

$$L = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r$$

(2) Asteroide im $\mathbb{R}^2$:

Es ist für $0 \leq t \leq 2\pi$

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{pmatrix}$$

$$\|\gamma'\|^2 = (3 \cos^2(t) \cdot \sin(t))^2 + (3 \sin^2(t) \cdot \cos t)^2 = 9 \cos^2 t \sin^2 t$$

$$\|\gamma'(t)\| = 3 |\cos t \sin t| = \frac{3}{2} |\sin 2t| = s'(t)$$

$$L(\gamma) = 4 \cdot \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2\tau d\tau = \frac{6}{2} (-\cos 2\tau) \Big|_0^{\pi/2} = 6$$

(3) Schraubenlinie im $\mathbb{R}^3$:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} r \cos t \\ r \sin t \\ ht \end{pmatrix}, \text{ mit } r > 0, h > 0, 0 \leq t \leq \alpha$$

$$\|\gamma'\| = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$L(\gamma) = \sqrt{r^2 + h^2} \cdot \alpha$$

(4) Zykloide im $\mathbb{R}^2$:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t - \sin t \\ 1 - \cos t \end{pmatrix} \text{ für } 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\|\gamma'\|^2 = (1 - \cos t)^2 + \sin^2 t = 1 - 2 \cos t + 1 = 2(1 - \cos t) = 4 \sin^2 \frac{t}{2}$$

Also ist

$$\|\gamma'\| = 2 \sin \frac{t}{2} \text{ für } 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$L(\gamma) = 2 \cdot \left(2 \left(-\cos \frac{t}{2} \right) \right) \Big|_0^{2\pi} = 8$$

9.3.6 Definition: Äquivalenz von 2 Wegen

Zwei Wege $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißen äquivalent, wenn es eine stetige, monoton wachsende Bijektion $h: [a, b] \rightarrow [c, d]$ mit $\alpha(t) = \beta(h(t))$, $a \leq t \leq b$ gibt. Kurz: $\alpha \sim \beta$.

9.3.7 Beispiel

$$\alpha: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \qquad \alpha(t) = \begin{pmatrix} t \\ |t| \end{pmatrix}$$

$$\beta: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \qquad \beta(t) = \begin{pmatrix} t \cdot |t| \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

α und β haben den gleichen Träger, gleichen Anfangs- und Endpunkt und die gleiche Länge. Setze hier

$$h(t) = \begin{cases} -\sqrt{|t|} & -1 \leq t \leq 0 \\ \sqrt{t} & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

9.3.8 Satz und Definition: Kurve, Parameterdarstellung

$\sim$ ist eine Äquivalenzrelation. Jede Äquivalenzklasse heißt *Kurve*. Jeder Weg α einer Äquivalenzklasse heißt *Parameterdarstellung*. h heißt auch *Parameterwechsel*.

Beweis: Aufgabe.

9.3.9 Satz: Eigenschaften äquivalenter Wege

Äquivalente Wege haben

- (a) denselben Anfangspunkt
- (b) denselben Endpunkt
- (c) denselben Träger
- (d) dieselbe Länge

Beweis:

- (a) Aufgabe
- (b) Aufgabe
- (c) Aufgabe
- (d) Sei $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\alpha(t) = \beta(h(t))$.
 $Z = \{t_0, \dots, t_n\}$ sei beliebige Zerlegung von $[a, b]$.
 Setze $\tau_j = h(t_j)$.
 Dann ist $Z' = (\tau_0, \dots, \tau_m)$ Zerlegung von $[c, d]$.

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m \|\alpha(t_j) - \alpha(t_{j-1})\| &= \sum_{j=1}^m \|\beta(\tau_j) - \beta(\tau_{j-1})\| \\ &\leq L(\beta) \end{aligned}$$

Also ist $L(\alpha) \leq L(\beta)$, da Z beliebig gewählt wurde.
 Umgekehrt gilt auch $L(\beta) \leq L(\alpha)$. Benutze dafür h^{-1} .

9.3.10 Umorientierung von Wegen

Sei $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Dann ist $\gamma := -\alpha$ der Weg

$$\gamma(t) = \alpha(-t) \text{ für } -b \leq t \leq -a.$$

Aufgabe: Zeige: $\alpha \sim \beta \Rightarrow -\alpha \sim -\beta$.

9.3.11 Aneinanderhängen von Wegen

Seien $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ Wege mit $\alpha(b) = \beta(c)$. Dann ist der Weg $\gamma := \alpha + \beta$ folgendermaßen erklärt:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \alpha(t) & a \leq t \leq b \\ \beta(c+t-b) & b \leq t \leq b+d-c \end{cases}$$

Aufgabe: Zeige: $\alpha \sim \alpha_1, \beta \sim \beta_1 \Rightarrow \alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

9.3.12 Definition: Jordanweg/-bogen

Ist $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ injektiv, so heißt α *Jordanbogen*. Umgangssprachlich gesagt: Es treten keine Schnittpunkte auf.

9.3.13 Satz: Äquivalenz von Jordanbögen

Sind α und β Jordanbögen mit $|\alpha| = |\beta|$ und gleichem Anfangspunkt, so sind α und β äquivalent.

Beweis: $|\alpha| = |\beta| \subseteq \mathbb{R}^n$ ist kompakt.

$\beta: [c, d] \rightarrow |\beta|$ ist stetig, bijektiv.

Damit ist $\beta^{-1}: |\beta| \rightarrow [c, d]$ stetig und bijektiv.

$h(t) = \beta^{-1}(\alpha(t))$ ist stetig, bijektiv: $[a, b] \rightarrow [c, d]$.

h ist insbesondere monoton. h ist sogar monoton wachsend,

da $h(a) = \beta^{-1}(\alpha(a)) = c$ und $h(b) = \beta^{-1}(\alpha(b)) = d$ und $\alpha(t) = \beta(h(t))$

Daraus folgt die Äquivalenz.

9.3.14 Definition: geschlossene Kurve, Jordankurve

$\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *geschlossen*, wenn $\alpha(a) = \alpha(b)$ ist. Ein geschlossener Weg heißt *Jordankurve*, wenn $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ injektiv ist, aber $\alpha(a) = \alpha(b)$ ist.

9.3.15 Jordanscher Kurvensatz

Ist γ eine Jordankurve im $\mathbb{R}^2$, so besteht $\mathbb{R}^2 \setminus |\gamma|$ aus zwei Gebieten G_i (innen) und G_a (außen). Dabei ist $G_i \cap G_a = \emptyset$ und $\partial G_i = \partial G_a = |\gamma|$.

Ohne Beweis.

9.3.16 Tangente an eine Kurve

Sei $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein Weg, $\gamma'(t_0)$ existiere und sei ungleich 0. Dann ist

$$\gamma(t) = \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|)$$

und

$$\tau \mapsto \gamma(t_0) + \gamma'(t_0)\tau \text{ für } \tau \in \mathbb{R}$$

ist die Parameterdarstellung einer Geraden, der Tangente von γ im Punkt $\gamma(t_0)$.

9.3.17 Definition: C^1 -Kurve, glatte Kurve

$\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt C^1 bzw. glatt, wenn $\gamma \in C^1([a, b])$ bzw. wenn $\gamma \in C^1([a, b])$ und überall $\gamma'(t) \neq 0$ ist.

9.3.18 Beispiel

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t|t| \\ t^2 \end{pmatrix} \text{ für } -1 \leq t \leq 1.$$

γ ist ein C^1 -Weg, aber nicht glatt, da $\gamma'(0) = 0$ ist.

9.3.19 Definition: stückweise C^1 /glatt

γ heißt stückweise C^1 bzw. stückweise glatt, wenn es endlich viele C^1 -Wege bzw. glatte Wege $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ gibt mit $\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_n$.

9.3.20 Satz

Sei $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ rektifizierbar und γ sei auf keinem Teilintervall konstant. Dann ist $s(t) = L(\gamma|_{[a,t]})$ streng monoton wachsend.

Beweis: Zeige: $s(t) < s(t')$ für $t < t'$:

Es ex. $t'' \in (t, t')$ mit $\gamma(t'') \neq \gamma(t)$ oder $\gamma(t'') \neq \gamma(t')$:

$$s(t') - s(t) \geq \|\gamma(t) - \gamma(t'')\| + \|\gamma(t'') - \gamma(t')\| > 0.$$

Beachte: $s: [a, b] \rightarrow [0, L(\gamma)]$ ist eine Bijektion, stetig und streng wachsend. Die Umkehrfunktion $[0, L(\gamma)] \rightarrow [a, b]$ heie $t = t(s)$.

9.3.21 Parametrisierung nach der Bogenlnge

Die Parameterdarstellung

$$\tilde{\gamma}(s) := \gamma(t(s))$$

heißt Parameterdarstellung nach der Bogenlnge. Sie ist quivalent zu γ . Jeder Abschnitt von $\tilde{\gamma}$ hat die gleiche Lnge wie das entsprechende Definitionsintervall von $\tilde{\gamma}$.

9.3.22 Satz

Ist $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ glatt, so existiert die PD $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$ nach der Bogenlnge und es gilt:

$$\|\tilde{\gamma}'(s)\| = 1.$$

Beachte: Es ist $s'(t) = \|\gamma'(t)\|$.

Beweis:

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$$

$s \in C^1([a, b])$ (frherer Satz).

$$s'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0,$$

wegen der Glattheit von γ .

$t = t(s)$ ist dann ebenfalls C^1 , also auch

$$\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s)).$$

Es gilt:

$$\|\tilde{\gamma}'(s)\| = \|\gamma'(t(s))\| t'(s) = \|\gamma'(t(s))\| \frac{1}{s'(t)} \Big|_{t=t(s)} = 1$$

9.4 Kurvenintegral**9.4.1 Definition**

Sei $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi: |\gamma| \rightarrow \mathbb{R}$ bzw. $f: |\gamma| \rightarrow \mathbb{R}^n$. Dann setzt man

(a)

$$\int_{\gamma} \varphi(x) ds := \int_a^b \varphi(\gamma(t)) ds(t)$$

mit der Bogenlänge $s(t)$. „Integral nach der Bogenlänge“.

(b)

$$\int_{\gamma} \varphi(x) dx_j := \int_a^b \varphi(\gamma(t)) d\gamma_j(t)$$

für $j = 1, \dots, n$.

(c)

$$\int_{\gamma} f(x) \cdot dx := \sum_{j=1}^n \int_{\gamma} f_j(x) dx_j = \sum_{j=1}^n \int_a^b f_j(\gamma(t)) d\gamma_j(t)$$

„Kurvenintegral“

Dies ist, falls die rechten Seiten als RS-Integrale existieren. Die Existenz ist gesichert, wenn φ bzw. f stetig ist und γ rektifizierbar ist.

9.4.2 Bemerkungen

(a) Diese Kurvenintegrale hängen nur von der Äquivalenzklasse von γ ab.

Beweis: Sei $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\alpha: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\gamma(t) = \alpha(h(t))$ und $h: [a, b] \rightarrow [c, d]$ bijektiv, stetig, streng wachsend.

Zeige:

$$\int_{\gamma} \varphi(x) dx_j \stackrel{!}{=} \int_{\alpha} \varphi(x) dx_j.$$

Sei $Z = \{t_0, \dots, t_m\}$ Zerlegung von $[a, b]$

und $Z' = \{t'_0, \dots, t'_m\}$ Zerlegung von $[c, d]$ mit $t'_k = h(t_k)$.

Es gilt dann:

$$\begin{aligned} \sigma(Z, \{t_1, \dots, t_m\}, \varphi \circ \gamma, \gamma_j) &= \sum_{k=1}^m \varphi(\gamma(t_k)) (\gamma_j(t_k) - \gamma_j(t_{k-1})) \\ &= \sum_{k=1}^m \varphi(\alpha(h(t_k))) (\alpha_j(h(t_k)) - \alpha_j(h(t_{k-1}))) \\ &= \sum_{k=1}^m \varphi(\alpha(t'_k)) (\alpha_j(t'_k) - \alpha_j(t'_{k-1})) \\ &= \sigma(Z', \{t'_1, \dots, t'_m\}, \varphi \circ \alpha, \alpha_j) \end{aligned}$$

Daraus folgt die Gleichheit der Summen und damit die Gleichheit der Integrale.

(b) Ist γ eine C^1 -Kurve, so ist

$$\int_{\gamma} \varphi(x) ds = \int_a^b \varphi(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

$$\int_{\gamma} \varphi(x) dx_j = \int_a^b \varphi(\gamma(t)) \gamma'_j(t) dt$$

$$j = 1, \dots, n$$

$$\int_{\gamma} f(x) \cdot dx = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

(c) Physikalische Interpretation (im $\mathbb{R}^3$):

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^3$ ein Gebiet und $K: G \rightarrow \mathbb{R}^3$ stetig.

K ist ein „Kraftfeld“.

Ist nun $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ ein Weg, dann ist

$$-m \int_{\gamma} K(x) dx$$

die Arbeit, die benötigt wird, um einen Massepunkt mit der Masse m gegen dieses Kraftfeld von $\gamma(a)$ nach $\gamma(b)$ zu bewegen.

(d) Geometrische Interpretation von (a):

Sei $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Dann ist $\int_{\gamma} \varphi(x) ds$ die Mantelfläche, die durch φ und γ im $\mathbb{R}^3$ aufgespannt wird.

9.4.3 Beispiel im $\mathbb{R}^2$

Sei $f(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$.

Berechne das Wegintegral von $(0, 0)$ nach $(1, 1)$ über verschiedene Wege

1. Sei

$$\gamma_1(t) = \begin{cases} \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} & 0 \leq t \leq 1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ t-1 \end{pmatrix} & 1 < t \leq 2 \end{cases}.$$

Es ist dann

$$\gamma'_1(t) = \begin{cases} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & 0 \leq t \leq 1 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} & 1 < t \leq 2 \end{cases}.$$

$$\int_{\gamma_1} f(x, y) d(x, y) = \int_0^1 (-0 \cdot 1 + t \cdot 0) dt + \int_1^2 (-(t-1) \cdot 0 + 1 \cdot 1) dt = 1$$

2. Sei

$$\gamma_2(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \text{ für } 0 \leq t \leq 1.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \gamma_2'(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \int_{\gamma_2} f(x, y) d(x, y) &= \int_0^1 (-t \cdot 1 + t \cdot 1) dt = 0 \end{aligned}$$

3. Sei

$$\gamma_3(t) = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} & 0 \leq t \leq 1 \\ \begin{pmatrix} t-1 \\ 1 \end{pmatrix} & 1 < t \leq 2 \end{cases}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \gamma_3'(t) &= \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} & 0 \leq t \leq 1 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & 1 < t \leq 2 \end{cases} \\ \int_{\gamma_3} f(x, y) d(x, y) &= -1 \end{aligned}$$

9.4.4 Eigenschaften der Kurvenintegrale

(a) Additivität:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (\varphi(x) + \psi(x)) ds &= \int_{\gamma} \varphi(x) ds + \int_{\gamma} \psi(x) ds \\ \int_{\gamma} (f(x) + g(x)) \cdot dx &= \int_{\gamma} f(x) \cdot dx + \int_{\gamma} g(x) \cdot dx \end{aligned}$$

(b) Homogenität ($\lambda \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \lambda \varphi(x) ds &= \lambda \int_{\gamma} \varphi(x) ds \\ \int_{\gamma} \lambda f(x) \cdot dx &= \lambda \int_{\gamma} f(x) \cdot dx \end{aligned}$$

(c) Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(x) \cdot dx \right| &\leq \int_{\gamma} \|f(x)\| \cdot dx \\ &\leq \sup_{x \in |\gamma|} \|f(x)\| \cdot L(\gamma) \end{aligned}$$

(d) Aneinanderhängen:

$$\int_{\gamma_1 + \dots + \gamma_m} f(x) dx = \sum_{j=1}^m \int_{\gamma_j} f(x) dx$$

$$\int_{\gamma_1 + \dots + \gamma_m} \varphi(x) ds = \sum_{j=1}^m \int_{\gamma_j} \varphi(x) ds$$

(e)

$$\int_{-\gamma} f(x) \cdot dx = - \int_{\gamma} f(x) \cdot dx$$

$$\int_{-\gamma} \varphi(x) ds = \int_{\gamma} \varphi(x) ds$$

Beweis:

(a) ✓

(b) ✓

(c) Falls γ eine C^1 -Kurve ist:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(x) \cdot dx \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)| dt \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \int_a^b \|f(\gamma(t))\| \cdot \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_{\gamma} \|f(x)\| \cdot ds \\ &\leq \sup_{x \in |\gamma|} \|f(x)\| \cdot \int_{\gamma} ds \\ &= \sup \|f(x)\| \cdot L(\gamma) \end{aligned}$$

(d) ✓

(e) Für C^1 -Kurven:

Sei $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha := -\gamma$, d. h. $\alpha(t) = \gamma(-t)$ für $-b \leq t \leq -a$.

$$\begin{aligned} \int_{-\gamma} f(x) \cdot dx &= \int_{-b}^{-a} f(\gamma(-t)) \cdot (-\gamma'(-t)) dt \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{Substitution} \\ \tau = -t \\ d\tau = -dt \end{array} \right| \\ &= \int_a^b f(\gamma(\tau)) \cdot \gamma'(\tau) d\tau \\ &= - \int_a^b f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau) d\tau \\ &= - \int_{\gamma} f(x) \cdot dx \end{aligned}$$

Für das Integral nach der Bogenlänge gilt:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \varphi(x) ds &= \int_{-b}^{-a} \varphi(\gamma(-t)) \|\gamma'(-t)\| dt \\ &= - \int_a^b \varphi(\gamma(\tau)) \cdot \|\gamma'(\tau)\| d\tau \\ &= \int_{\gamma} \varphi(x) ds \end{aligned}$$

9.5 Kurvenintegrale und Stammfunktionen

9.5.1 Definition: Vektorfeld, Potential

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann nennt man f auch *Vektorfeld*. f heißt *Gradientenfeld*, wenn eine Funktion $F \in C^1(D)$ existiert mit $\text{grad} F = F' = f$. F heißt auch *Stammfunktion*, $-F = U$ heißt auch *Potential* von f .

9.5.2 Bemerkung

Für $n = 1$ und $D = (a, b)$ ist jedes Vektorfeld auch ein Gradientenfeld (Hauptsatz):

$$F(x) := \int_c^x f(t) dt, \quad F' = f$$

9.5.3 Beispiel

Sei $n = 3$.

Betrachte einen Massepunkt M in $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

und einen Massepunkt m in $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

Gravitationsfeld (mit Gravitationskonstante γ):

$$-\gamma \cdot m \cdot M \cdot \frac{x}{\|x\|^3}$$

Gravitationspotential (für $x \neq 0$):

$$U = -\gamma \cdot m \cdot M \cdot \frac{1}{\|x\|}$$

$$U_{x_i} = -\gamma m M \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\sum_{j=1}^n x_j^2\right)^{-3/2} \cdot 2x_i = \gamma m M \frac{x_i}{\|x\|^3}$$

9.5.4 Satz

Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ein Vektorfeld. Dann sind äquivalent:

- (a) f ist ein Gradientenfeld, d. h. f besitzt eine Stammfunktion.
- (b) $\int_{\gamma} f(x) \cdot dx$ ist nur abhängig von Anfangs- und Endpunkt von γ .
- (c) $\int_{\gamma} f(x) dx = 0$ für geschlossene Kurven.

In (b) und (c) ist $\gamma: [a, b] \rightarrow D$, (stückweise) stetig differenzierbar.

Beweis:

(a) $\Rightarrow$ (c): Sei $F' = f$ und γ sei C^1 . Dann ist

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(x) \cdot dx &= \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b F'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= F(\gamma(t)) \Big|_a^b = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0 \end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow$ (a): Sei $\xi \in D$ fest.

Für $x \in D$ sei γ_x ein beliebiger Weg von ξ nach x , $\gamma_x \in C^1$.

$$F(x) = \int_{\gamma_x} f(y) \cdot dy$$

ist unabhängig von γ_x . Außerdem ist

$$F(x+h) - F(x) = \int_s f(y) \cdot dy.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle δ dazu so, daß $K(x, \delta) \subseteq D$ und $\|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$ für alle $y \in K(x, \delta)$ ist.

$$\begin{aligned} |F(x+h) - F(x) - h \cdot f(x)| &= \left| \int_s (f(y) - f(x)) dy \right| \\ &\leq \int_s \varepsilon \cdot ds = \varepsilon \cdot \|h\| \end{aligned}$$

Also ist $F' = f$.

(c) ⇒ (b): Seien γ_1 und γ_2 Wege in D von α nach β .

$\gamma_1 - \gamma_2 = \gamma$ ist geschlossen. Damit ist

$$0 = \int_{\gamma} f(x) dx = \int_{\gamma_1} f(x) dx - \int_{\gamma_2} f(x) dx.$$

9.5.5 Bemerkungen

(1) Eine Stammfunktion ist bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt, denn sind F und F_1 Stammfunktionen, so ist $(F - F_1)' = 0$, also ist $F - F_1$ konstant.

(2) $f(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$ hat keine Stammfunktion, denn:

(3) Ist $f \in C^1(D)$ ein Gradientenfeld, so gilt

$$\frac{\partial f_{\mu}}{\partial x_{\nu}} = \frac{\partial f_{\nu}}{\partial x_{\mu}} \tag{9.2}$$

für $\mu, \nu = 1, \dots, n$.

(9.2) ist notwendig für Stammfunktionen.

Beweis: Sei $F' = f$ und $f_{\nu} = \frac{\partial F}{\partial x_{\nu}}$. Dann ist

$$\frac{\partial f_{\nu}}{\partial x_{\mu}} = \frac{\partial^2 F}{\partial x_{\mu} \partial x_{\nu}} = \frac{\partial^2 F}{\partial x_{\nu} \partial x_{\mu}} = \frac{\partial f_{\mu}}{\partial x_{\nu}}.$$

(4) Sei

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) &= -\frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{-y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) &= -\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Es liegt Gleichheit vor, aber f ist kein Gradientenfeld im $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Setze $\gamma(t) = r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$ für $0 \leq t \leq 2\pi$. Damit ist

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(x, y) d(x, y) &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{r^2} (-r \sin t, r \cos t) \cdot r(-\sin t, \cos t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t) + (\cos^2 t) dt = 2\pi \neq 0 \end{aligned}$$

9.5.6 Lemma von Poincaré

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ein sternförmiges Gebiet und $f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$ erfülle die Gleichung (9.2). Dann besitzt f eine Stammfunktion.

Beweis: OBdA sei $\xi = 0$ und D sei sternförmig bzgl. ξ . Setze

$$F(x) := \int_{s_x} f(y) \cdot dy.$$

Dabei ist $s_x: [0, 1] \rightarrow D$ mit $s_x(t) = tx$. Damit ist

$$F(x) = \int_0^1 f(tx) \cdot x dt = \sum_{\nu=1}^n x_\nu \int_0^1 f_\nu(tx) dt.$$

Ist $F \in C^1(D)$? Dies wird später gezeigt.

Ist $F' = f$. Zeige dies jetzt: Es ist

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x_\mu} &= \int_0^1 f_\mu(tx) dt + \sum_{\nu=1}^n x_\nu \frac{\partial}{\partial x_\mu} \int_0^1 f_\nu(tx) dt \\ &\stackrel{\odot}{=} \int_0^1 f_\mu(tx) dt + \sum_{\nu=1}^n x_\nu \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_\mu} f_\nu(tx) dt \end{aligned}$$

Dabei wird $\odot$ später gezeigt.

Mit

$$\int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_\mu} f_\nu(tx) dt = \int_0^1 t \frac{\partial f_\nu}{\partial x_\mu}(tx) dx = \int_0^1 t \frac{\partial f_\mu}{\partial x_\nu}(tx) dx$$

gilt dann:

$$\frac{\partial F}{\partial x_\mu} = \int_0^1 \left(f_\mu(tx) + \sum_{\nu=1}^n tx_\nu \frac{\partial f_\mu}{\partial x_\nu}(tx) \right) dt.$$

Mit

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [t f_\mu(tx)] &= f_\mu(tx) + t \frac{\partial}{\partial t} (f_\mu(tx_1, \dots, tx_n)) \\ &= f_\mu(tx) = t \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial f_\mu}{\partial x_\nu}(tx) x_\nu \end{aligned}$$

folgt dann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x_\mu} &= \int_0^1 \frac{d}{dt} [t \cdot f_\mu(tx)] dt \\ &= t f_\mu(tx) \Big|_0^1 = f_\mu(x). \end{aligned}$$

Zeige nun, daß $\odot$ gilt, d. h. gilt

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} \int_0^1 f_\nu(tx) dt \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_\mu} [f_\nu(tx)] dt = \int_0^1 t \frac{\partial f_\nu}{\partial x_\mu}(tx) dt$$

Setze $\varphi(s, t) := f_\nu(tx_1, \dots, tx_{\mu-1}, ts, tx_{\mu+1}, \dots, tx_n)$.

Gilt dann:

$$\frac{\partial}{\partial s} \int_0^1 \varphi(s, t) dt \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{\partial}{\partial s} \varphi(s, t) dt$$

9.5.7 Hilfssatz

Sei $\varphi: (a, b) \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi_s: (a, b) \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist

$$\Phi(s) = \int_0^1 \varphi(s, t) dt$$

stetig differenzierbar in (a, b) und es ist

$$\Phi'(s) = \int_0^1 \varphi_s(s, t) dt.$$

Beweis: Sei $s \in (a, b)$ fest.

φ_s ist gleichmäßig stetig auf dem kompakten Rechteck der Form $[s - \delta, s + \delta] \times [0, 1]$.

Sei $\varepsilon > 0$. Dazu existiert ein $\delta > 0$, $\delta \leq \sigma$ mit

$$|\varphi_s(s, t) - \varphi_s(u, t)| < \varepsilon \text{ für } |s - u| < \delta, 0 \leq t \leq 1.$$

Sei nun $0 < |h| < \delta$. Dann ist

$$\begin{aligned} \left| \frac{\Phi(s+h) - \Phi(s)}{h} - \int_0^1 \varphi_s(s, t) dt \right| &= \left| \int_0^1 \left[\underbrace{\frac{\varphi(s+h, t) - \varphi(s, t)}{h}}_{\substack{= \varphi_s(s+\theta \cdot h, t) \\ \text{mit } 0 < \theta = \theta(h, t) < 1}} - \varphi_s(s, t) \right] dt \right| \\ &\leq \int_0^1 \underbrace{|\varphi_s(s + \theta \cdot h, t) - \varphi_s(s, t)|}_{< \varepsilon} dt \\ &< \varepsilon \checkmark \end{aligned}$$

9.5.8 Praktische Berechnung einer Stammfunktion

Gesucht ist Stammfunktion für

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, f \in C^1.$$

1. Prüfe nach, ob

$$\frac{\partial f_\nu}{\partial x_\mu} = \frac{\partial f_\mu}{\partial x_\nu}$$

ist.

2. Halte $x_2, \dots, x_n$ fest. Suche dann eine Stammfunktion F bezüglich x_1 mit Integrationskonstante $C(x_2, \dots, x_n)$.

Es muß dann gelten:

$$\frac{\partial}{\partial x_2}(F(x_1, x_2, \dots, x_n) + C(x_2, \dots, x_n)) = F_{x_2} + C_{x_2} \stackrel{!}{=} f_2.$$

Wiederhole dieses dann $(n - 1)$ -mal.

9.5.9 Beispiele

1. Sei $n = 2$ und

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

f hat keine Stammfunktion in $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, erfüllt aber die Gleichung (9.2).

Also existiert eine Stammfunktion in jedem Sterngebiet $D \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Nehme z. B. $\{(x, y) : y > 0\}$.

Berechnung der Stammfunktion F :

$$F_x \stackrel{!}{=} \frac{-y}{x^2 + y^2}.$$

Also ist

$$\begin{aligned} F &= \int \frac{-y}{x^2 + y^2} dx \\ &= \left. \begin{array}{l} \text{Subst.:} \\ x = yt \\ dx = y dt \end{array} \right| \\ &= \int -\frac{1}{t^2 + 1} dt = -\arctan \frac{x}{y} + C(y). \end{aligned}$$

Es muß weiter gelten:

$$\begin{aligned} \frac{x}{x^2 + y^2} \stackrel{!}{=} F_y &= -\frac{\partial}{\partial y} \left(\arctan \frac{x}{y} \right) + C'(y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\arctan \frac{x}{y} \right) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{-x}{y^2} = \frac{-x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Also ist $C'(y) = 0$ und damit

$$F(x, y) = -\arctan \frac{x}{y} + c.$$

2. Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ ein sternförmiges Gebiet und $u \in C^1(D)$.

Gesucht ist $v \in C^1(D)$, so daß die Cauchy-Riemann-Gleichung

$$\begin{aligned} u_x &= v_y \\ u_y &= -v_x \end{aligned}$$

erfüllt ist. D. h., daß eine Stammfunktion von $\begin{pmatrix} -u_y \\ u_x \end{pmatrix}$ gesucht wird.

Wenn $u \in C^2(D)$ ist, muß

$$(-u_y)_y = (u_x)_x \iff u_{xx} + u_{yy} = 0$$

erfüllt sein, damit eine Stammfunktion existiert. Eine notwendige Bedingung ist also

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \text{ in } D,$$

d. h. u ist harmonisch.

Konkret: Sei

$$u(x, y) = e^x \cos y + xy.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} u_x &= e^x \cos y + y & u_y &= -e^x \sin y + x \\ u_{xx} &= e^x \cos y & u_{yy} &= -e^x \cos y \end{aligned}$$

Also ist

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \text{ in } \mathbb{R}^2.$$

Damit ist u harmonisch und die Cauchy-Riemann-Gleichung ist lösbar.

Setze

$$v_x = -u_y = e^x \sin y - x.$$

Halte nun y fest. Dann ist

$$v = e^x \sin y - \frac{x^2}{2} + C(y)$$

und damit muß dann noch gelten

$$\begin{aligned} v_y &= e^x \cos y + C'(y) \stackrel{!}{=} e^x \cos y + y \\ \iff C'(y) &= y \iff C(y) = \frac{y^2}{2} + c \end{aligned}$$

Zusammen ist also

$$v = e^x \sin y - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}.$$

10 Das Lebesgue-Integral¹

10.1 Nullmengen und Treppenfunktionen

10.1.1 Definition: Intervall im $\mathbb{R}^n$

Sei $a, b \in \mathbb{R}^n$. Dann ist

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R}^n : a_\nu < x_\nu < b_\nu \text{ für } \nu = 1, \dots, n\}$$

ein offenes und

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R}^n : a_\nu \leq x_\nu \leq b_\nu \text{ für } \nu = 1, \dots, n\}$$

ein abgeschlossenes Intervall.

Im $\mathbb{R}^2$ ist ein Intervall ein Rechteck, im $\mathbb{R}^3$ ein Quader.

Jede Menge $I \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $(a, b) \subseteq I \subseteq [a, b]$ für passende $a, b \in \mathbb{R}^n$ heißt Intervall.

$$m(I) = (b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2) \dots (b_n - a_n)$$

heißt *elementarer Inhalt* von I .

10.1.2 Definition: Nullmenge

$N \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt *Nullmenge*, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ endlich oder abzählbar viele Intervalle $I_1, I_2, \dots$ gibt mit $N \subseteq \bigcup_k I_k$ und $\sum_k m(I_k) < \varepsilon$.

10.1.3 Beispiele und Bemerkungen

- (a) Einpunktige Mengen sind Nullmengen.
- (b) Sind $N_1, N_2, \dots$ endlich viele oder abzählbar viele Nullmengen, dann ist auch $N = \bigcup_k N_k$ wieder eine Nullmenge.
- (c) Hyperebenen $H = \{x \in \mathbb{R}^n : x_\nu = \text{const.}\}$ für ein ν sind Nullmengen. Ebenso sind Ränder von Intervallen Nullmengen.
- (d) In der Definition der Nullmenge kann man die I_k als offen annehmen.
- (e) Kompakte Nullmengen kann man bei gegebenem $\varepsilon > 0$ durch endlich viele $I_1, \dots, I_\ell$ überdecken mit $\sum_{k=1}^{\ell} m(I_k) < \varepsilon$.
- (f) Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar. Dann ist

$$\text{Graph}(f) = \{x, f(x) : a \leq x \leq b\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

eine Nullmenge im $\mathbb{R}^2$.

---

¹Version 190 vom 13. Februar 2006

Beweis:

(a) ✓

(b) Sei $\varepsilon > 0$. Dann ex. zu $k = 1, 2, \dots$ Intervalle $I_{k,\nu}$ mit $N_k \subseteq \bigcup_{\nu} I_{k,\nu}$ und $\sum_{\nu} m(I_{k,\nu}) < \varepsilon \cdot 2^{-k}$.
Sei $I_1, I_2, \dots$ Anordnung aller Intervalle $I_{k,\nu}$ für $k = 1, 2, \dots$ und $\nu = 1, 2, \dots$. Es ist damit

$$N \subseteq \bigcup_k \bigcup_{\nu} I_{k,\nu} = \bigcup_{\nu} I_{\nu}$$

und

$$\sum_{\nu} m(I_{\nu}) = \sum_k \underbrace{\sum_{\nu} m(I_{k,\nu})}_{< \varepsilon 2^{-k}} < \sum_k \varepsilon \cdot 2^{-k} \leq \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \varepsilon.$$

(c) Als Aufgabe: Setze

$$H_k := H \cap \underbrace{[-k, k] \times \dots \times [-k, k]}_{n\text{-mal}}.$$

Weise nach: H_k ist Nullmenge. Dann ist H Vereinigung der H_k .

(d) Sei $\varepsilon > 0$ und $I_1, I_2, \dots$ mit $N \subseteq \bigcup_k I_k$ und $\sum_k m(I_k) < \frac{\varepsilon}{2}$.

Umschreibe jedes I_k mit einem offenen und größeren Intervall J_k :Wähle J_k so, daß $I_k \subseteq J_k$ und $m(J_k) < m(I_k) + \varepsilon 2^{-k-1}$ ist.Dann ist $N \subseteq \bigcup_k J_k$. J_k ist offen und

$$\sum_k m(J_k) < \underbrace{\sum_k m(I_k)}_{< \varepsilon/2} + \underbrace{\sum_k \varepsilon 2^{-k-1}}_{\leq \varepsilon/2} < \varepsilon.$$

(e) Siehe Literatur

(f) Aufgabe: Übungsblatt 1

Bilde die Differenz von Ober- und Untersumme bei einer Zerlegung, verfeinere die Zerlegung dann immer mehr.

10.1.4 Satz

Folgende Aussagen sind äquivalent:

1. $N \subseteq \mathbb{R}^n$ ist Nullmenge.
2. Es gibt Intervalle $I_1, I_2, \dots$ mit $\sum m(I_k) < \infty$, so daß jedes $x \in N$ in unendlich vielen I_k enthalten ist.

Beweis:„ $\Leftarrow$ “: Sei $\varepsilon > 0$. Wähle ℓ so, daß

$$\sum_{k=\ell}^{\infty} m(I_k) < \varepsilon$$

Es ist dann immer noch

$$N \subseteq \bigcup_{k=\ell}^{\infty} I_k.$$

Also ist N Nullmenge.

„ $\Rightarrow$ “: Sei $\varepsilon = 1$ und $k \in \mathbb{N}$.

Es ex. Intervalle $I_{k,1}, I_{k,2}, \dots$ mit $N \subseteq \bigcup_{\nu} I_{k,\nu}$ und $\sum_{\nu} m(I_{k,\nu}) < 2^{-k}\varepsilon$. $I_1, I_2, \dots$ sei Abzählung der $I_{k,\nu}$. Dann ist

$$\sum_{\nu} m(I_{\nu}) < \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1.$$

Sei nun $x \in N$. Für $k = 1, 2, \dots$ ex. ν_k mit $x \in I_{k,\nu_k} = I_{j(k)}$.

$\ell \neq k \Rightarrow j(\ell) \neq j(k)$, d. h. $x \in I_{j(1)}, I_{j(2)}, \dots$. Alle $I_{j(k)}$ sind verschieden.

10.1.5 Sprechweise: fast überall

Sei E eine Eigenschaft, die für alle $x \in \mathbb{R}^n$ erklärt ist, d. h. $E(x)$ trifft zu oder nicht. E gilt *fast überall* (f. ü.), wenn $\{x: E(x) \text{ ist falsch}\}$ eine Nullmenge ist.

10.1.6 Beispiel

Sei $E(x) =$ „Eine Koordinate von x ist irrational“.

Die Menge $\{x: E(x) \text{ ist falsch}\} = \mathbb{Q}^n$ ist abzählbar, also eine Nullmenge.

10.1.7 Definition: Treppenfunktion

Eine beschränkte Funktion $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Treppenfunktion*, wenn es endlich viele Intervalle $I_1, \dots, I_k$ und $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ gibt, so daß $\varphi(x) = c_j$ in I_j^0 und $\varphi(x) = 0$ außerhalb von $\bar{I}_1 \cup \dots \cup \bar{I}_k$ ist. Auf den Rändern darf φ beliebige beschränkte Werte annehmen.

10.1.8 Satz

Mit φ und ψ sind auch $\lambda\varphi$ für $\lambda \in \mathbb{R}$, $\varphi + \psi$, $\max(\varphi, \psi)$, $\varphi^+ = \max(\varphi, 0)$, $\varphi^- = \max(-\varphi, 0)$ und $|\varphi|$ Treppenfunktionen.

10.1.9 Bemerkung

Die Treppenfunktionen $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ bilden einen Vektorraum über $\mathbb{R}$. Genauer: Es ist ein Untervektorraum zum Vektorraum der Funktionen $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

$\overline{\{x: \varphi(x) \neq 0\}}$ heißt *Träger* von φ . Der Träger ist kompakt.

10.1.10 Definition: Lebesgue-Integral bei Treppenfunktionen

Ist φ eine Treppenfunktion, so heißt

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi = \int \varphi(x) dx := \sum_{j=1}^k c_j \cdot m(I_j)$$

Lebesgue-Integral von φ .

10.1.11 Bemerkung

1) Ist $n = 1$ und $I_1, \dots, I_k \subseteq [a, b]$, so entspricht

$$\int \varphi = \int_a^b \varphi(x) dx$$

dem Riemann-Integral.

- 2) Sind die $c_j \geq 0$, dann ist $c_j \cdot m(I_j)$ der Inhalt von $\underbrace{I_j \times [0, c_j]}_{\subseteq \mathbb{R}^{n+1}}$ im $\mathbb{R}^{n+1}$.

10.1.12 Satz: Eigenschaften des Lebesgue-Integrals

Das Lebesgue-Integral hat folgende Eigenschaften:

- (1) $\int \lambda \varphi = \lambda \int \varphi$ für $\lambda \in \mathbb{R}$
- (2) $\int \varphi + \psi = \int \varphi + \int \psi$
- (3) $\varphi \stackrel{\text{f.ü.}}{\leq} \psi \Rightarrow \int \varphi \leq \int \psi$
- (4) $|\int \varphi| \leq \int |\varphi|$

Beweis:

(1) Aufgabe

(2) Aufgabe

(3) Sei $\varphi \leq \psi$ fast überall. Die gemeinsamen Konstanzintervalle seien $I_1, \dots, I_k$.

Für I_1 gilt: $c_1 = \varphi(x) \leq \psi(x) = d_1$ in I_1^0 .

Annahme: $c_1 > d_1$. Dann ist $\varphi > \psi$ in I_1^0 . Da aber I_1 keine Nullmenge ist ergibt sich ein WIDERSPRUCH zur Voraussetzung.

$$\int \varphi = \sum_{j=1}^k c_j m(I_j) \leq \sum_{j=1}^k d_j m(I_j) = \int \psi$$

(4) Folgt aus (3), denn es ist $-|\varphi| \leq \varphi \leq |\varphi|$. Also ist $-\int |\varphi| \leq \int \varphi \leq \int |\varphi|$.

10.1.13 Lemma A

Seien φ_k Treppenfunktionen (TF) mit:

1. $\varphi_k \geq 0$ fast überall,
2. $\varphi_{k+1}(x) \leq \varphi_k(x)$ fast überall,
3. $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = 0$.

Dann gilt für $k \rightarrow \infty$:

$$0 \leq \int \varphi_k \rightarrow 0.$$

Beweis: Die Konstanzintervalle von φ_k seien $I_{k\nu}$ mit $\nu = 1, \dots, \ell_k$.

$$N = \{x: \varphi_k \not\rightarrow 0\} \cup \bigcup_{k,\nu} \partial I_{k\nu}$$

ist nach Voraussetzung eine Nullmenge. Es ist

$$\text{Träger}(\varphi_k) \subseteq \text{Träger}(\varphi_1) = MA = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi_1(x)$$

$$B = \sum_{j=1}^{\ell_1} m(I_{1j}).$$

Sei nun $\varepsilon > 0$.

Dann existieren offene Intervalle $J_1, J_2, \dots$ mit $N \subseteq \bigcup_i J_i$ und $\sum_i m(J_i) < \varepsilon$.

Sei $x \notin N$. Dann existiert ein Index $k(x)$ mit $\varphi_k(x) < \varepsilon$ für $k \geq k(x)$.

Sei $I(x)$ das Konstanzintervall von $\varphi_{k(x)}$, das x enthält. Dann ist $\varphi_{k(x)}(y) < \varepsilon$ für alle $y \in I(x)$ und $\varphi_k(y) < \varepsilon$ für alle $y \in I(x)$ und $k \geq k(x)$.

Es ist (M ist kompakt):

$$M \subseteq M \setminus N \cup N \subseteq \bigcup_{x \in M \setminus N} I(x) \cup \bigcup_i J_i.$$

Mit dem Satz von Heine-Borel (7.5.11 auf Seite 182) gilt dann:

Endlich viele $J_1, \dots, J_p$ und $I_{(x^{(1)})}, \dots, I_{(x^{(q)})}$ überdecken ebenfalls M . Setze

$$k_0 = \max(k(x^{(1)}), \dots, k(x^{(q)})).$$

Für $k \geq k_0$ gilt dann:

$$\begin{aligned} 0 \leq \int \varphi_k &\leq \sum_{j=1}^q m(I_{(x^{(j)})}) \cdot \varepsilon + \sum_{i=1}^p m(J_i) \cdot A \\ &\leq \varepsilon \cdot B + A \cdot \varepsilon = (A + B) \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

10.1.14 Lemma B

Seien φ_k Treppenfunktionen mit

1. $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ fast überall
2. $\int \varphi_k \leq A$ für alle k .

Dann ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) < +\infty \text{ fast überall.}$$

Beweis: OBdA seien alle $\varphi_k \geq 0$ fast überall. Sonst betrachte $\varphi_k - \varphi_1$ anstelle von φ_k . Die Konstanzintervalle von φ_k seien $I_{k\nu}$ mit $\nu = 1, \dots, \ell_k$.

$$N = \{x: (\varphi_k(x)) \text{ ist nicht monoton wachsend}\} \cup \bigcup_{k,\nu} \partial I_{k\nu}$$

ist eine Nullmenge. Sei

$$E = \{x \notin N: \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = +\infty\}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Für $k = 1, 2, \dots$ sei

$$E_k := \{x \notin N: \varphi_k(x) > \frac{A}{\varepsilon}\}.$$

Es ist dann

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

E_1 wird überdeckt durch endlich viele abgeschlossene Intervalle $I_1, \dots, I_{p_1}$ mit $\varphi_1 > A/\varepsilon$. Dabei sind $I_1^0, \dots, I_{p_1}^0$ die Konstanzintervalle von φ_1 . Möglicherweise ist $E_1 = \emptyset$.

Es ist $E_k \subseteq E_{k+1}$. Für $x \in E_k$ gilt: $\varphi_k(x) > A/\varepsilon$, $\varphi_{k+1} \geq \varphi_k(x)$.

Sei gezeigt, daß E_k von den abgeschlossenen Intervallen $I_1, \dots, I_{p_1}, \dots, I_{p_k}$ (dies ist wahr für $k = 1$) mit $I_\nu \cap I_\mu = \emptyset$ für $\nu \neq \mu$ und $\varphi_k(x) > A/\varepsilon$ in I_ν^0 überdeckt wird.

Dann wird $E_{k+1} \setminus E_k$ überdeckt durch $I_{p_{k+1}}, \dots, I_{p_{k+1}}$, abgeschlossen mit $I_\mu^0 \cap I_\nu^0 = \emptyset$ und $\varphi_{k+1}(x) > A/\varepsilon$ in I_ν^0 .

Betrachte nun das Intervall I_ν für $\nu \leq p_k$ und I_μ für $\mu \leq p_k$.

In I_ν^0 ist $\varphi_{k+1} > A/\varepsilon$ und in I_μ^0 ist $\varphi_k > A/\varepsilon$.

Es ist $E_k \subseteq I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_{p_k}$ und $\sum_{j=1}^{p_k} m(I_j) \cdot \frac{a}{\varepsilon} < \int \varphi_k \leq A$.

Also ist $\sum_{j=1}^{p_k} m(I_j) < \varepsilon$ für alle k und damit auch $\sum_{j=1}^{\infty} m(I_j) < \varepsilon$.

Da auch $E \subseteq \sum_{k=1}^{\infty} E_k \subseteq \sum_{j=1}^{\infty} I_j$ ist, ist E eine Nullmenge.

10.2 Meßbare und integrierbare Funktionen

10.2.1 Definition: meßbar, L^+

Die Funktion $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

(a) heißt *meßbar*, wenn es eine Folge von Treppenfunktionen (φ_k) für $k = 1, 2, \dots$ gibt mit $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ fast überall für $k \rightarrow \infty$

(b) gehört zu einer Klasse $L^+ = L^+(\mathbb{R}^n)$, wenn es eine Folge von Treppenfunktionen (φ_k) gibt mit

- 1.) $\varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x)$ fast überall
- 2.) $\int \varphi_k \leq A$ für alle k
- 3.) $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$ fast überall.

(c) Für $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$ heißt

$$\int f = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx := \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k$$

das *Lebesgue-Integral* von f .

10.2.2 Bemerkungen und Beispiele

(a) Ist $f \in L^+$, dann ist f meßbar.

(b) Ist $f \in L^+$, dann ist $\varphi_k(x) \leq f(x)$ fast überall.

„ $\leq$ “ ist dort falsch, wo $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) > f(x)$ ist und wo die Monotonie verletzt ist.

(c) Ist $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fast überall stetig, so ist f meßbar.

(d) Die Integraldefinition für $f \in L^+$ ist unabhängig von φ_k , genauer: Ist fast überall $f \leq g$ für $f, g \in L^+$, dann ist $\int f \leq \int g$.

Beweis:

(a) ✓

(b) ✓

- (c) Sei zunächst überall $f \geq 0$. Überdecke $\mathbb{R}^n$ durch abgeschlossene Würfel der Kantenlänge 2^{-k} für $k = 1, 2, \dots$. Diejenigen Würfel, die in $[-k, k] \times \dots \times [-k, k]$ liegen, seien $I_{k1}, \dots, I_{k\ell_k}$. Setze

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \inf f(I_{k\nu}) & \text{in } I_{k\nu}^0 \text{ mit } \nu = 1, \dots, \ell_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Dann ist

$$0 \leq \varphi_k(x) \leq f(x) \text{ überall}$$

und

$$\varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x) \text{ fast überall.}$$

Zeige nun: $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$ in allen Stetigkeitspunkten von f , also fast überall, ausgenommen in $\bigcup_{k,j} \partial I_{kj}$, einer Nullmenge (als Vereinigung von Rändern von Intervallen).

Sei f stetig in x mit $x \notin \bigcup_{k,j} \partial I_{kj}$ und $\varepsilon > 0$.

Dazu existiert eine Kugel $K(x, \delta)$ mit

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon \text{ für alle } y \in K(x, \delta).$$

Wähle nun k so groß, daß

$$K(x, \delta) \subseteq [-k, k] \times \dots \times [-k, k]$$

ist und dasjenige I_{kj} , das x enthält, in $K(x, \delta)$ enthalten ist.

In I_{kj} gilt nun

$$f(x) \geq \varphi_k(x) = \inf_{y \in I_{kj}} f(y) \geq f(x) - \varepsilon,$$

d. h. $|f(x) - \varphi_k(x)| < \varepsilon$ für diese k , d. h. $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$. ✓

Für allgemeines f wird f in $f = f^+ - f^-$ aufgeteilt und jeweils φ_k berechnet.

- (d) Zu f, g gehören φ_k und ψ_k wie in der Definition. Sei $\ell \in \mathbb{N}$ fest:

$$\varphi_\ell = \psi_k + (\varphi_\ell - \psi_k) \leq \psi_k + (\varphi_\ell - \psi_k)^+.$$

Setze

$$\chi_k := (\varphi_\ell - \psi_k)^+ \geq \chi_{k+1} \text{ fast überall.}$$

Es ist

$$\chi_k(x) \xrightarrow{\text{f.ü.}} \underbrace{(\varphi_\ell(x) - g(x))^+}_{\leq f(x) \text{ f.ü.}} \leq \xrightarrow{\text{f.ü.}} (f(x) - g(x))^+ = 0 \text{ fast überall.}$$

Aus Lemma A (10.1.13) folgt dann

$$\int \chi_k \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty$$

$$\int \varphi_\ell \leq \int \psi_k + \int \chi_k \rightarrow \int g + 0$$

für alle ℓ . Zusammen gilt für $\ell \rightarrow \infty$:

$$\int f \leq \int g.$$

10.2.3 Beispiel

Im $\mathbb{R}^2$ sei

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y} & \text{für } x, y > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Es ist $f \in L^+$, denn es ist überall $f \geq 0$. Konstruiere φ_k wie im Beispiel zuvor. Setze

$$I_{\mu\nu}^k = [\mu \cdot 2^{-k}, (\mu + 1) \cdot 2^{-k}] \times [\nu \cdot 2^{-k}, (\nu + 1) \cdot 2^{-k}]$$

für $\mu, \nu = 0, \dots, k \cdot 2^k - 1$. Es ist

$$\inf_{I_{\mu\nu}^k} f(x, y) = e^{-((\mu+1)+(\nu+1))2^{-k}} = \varphi_k(x) \text{ in } (I_{\mu\nu}^k)^0.$$

Es ist dann

$$\begin{aligned} \int \varphi_k &= \sum_{\mu, \nu=0}^{k2^k-1} e^{-(\mu+\nu+2)2^{-k}} 4^{-k} = \sum_{\mu, \nu=1}^{k2^k} 4^{-k} e^{-\mu 2^{-k}} e^{-\nu 2^{-k}} \\ &= \left(\sum_{\nu=1}^{k2^k} 2^{-k} e^{-\nu 2^{-k}} \right)^2 = (e^{-2^{-k}})^2 \cdot \left(\frac{1 - e^{-k}}{1 - e^{-2^{-k}}} \cdot 2^{-k} \right)^2 \\ &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1 \cdot 1^2 \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{t}{1 - e^{-t}} \right)^2 = 1. \end{aligned}$$

Später wird gezeigt:

$$\int e^{-x-y} = \int_0^\infty e^{-x} dx \cdot \int_0^\infty e^{-y} dy$$

10.2.4 Satz

Mit f und g sind auch

- (a) $f + g$, λf für $\lambda \in \mathbb{R}$, $f \cdot g$, $f^+ = \max(0, f)$, $f^- = \max(0, -f)$, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ und $|f|$ messbar.
- (b) $f + g$, λf für $\lambda \geq 0$, f^+ und $\max(f, g)$ zu L^+ gehörig. Es gilt dann

$$\begin{aligned} \int (f + g) &= \int f + \int g \\ \int \lambda f &= \lambda \int f \end{aligned}$$

Beweis:

- (a) $f + g$, λf über Regeln für Grenzwerte.
 f^+ : Sei $\varphi_k \rightarrow f$ fast überall, dann ist $\varphi_k^+ \rightarrow f^+$ fast überall.
 $\max(f, g)$: Sei $\varphi_k \rightarrow f$ und $\psi_k \rightarrow g$ f. ü. Dann ist $(\max(\varphi_k, \psi_k) \rightarrow \max(f, g))$ f. ü.
- (b) Zu f und g gehören (φ_k) und (ψ_k) mit

$$\varphi_k \leq \varphi_{k+1} \text{ f. ü., } \varphi_k \rightarrow f \text{ f. ü. und}$$

$$\int \varphi_k \leq A \text{ für alle } k.$$

Entsprechendes gilt für ψ_k .

$f + g$: Setze $\chi_k = \varphi_k + \psi_k$. Dann ist $\chi_k \rightarrow f + g$ fast überall und

$$\int \chi_k = \int \varphi_k + \int \psi_k \leq A + B.$$

λf : Für $\lambda \geq 0$ ist $\chi_k = \lambda \varphi_k \rightarrow \lambda f$ f. ü. und $\lambda \varphi_k \leq \lambda \varphi_{k+1}$ f. ü.

$$\int (\lambda \varphi_k) = \lambda \int \varphi_k \leq \lambda A.$$

f^+ : Sei $\chi_k = \varphi_k^+$. Es ist

$$\varphi_k = \varphi_k - \varphi_1 + \varphi_1 \leq \underbrace{\varphi_k - \varphi_1}_{\geq \text{f. ü.}} + \underbrace{\varphi_1^+}_{\geq 0} \geq 0.$$

Also ist $\varphi_k^+ \leq \varphi_k - \varphi_1 + \varphi_1^+$ fast überall und damit

$$\int \chi_k \leq \int (\varphi_k - \varphi_1) + \int \varphi_1^+ = \underbrace{\int \varphi_k}_{\leq A} - \underbrace{\int \varphi_1}_{\text{fest}} + \int \varphi_1^+.$$

$\max(f, g)$: Setze $\chi_k = \max(\varphi_k, \psi_k)$. Dann ist

$$\begin{aligned} \chi_k &\leq \max(\varphi_k - \varphi_1, \psi_k - \psi_1) + \max(\varphi_1, \psi_1) \\ &\leq \max(\varphi_k - \varphi_1, \psi_k - \psi_1) + \max(\varphi_1^+, \psi_1^+) \\ &\leq \varphi_k - \varphi_1 + \psi_k - \psi_1 + \varphi_1^+ + \psi_1^+ \end{aligned}$$

$$\int \chi_k \leq \int \varphi_k + \int \psi_k + \text{const} \leq A + B + \text{const}.$$

10.2.5 Definition: L

Definiere

$$L = L(\mathbb{R}^n) := \{f: f = f_1 - f_2 \text{ mit } f_1, f_2 \in L^+\}.$$

Für $f \in L$, d. h. $f = f_1 - f_2$ mit $f_1, f_2 \in L^+$ heißt

$$\int f := \int f_1 - \int f_2$$

Lebesgue-Integral von f . Diese Definition ist unabhängig von der Darstellung $f = f_1 - f_2$:

Sei $f = g_1 - g_2$ mit $g_1, g_2 \in L^+$ und $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$.

Dann ist $f_1 + g_2 = g_1 + f_2$. Dabei ist $f_1 + g_2 \in L^+$ und $g_1 + f_2 \in L^+$.

Also ist $\int f_1 + \int g_2 = \int g_1 + \int f_2$

und damit $\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2$.

10.2.6 Bemerkung

(a) Ist $f \in L$, dann ist f meßbar.

(b) Zu $f \in L$ und $\varepsilon > 0$ existieren $f_1, f_2 \in L^+$ mit $f = f_1 - f_2$, $f_2 \geq 0$ fast überall und $\int f_2 < \varepsilon$.

Beweis:

(a) Klar.

(b) Sei $f = g_1 - g_2$ mit $g_1, g_2 \in L^+$ .Zu g_1 und g_2 gehören die Folgen (φ_k) und (ψ_k) von Treppenfunktionen.Damit existiert eine Treppenfunktion ψ mit $\psi \leq g_2$ fast überall und $\int \psi > \int g_2 - \varepsilon$ .Z. B. ist $\psi = \psi_k$ für ein großes k .Setze $f_2 := g_2 - \psi$ und $f_1 := g_1 - \psi$ .Es sind $f_1, f_2 \in L^+$ und

$$f_1 - f_2 = g_1 - \psi - (g_2 - \psi) = (g_1 - g_2) = f.$$

Da fast überall $\psi \leq g_2$ ist, ist $f_2 = g_2 - \psi \geq g_2 - g_2 = 0$ fast überall und

$$0 \leq \int f_2 = \int (g_2 - \psi) = \int g_2 - \int \psi < \varepsilon.$$

10.2.7 Aufgabe Seien $f, g \in L$. Zeige folgende Aussagen:

1. Ist $f \leq g$ fast überall, dann ist $\int f \leq \int g$.
2. Ist $f = 0$ fast überall, dann ist $\int f = 0$.
3. Ist $\int |f| = 0$, dann ist $f = 0$ fast überall.

10.2.8 Satz Mit f und g sind auch $f + g$, λf für $\lambda \in \mathbb{R}$, f^+ , f^- , $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ und $|f|$ in L . Insbesondere ist $L = L(\mathbb{R}^n)$ ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ mit $\int (f + g) = \int f + \int g$ und $\int (\lambda f) = \lambda \int f$.**Beweis:** Sei $f = f_1 - f_2$ und $g = g_1 - g_2$ mit $f_1, f_2, g_1, g_2 \in L^+$. Es ist dann:

$$f + g = \underbrace{(f_1 + g_1)}_{\in L^+} - \underbrace{(f_2 + g_2)}_{\in L^+} \in L$$

$$\lambda f = \underbrace{\lambda f_1}_{\in L^+} - \underbrace{\lambda f_2}_{\in L^+} \in L \text{ für } \lambda \geq 0$$

$$\lambda f = \underbrace{-\lambda f_2}_{\in L^+} - \underbrace{-\lambda f_1}_{\in L^+} \in L$$

 $\int (f + g) = \dots$ und $\int (\lambda f) = \dots$ gelten in L^+ und damit auch in L .

$$f^+ = \max(f, 0) = \max(f_1 - f_2, 0) = \underbrace{\max(f_1, f_2)}_{\in L^+} - \underbrace{f_2}_{\in L^+} \in L$$

$$f^- = (-f)^+ = \max(-f, 0) \in L$$

$$\max(f, g) = (f - g)^+ + g \in L$$

$$\min(f, g) = -\max(-f, -g) \in L$$

$$|f| = f^+ + f^- \in L$$

10.2.9 Beispiel

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und

$$\chi_U(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } x \in U \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die *charakteristische Funktion*. Wenn U beschränkt ist, dann ist $\chi_U \in L^+ \subseteq L$.

Beweis: Konstruiere eine approximierende Folge (φ_k) :

Überdecke $\mathbb{R}^n$ mit einem (abgeschlossenen) Würfelnetz mit der Kantenlänge 2^{-k} für $k = 0, 1, 2, \dots$

- 0-te Generation: Würfel der Kantenlänge 1, die in U sind: $W_1, \dots, W_{n_0}$.
- 1-te Generation: Alle Würfel der Kantenlänge $\frac{1}{2}$, die in U aber nicht in $W_1, \dots, W_{n_0}$ liegen: $W_{n_0+1}, \dots, W_{n_1}$.
- $\vdots$
- $(k+1)$ -te Generation: Alle Würfel der Kantenlänge 2^{-k-1} , die in U enthalten sind, aber nicht in $W_1, \dots, W_{n_k}$ liegen: $W_{n_{k+1}}, \dots, W_{n_{k+1}}$.

Setze

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ liegt in einem Würfel der Generation } \leq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Es ist überall $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ und $\varphi_k = 0$ außerhalb von U .

Es ist überall $\varphi_k \rightarrow \chi_U$ für $k \rightarrow \infty$ (Aufgabe), weil $U = \bigcup_j W_j$ ist.

Da U beschränkt ist, ist $U \subseteq [-\ell, \ell] \times \dots \times [-\ell, \ell]$ und damit

$$\int \varphi_k = \sum_{j=1}^{n_k} m(W_j) \leq (2\ell)^n.$$

Also ist $\chi_U \in L^+$.

10.3 Konvergenzsätze

10.3.1 Satz von Beppo Levi

Sei (f_k) eine Folge in $L(\mathbb{R}^n)$ mit $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$ fast überall und $\int f_k \leq \text{const}$ unabhängig von k . Dann ist

$$f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) < +\infty \text{ fast überall.}$$

Für f_k =Treppenfunktionen wurde dies schon in Lemma B, 10.1.14 auf Seite 257, gezeigt. Setzt man dort wo f nicht erklärt war $f(x) = 0$, so ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$ und

$$\int f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

Beweis:

1. Zunächst für $f_k \in L^+$ mit $k = 1, 2, \dots$:

Dann existieren Treppenfunktionen $\varphi_{k,\nu}$ mit

$$\varphi_{k,\nu}(x) \leq \varphi_{k,\nu+1}(x) \text{ fast überall}$$

$$\int \varphi_{k,\nu} \leq \int f_k \leq \text{const. für } k = 1, 2, \dots \text{ und } \nu = 1, 2, \dots$$

φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	$\dots$
φ_{11}	φ_{12}	φ_{13}	$\dots$	f_1
φ_{21}	φ_{22}	φ_{23}	$\dots$	f_2
φ_{31}	φ_{32}	φ_{33}	$\dots$	f_3
φ_{41}	φ_{42}	φ_{43}	$\dots$	f_4

Setze

$$\varphi_\nu(x) = \max_{1 \leq k \leq \nu} (\varphi_{k,\nu}(x)).$$

φ_ν ist Treppenfunktion als Maximum von abzählbar vielen Treppenfunktionen. Da

$$\varphi_{k,\nu} \leq \varphi_{k,\nu+1} \text{ fast überall,}$$

gilt auch

$$\varphi_\nu \leq \varphi_{\nu+1} \text{ fast überall.}$$

Da

$$\varphi_{k,\nu} \leq \begin{cases} f_k & \text{fast überall für } \nu = 1, 2, \dots, \\ f_\nu & \text{für } k \leq \nu \text{ fast überall} \end{cases},$$

ist $\varphi_\nu \leq f_\nu$ fast überall. Also ist

$$\int \varphi_\nu \leq \int f_\nu \leq \text{const.}$$

Nach Lemma B (10.1.14, Seite 257) gilt dann

$$f(x) := \lim_{\nu \rightarrow \infty} \varphi_\nu(x) < +\infty \text{ fast überall.}$$

Setzt man $f(x) = 0$ sonst, so ist $f \in L^+$ und $\int f = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int \varphi_\nu$.

Da fast überall $\varphi_\nu \leq f_\nu$ ist, ist

$$f(x) \leq \lim_{\nu \rightarrow \infty} f_\nu(x) \text{ fast überall}$$

und

$$\int f = \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int \varphi_\nu \leq \lim_{\nu \rightarrow \infty} \int f_\nu.$$

Umgekehrt: Für $\nu \geq k$ ist $\varphi_\nu \geq \varphi_{k,\nu}$ fast überall.

Sei nun k fest und $\nu \rightarrow \infty$. Dann folgt:

$$f(x) \geq f_k(x) \text{ fast überall.}$$

Für $k \rightarrow \infty$ folgt dann:

$$f(x) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ fast überall.}$$

Aus $\varphi \geq \varphi_{k,\nu}$ folgt auch für $\nu \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \int f &\geq \int \lim_{\nu \rightarrow \infty} \varphi_{k,\nu} = \int f_k \\ &\Rightarrow \int f \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k. \end{aligned}$$

Ergebnis: $f \in L^+$, $f = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k$ fast überall und

$$\int f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

2. Allgemeiner Fall: Sei $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$. Dann gibt es $\tilde{g}_\nu, \tilde{h}_\nu \in L^+$ (Definition) mit

$$\underbrace{f_\nu - f_{\nu-1}}_{\in L} = \tilde{g}_\nu - \tilde{h}_\nu \text{ für } \nu = 1, 2, \dots \text{ mit } f_0 = 0.$$

Dabei ist $\tilde{h}_\nu \geq 0$ fast überall und nach der Bemerkung 10.2.6 auf Seite 261

$$0 \leq \int \tilde{h}_\nu < 2^{-\nu}.$$

Es ist

$$\tilde{g}_\nu = (f_\nu - f_{\nu-1}) + \tilde{h}_\nu \geq 0 + 0 = 0 \text{ fast überall}$$

und

$$f_k = \sum_{\nu=1}^k (f_\nu - f_{\nu-1}) = \underbrace{\sum_{\nu=1}^k \tilde{g}_\nu}_{=:g_k} - \underbrace{\sum_{\nu=1}^k \tilde{h}_\nu}_{=:h_k}.$$

Es sind $g_k, h_k \in L^+$, $g_k \leq g_{k+1}$ fast überall und $h_k \leq h_{k+1}$ fast überall.

$$\int h_k = \sum_{\nu=1}^k \underbrace{\int \tilde{h}_\nu}_{< 2^{-\nu}} < \sum_{\nu=1}^{\infty} 2^{-\nu} = 1$$

$$\int g_k = \int f_k + \int h_k \leq \text{const} + 1.$$

Nach dem 1. Teil ist $g_k \rightarrow g \in L^+$ fast überall und $h_k \rightarrow h \in L^+$ fast überall.

$$\int f_k = \int g_k - \int h_k \rightarrow \int g - \int h = \int \underbrace{g - h}_{=:f} = \int f.$$

Dabei ist $f = g - h \in L$ und

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} (g_k(x) - h_k(x)) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \text{ fast überall.}$$

10.3.2 Satz von Beppo Levi für Reihen

Seien $f_1, f_2 \dots \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_k \geq 0$ fast überall und $\sum_{k=1}^{\infty} \int f_k$ konvergiere.

Dann konvergiert

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

fast überall und es gilt

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int f_k.$$

Beweis: Beppo Levi auf die Partialsummen

$$\sum_{j=1}^k f_j$$

anwenden.

10.3.3 Beispiel: Charakteristische Funktion

Seien $U_1, U_2, \dots$ Mengen in $\mathbb{R}^n$ mit $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \dots$ und $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$. Setze

$$\chi_{U_j} = \begin{cases} 1 & x \in U_j \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es ist $\chi_{U_j} \in L$ und U ist beschränkt. Außerdem ist $\chi_{U_j} \leq \chi_{U_{j+1}}$ und $\int \chi_{U_j} \leq \text{const.}$ Später wird $\int \chi_U$ das Maß von U genannt.

10.3.4 Integrabilitätskriterium von Riemann-Lebesgue

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, $f(x) = 0$ für $x < a$ und für $x > b$. Dann gilt

$$f \text{ ist Riemann-integrierbar über } [a, b] \iff f \text{ ist f. ü. stetig.}$$

Es gilt dann

$$\int_a^b f(x) dx = \int f.$$

Beweis:

„ $\Rightarrow$ “: Sei f Riemann-integrierbar und Z_k eine äquidistante Zerlegung von $[a, b]$ mit $2^k + 1$ Teilpunkten und den Teilintervallen I_j^k für $j = 1, \dots, 2^k$. Setze

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \inf f(I_j^k) & \text{in } (I_j^k)^0 \text{ für } j = 1, \dots, 2^k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\Phi_k(x) = \begin{cases} \sup f(I_j^k) & \text{in } (I_j^k)^0 \text{ für } j = 1, \dots, 2^k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Dann ist

$$\int \varphi_k = s(Z_k) \text{ und } \int \Phi_k = S(Z_k).$$

Nach Definition gilt

$$\varphi_k \leq f \leq \Phi_k \text{ fast überall (in } \mathbb{R} \setminus Z_k)$$

$$\int (\Phi_k - \varphi_k) = S(Z_k) - s(Z_k) \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Setze $\chi_k = \Phi_k - \varphi_k$. Dann ist überall $\chi_k \geq 0$ und $\chi_{k+1} \leq \chi_k$.

Wende nun Beppo-Levi auf $(-\chi_k)$ an (Lemma B):

$$-\chi_k \leq -\chi_{k+1} \text{ und } \int -\chi_k \leq 0.$$

Also ist $-\chi_k \rightarrow -g \leq 0$ fast überall, $g \in L(\mathbb{R})$ und

$$\int -g = \lim_{k \rightarrow \infty} \int -\chi_k = 0,$$

also ist $g = 0$ fast überall.

Zeige: f ist außerhalb der Nullmenge $\{x: g(x) \neq 0\} \cup \bigcup_k Z_k$ stetig.

Sei $x \in [a, b] \setminus \bigcup_k Z_k$ mit $g(x) = 0$.

Sei $\varepsilon > 0$. Dann ex. k_0 mit $\Phi_k(x) - \varphi_k(x) < \varepsilon$ für $k \geq k_0$.

Somit gilt für ein festes k :

$$\Phi_k(y) - \varphi_k(y) < \varepsilon \text{ in } (x - \delta, x + \delta) \subseteq \text{Konstanzintervall.}$$

Sei nun $|y - x| < \delta$. Dann ist

$$f(y) - f(x) \stackrel{\text{Def.}}{\leq} \underbrace{\Phi_k(y) - \varphi_k(y)}_{=\varphi_k(x)} < \varepsilon.$$

Mit Vertauschung von x und y ist

$$f(x) - f(y) \leq \underbrace{\Phi_k(y) - \varphi_k(y)}_{=\Phi_k(x)} < \varepsilon,$$

d. h. $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ für $|x - y| < \delta$.

„ $\Leftarrow$ “: f sei fast überall stetig und Z_k, φ_k und Φ_k definiert wie im 1. Teil. Es gilt:

$$\int \varphi_k = s(Z_k) \text{ und } \int \Phi_k = S(Z_k)$$

(Früher: f f. ü. stetig, $\varphi_k \nearrow f$ f. ü. und $\Phi_k \searrow f$ f. ü. genauso.

Übrigens ist $\pm f \in L^+$, weil $\int \varphi_k \leq \sup f(\mathbb{R})(b - a)$).

Betrachte nun $\Phi_k - \varphi_k$:

$$\begin{aligned} \int f &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k = \lim_{k \rightarrow \infty} s(Z_k) \\ \int -f &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int -\Phi_k = - \lim_{k \rightarrow \infty} S(Z_k) \\ \Rightarrow \int f &= \lim_{k \rightarrow \infty} S(Z_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} s(Z_k). \end{aligned}$$

Also ist f Riemann-integrierbar und $\int_a^b f(x) dx = \int f$.

10.3.5 Bemerkung

Ist f nur fast überall in $\mathbb{R}^n$ definiert, dann wird i. A. automatisch $f(x) = 0$ gesetzt, wo f zunächst nicht definiert ist.

10.3.6 Satz von Lebesgue über majorisierte Konvergenz

Sei (f_k) eine Folge von Funktionen $L(\mathbb{R}^n)$ und es gelte $f_k \rightarrow f(x)$ punktweise für $k \rightarrow \infty$ fast überall. Weiter gebe es ein $g \in L(\mathbb{R}^n)$ mit $|f_k(x)| \leq g(x)$ fast überall für $k = 1, 2, \dots$. Dann ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$ und es ist

$$\int f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

g heißt *Majorante*. Man sagt, die Konvergenz $f_k \rightarrow f$ ist *majorisiert*.

Beweis: Setze punktweise $g_{k\nu} := \max(f_k, f_{k+1}, \dots, f_{k+\nu})$ für festes $k \in \mathbb{N}$. Es ist überall $g_{k\nu} \leq g_{k,\nu+1}$ und

$$\int g_{k\nu} \leq \int g = \text{const},$$

weil fast überall $|g_{k\nu}| \leq g$ ist.

Mit Beppo-Levi ist $g_{k\nu} \xrightarrow{\nu \rightarrow \infty} g_k$ fast überall, $g_k \in L(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{\nu \rightarrow \infty} \max(f_k(x), \dots, f_{k+\nu}(x)) \\ &= \overline{\lim}_{\ell \rightarrow \infty} f_\ell(x) = f(x) \text{ fast überall.} \end{aligned}$$

Es ist $g_k = \sup(f_k, f_{k+1}, f_{k+2}, \dots)$, also ist $f_k \leq g_k$ und $g_{k+1} \leq g_k$.

Setze genauso $h_{k\nu} = \min(f_k, \dots, f_{k+\nu})$. Wende Beppo-Levi auf $(-h_{k\nu})_{\nu=1}^\infty$ an. Dann ist $h_{k\nu} \rightarrow h_k$ fast überall, $h_k \leq f_k$, $h_{k+1} \geq h_k$ fast überall und $h_k \rightarrow f$.

Warum darf Beppo-Levi auf z. B. (h_k) angewandt werden?

$$\begin{aligned} |h_k| &\stackrel{\text{f.ü.}}{=} \lim_{\nu \rightarrow \infty} |h_{k\nu}| = \lim_{\nu \rightarrow \infty} |\min(f_k, \dots, f_{k+\nu})| \\ &\leq \lim_{\nu \rightarrow \infty} \max(\underbrace{|f_k|}_{\leq g}, \dots, \underbrace{|f_{k+\nu}|}_{\leq g}) \leq g \text{ fast überall} \end{aligned}$$

Also ist $\int h_k \leq \int g = \text{const}$. Zusammen ist $h_k \leq h_{k+1} \leq f \leq g_{k+1} \leq g_k$ fast überall, $h_k \rightarrow f$ fast überall und $g_k \rightarrow f$ fast überall.

Wende nun Beppo-Levi auf (h_k) bzw. $(-g_k)$ an. Damit ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$ und $\int f = \lim \int h_k = \lim \int g_k$.

Da fast überall $h_k \leq f_k \leq g_k$ ist, folgt

$$\int f \leftarrow \int h_k \leq \int f_k \leq \int g_k \rightarrow \int f.$$

Also ist $\int f_k \rightarrow \int f$.

10.3.7 Folgerungen

Folgerung 1: Ist $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ meßbar und $|f| \leq g$ fast überall mit $g \in L(\mathbb{R}^n)$, dann ist f integrierbar.

Folgerung 2: Ist $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fast überall stetig und $|f| \leq g$ fast überall mit $g \in L(\mathbb{R}^n)$, dann ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$.

Folgerung 3: Sind alle f_k meßbar und ist $f_k \rightarrow f$ fast überall, so ist f meßbar.

Beweis:

Folgerung 1: Es existiert eine Treppenfunktion φ_k mit $\varphi_k \rightarrow f$ für $k \rightarrow \infty$ fast überall. Setze

$$f_k(x) = \begin{cases} g(x) & \text{wo } \varphi_k(x) > g(x) \\ -g(x) & \text{wo } \varphi_k(x) < -g(x) \\ \varphi_k(x) & \text{sonst} \end{cases}.$$

Es gilt: $|f_k(x)| \leq g(x)$ und

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \begin{cases} f(x) & \text{wo } |f(x)| \leq g(x), \varphi_k(x) \rightarrow f(x) \\ ? & \text{sonst} \end{cases}.$$

Es ist $\varphi_k(x) \rightarrow f(x)$, $|f(x)| \leq g(x)$.

Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $|\varphi_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ für $k \geq k_0$ und es gibt 3 Möglichkeiten:

$$\varphi_k(x) \leq g(x) + \varepsilon \quad (a)$$

$$\varphi_k(x) \geq -g(x) - \varepsilon \quad (b)$$

$$-g(x) < \varphi_k(x) < g(x) \quad (c)$$

Setze im Fall (c) $f_k(x) = \varphi_k(x)$. Falls (a) und nicht (c) gilt, setze $g(x) = f_k(x)$. Dann ist $g(x) < \varphi_k(x) < g(x) + \varepsilon$. Für (b) und nicht (c) analog. Dann ist $|\varphi_k - f_k| < \varepsilon$, $|f_k - f| \leq |f_k - \varphi_k| + |\varphi_k - f| < 2\varepsilon$. Wende den Satz von Lebesgue an, und es ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$.

Folgerung 2: Aus fast überall stetig folgt die Meßbarkeit. Weiter mit Folgerung 1.

Folgerung 3: Sei $h \in L(\mathbb{R}^n)$ und überall positiv (Aufgabenblatt)

$$g_k = \frac{f_k h}{h + |f_k|} \text{ ist meßbar nach 10.3.8}$$

$$|g_k| = \underbrace{\frac{|f_k|}{h + |f_k|}}_{<1} \cdot h < h$$

Also ist $g_k \in L(\mathbb{R}^n)$ und der Satz von Lebesgue ist anwendbar, da

$$g_k \xrightarrow{\text{f. ü.}} g = \frac{f h}{h + |f|}$$

und $|g_k| < h$ ist. Insbesondere ist $g \in L(\mathbb{R}^n)$ und

$$f = \frac{g \cdot h}{h - |g|}$$

ist ebenfalls meßbar nach 10.3.8.

10.3.8 Hilfsüberlegung

Seien $g_1, \dots, g_p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ meßbar und sei $\Phi: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $\Phi(0) = 0$.

Dann ist $\Phi(g_1(x), \dots, g_p(x)) = \varphi(x)$ ebenfalls meßbar.

Beweis: Es existieren Treppenfunktionen $\psi_{j,k}$ mit $\psi_{j,k} \rightarrow g_j$ fast überall für $k \rightarrow \infty$ und $j = 1, \dots, p$. Nehme $\Phi(\psi_{1,k}, \psi_{2,k}, \dots, \psi_{p,k}) \rightarrow \varphi$ fast überall.

10.3.9 Lemma von Fatou

Es sei $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_k \geq 0$ fast überall und $\int f_k \leq A$ für alle k . Weiter gelte $f_k \rightarrow f$ fast überall für $k \rightarrow \infty$. Dann ist $f \in L(\mathbb{R}^n)$ und es gilt

$$\int f \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

ACHTUNG: Dabei kann auch „<“ gelten!.

Beweis: Setze $g_k := \inf(f_k, f_{k+1}, \dots)$. g_k ist wie im Beweis des Satzes von Lebesgue (10.3.6) in $L(\mathbb{R}^n)$, weil fast überall $0 \leq g_k \leq f_k$ ist.

$$f(x) \stackrel{\text{f.ü.}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x).$$

Es ist $g_k \leq g_{k+1}$ und $\int g_k \leq \int f_k \leq A$. Mit Beppo-Levi gilt:

$$\int f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

10.4 Der Satz von Fubini

10.4.1 Vorbemerkungen

(a) Sei $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$, $x \in \mathbb{R}^p$, $y \in \mathbb{R}^q$, $(x, y) \in \mathbb{R}^n$, $n = p + q$, $p, q \geq 1$. Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann ist

$$E_x := \{y : (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^q$$

und

$$E_y := \{x : (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^p.$$

(b) Sei $I \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Intervall, $I = I_1 \times I_2$ mit $I_1 \subseteq \mathbb{R}^p$ und $I_2 \subseteq \mathbb{R}^q$. Setze

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 1 & (x, y) \in I^0 \\ 0 & (x, y) \notin \bar{I} \\ \text{beschr} & (x, y) \in \partial I \end{cases}$$

und

$$\psi(x) := \int_{\mathbb{R}^q} \varphi(x, y) dy = \begin{cases} m_q(I_2) & x \in I_1^0 \\ 0 & x \notin \bar{I}_1 \\ ? & x \in \partial I_1 \end{cases}.$$

Dabei ist m_q der q -dimensionale Inhalt und

$$\int_{\mathbb{R}^p} \psi(x) dx = m_q(I_2) \cdot m_p(I_1).$$

Es gilt:

$$\int_{\mathbb{R}^p} \left[\int_{\mathbb{R}^q} \varphi(x, y) dy \right] dx = m_p(I_1) \cdot m_q(I_2) = m_n(I) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x, y) d(x, y).$$

(c) Sei $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktion. Dann gilt nach (b)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^p} \underbrace{\left[\int_{\mathbb{R}^q} \varphi(x, y) dy \right]}_{\text{ex. f. ü.}} dx$$

10.4.2 Satz von Fubini

Sei $f \in L(\mathbb{R}^n)$. Dann existiert

$$\int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$$

für fast alle $x \in \mathbb{R}^p$ und es gilt

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^p} \left[\int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \right] dx$$

Beweis: In 10.4.5 ab der Seite 273.

10.4.3 Beispiele

(1) Für $n = 2$. Sei

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y} & x, y > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d(x, y) &= 1 \text{ nach früherem Beispiel} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \right] dx = \int_0^{\infty} \left[\int_0^{\infty} e^{-x-y} dy \right] dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x} \underbrace{\left[\int_0^{\infty} e^{-y} dy \right]}_{=1} dx. \end{aligned}$$

(2) Für $n = 2$. Sei

$$f(x, y) = \begin{cases} x \cdot y^2 & y^2 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Die Grenzen, in denen integriert werden muß, sind $0 \leq x \leq 1$ und $-\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d(x, y) &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy^2 dy dx = \int_0^1 \frac{x \cdot y^3}{3} \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 x^{5/2} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{7} x^{7/2} \Big|_0^1 = \frac{4}{21}. \end{aligned}$$

(3) Für $n = 3$. Sei

$$E = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x & (x, y, z) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

f ist fast überall stetig, also ist f meßbar.

Eine Lebesgue-integrierbare Majorante von f ist

$$g(x, y, z) = \begin{cases} 1 & (x, y, z) \in [0, 1]^3 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Die Grenzen der Integrale sind $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1 - x$, $0 \leq z \leq 1 - x - y$. Es ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} f(x, y, z) d(x, y, z) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} x dz dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy dx = \int_0^1 \left[xy - x^2y - \frac{x}{2}y^2 \right]_0^{1-x} dx \\ &\quad \vdots \\ &= \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

10.4.4 Hilfssatz zum Beweis des Satzes von Fubini

Sei $N \subseteq \mathbb{R}^n$ Nullmenge und $N_x = \{y : (x, y) \in N\} \subseteq \mathbb{R}^q$. Dann ist $N_x \subseteq \mathbb{R}^q$ Nullmenge für fast alle $x \in \mathbb{R}^p$.

Beweis: N ist Nullmenge. Also existieren Intervalle $I_1, I_2, \dots \subseteq \mathbb{R}^n$ mit

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_n(I_k) < 1,$$

und jedes $(x, y) \in N$ ist in unendlich vielen I_k enthalten. Setze

$$\varphi_k(x, y) = \begin{cases} 1 & (x, y) \in I_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und

$$\Phi_k(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x, y) dy = m_q((I_k)_x).$$

Dabei existiert Φ_k fast überall in $\mathbb{R}^p$.

Dann ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^p} \sum_{k=1}^{\ell} \Phi_k(x) dx &= \sum_{k=1}^{\ell} \int_{\mathbb{R}^p} \Phi_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\ell} \int_{\mathbb{R}^p} m_q((I_k)_x) dx \\ &= \sum_{k=1}^{\ell} m_n(I_k) < 1. \end{aligned}$$

Für die Folge $\left(\sum_{k=1}^{\ell} \Phi_k\right)$ ist $\Phi_k \geq 0$. Die Folge ist wachsend und die Integralfolge ist ≤ 1 . Daraus folgt mit Beppo-Levi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k(x) < +\infty \text{ fast überall in } \mathbb{R}^p.$$

Sei nun $\sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k(x) < +\infty$. Zeige, daß N_x eine Nullmenge ist.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann existiert ein k_0 , so daß

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} \Phi_k(x) < \varepsilon.$$

Dann ist

$$N_x \subseteq \left(\bigcup_{k=k_0}^{\infty} I_k \right)_x \stackrel{\odot}{\subseteq} \bigcup_{k=k_0}^{\infty} \underbrace{(I_k)_x}_{\otimes}$$

$\oplus$, da x in unendlich vielen I_k ist.

$\odot$ als Aufgabe.

$\otimes$ sind Intervalle in $\mathbb{R}^q$.

Also ist

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} m_q((I_k)_x) = \sum_{k=k_0}^{\infty} \Phi_k(x) < \varepsilon \checkmark$$

10.4.5 Beweis des Satzes von Fubini

Der Beweis wird dreigeteilt:

(a) Für Treppenfunktionen f . Schon erledigt in der Vorbemerkung (c).

(b) Für $f \in L^+$: Hier

(c) Allgemein für $f = f_1 - f_2$ mit $f_1, f_2 \in L^+$: ✓

Zeige nun die Behauptung für $f \in L^+$:

Sei $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$ und φ_k seien Treppenfunktionen mit $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ fast überall, $\varphi_k \rightarrow f$ fast überall für $k \rightarrow \infty$ und

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x, y) d(x, y) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d(x, y).$$

Setze

$$N = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n : \varphi_k(x, y) \not\rightarrow f(x, y)\}.$$

N ist Nullmenge in $\mathbb{R}^n$. Setze

$$M_1 = \{x \in \mathbb{R}^p : N_x \text{ ist keine } q\text{-dimensionale Nullmenge}\} \subseteq \mathbb{R}^p.$$

M_1 ist Nullmenge nach dem Hilfssatz.

$$\Phi_k(x) = \int_{\mathbb{R}^q} \varphi_k(x, y) dy$$

existiert fast überall in $\mathbb{R}^p$, also ist

$$M_2 = \{x : \Phi_k(x) \text{ ex. nicht für (irgend-)ein } k \in \mathbb{N}\}$$

Nullmenge in $\mathbb{R}^p$. Es gilt

$$\int_{\mathbb{R}^p} \Phi_k(x) dx \stackrel{\text{Fubini für TF}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x, y) d(x, y) \leq \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d(x, y) = \text{const.}$$

Sei nun $x \in \{x : \Phi_k(x) > \Phi_{k+1}(x)\}$. Dann ist

$$\int_{\mathbb{R}^q} \varphi_k(x, y) dy > \int_{\mathbb{R}^q} \varphi_{k+1}(x, y) dy.$$

Also ist $\{y : \varphi_k(x, y) > \varphi_{k+1}(x, y)\}$ keine Nullmenge. Nach dem Hilfssatz ist es Nullmenge für fast alle x . Also gilt fast überall $\Phi_k(x) \leq \Phi_{k+1}(x)$ und

$$M_3 = \{x \in \mathbb{R}^p : \Phi_k(x) > \Phi_{k+1}(x) \text{ für (irgend-)ein } k\}$$

ist Nullmenge. Also ist Φ_k fast überall monoton wachsend.

Mit Beppo-Levi gilt dann: $\Phi_k(x) \rightarrow g(x) < +\infty$ fast überall für $k \rightarrow \infty$, und

$$M_4 = \{x \in \mathbb{R}^p : \Phi_k(x) \text{ nicht konvergent oder } \rightarrow +\infty\}$$

ist Nullmenge.

$g \in L^+(\mathbb{R}^p)$, $\int \Phi_k \rightarrow \int g$.

Für $x \notin M_1$ gilt $\varphi_k(x, y) \rightarrow f(x, y)$. Es ist dann

$$\begin{aligned} g(x) &\stackrel{x \notin M_4}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \Phi_k(x) \stackrel{x \notin M_2}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^q} \varphi_k(x, y) dy \\ &\stackrel{x \notin M_1}{=} \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

Also ist $g(x) = \int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy$ fast überall in $\mathbb{R}^p$ und $g \in L(\mathbb{R}^p)$. Damit ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^p} \left(\int_{\mathbb{R}^q} f(x, y) dy \right) dx &= \int_{\mathbb{R}^p} g(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^p} \Phi_k(x) dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^p} \left[\int_{\mathbb{R}^q} \underbrace{\varphi_k(x, y)}_{\text{TF}} dy \right] dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x, y) d(x, y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) d(x, y). \end{aligned}$$

10.4.6 Beispiel

für die Nichtanwendbarkeit des Satzes von Fubini für $n = 2$. Sei

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{(x+y)^3} & x, y > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zeige (als Aufgabe)

$$\int \left(\int f(x, y) dy \right) dx \neq \int \left(\int f(x, y) dx \right) dy$$

Damit ist $f \notin L(\mathbb{R}^2)$.

10.4.7 Satz von Tonelli

Sei $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ meßbar,

$$\int_{\mathbb{R}^q} |f(x, y)| dy$$

existiere für fast alle x und

$$\int_{\mathbb{R}^p} \left(\int_{\mathbb{R}^q} |f(x, y)| dy \right) dx$$

existiere. Dann gilt der Satz von Fubini.

Analogie zum Doppelreihensatz 2.6.8, Seite 41:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_{jk}| \right) < +\infty \implies \sum_{(j,k) \in \mathbb{N}^2} a_{jk} = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} \right).$$

Beweis: Zeige $f \in L(\mathbb{R}^n)$. Setze dafür

$$\varphi_k(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{in } [-k, k]^n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und

$$f_k(x, y) = \min(k, |f(x, y)| \cdot \varphi_k(x, y)).$$

Es ist $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$, denn f_k ist meßbar und hat $k \cdot \varphi_k$ als integrierbare Majorante. Außerdem ist fast überall $f_k \leq f_{k+1}$. Dann ist

$$\begin{aligned} \int f_k(x, y) d(x, y) &= \int_{\mathbb{R}^p} \int_{\mathbb{R}^q} \underbrace{f_k(x, y)}_{\substack{\leq |f(x, y)| \cdot \varphi_k(x, y) \\ \leq |f(x, y)|}} dy dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^p} \int_{\mathbb{R}^q} |f(x, y)| dy dx = \text{const.} \end{aligned}$$

Mit Beppo-Levi gilt dann

$$|f(x, y)| = \underbrace{\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x, y)}_{\in L(\mathbb{R}^n)} < +\infty \text{ fast überall.}$$

Damit ist $|f| \in L(\mathbb{R}^n)$. Zusammen mit der Voraussetzung, daß f meßbar ist, folgt dann $f \in L(\mathbb{R}^n)$.

10.4.8 Beispiel

Sei

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 1, x^2 + y^2 < \frac{1}{z^2} \right\}$$

und

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & (x, y, z) \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zu berechnen ist

$$\int f(x, y, z) d(x, y, z).$$

Es ist

$$E_z = \begin{cases} \{(x, y) : x^2 + y^2 < \frac{1}{z^2}\} & \text{für } z > 1 \\ \emptyset & \text{für } z \leq 1 \end{cases}.$$

 f ist meßbar und f ist unstetig auf ∂E . ∂E ist Nullmenge im $\mathbb{R}^3$ (später).

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} f(x, y, z) d(x, y, z) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^2} f(x, y, z) d(x, y) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}^2} 1 \cdot \chi_{E_z}(x, y) d(x, y) dz = \int_1^{\infty} \pi \frac{1}{z^2} dz = \pi. \end{aligned}$$

Später wird gesagt: Der Inhalt von E ist π .**10.5 Meßbare Mengen****10.5.1 Def.: Charakteristische Funktion, Meßbarkeit**Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann heißt

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

charakteristische Funktion von E . E heißt *meßbar*, wenn χ_E meßbar ist. Ist $\chi_E \in L(\mathbb{R}^n)$, so heißt

$$m(E) := \int \chi_E$$

(Lebesguesches) Maß von E .**10.5.2 Bemerkungen**

- (a) Ist E meßbar, aber χ_E nicht integrierbar, so setzt man $m(E) = +\infty$.
- (b) Ist $E_1 \subseteq E_2$ mit meßbarem E_2 , dann ist $m(E_1) \leq m(E_2)$, da $\chi_{E_1} \leq \chi_{E_2}$ ist.
- (c) Ist I Intervall, dann ist $m(I)$ der elementare Inhalt von I .
- (d) $N \subseteq \mathbb{R}^n$ ist genau dann Nullmenge, wenn $m(N) = 0$ ist.
- (e) Offene und abgeschlossene Mengen sind meßbar.
- (f) (i) ∂E ist nicht immer eine Nullmenge. Z. B. sei $E = \mathbf{Q}^n$. Dann ist $\partial E = \mathbb{R}^n$.
 (ii) ∂E sei Nullmenge, $E^0, \bar{E}$ sind meßbar und es ist $E^0 \subseteq E \subseteq \bar{E}$. Frage: Wenn F meßbar und N Nullmenge ist, ist dann $E = F \cup N$ meßbar?
 Es ist $\chi_F = \chi_E$ fast überall, also ist E meßbar.

Beweis:

(d) „ $\Rightarrow$ “: Sei N Nullmenge. Setze die Treppenfunktion $\varphi_k(x) = 0$ überall. Es ist $\varphi_k(x) \rightarrow 0 = \chi_N(x)$ fast überall für $k \rightarrow \infty$ und $\int \varphi_k = 0$. Mit Beppo-Levi folgt

$$m(N) = \int \chi_N = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k = 0.$$

„ $\Leftarrow$ “: Setze $\varphi_k = k \cdot \chi_N$. Es ist $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ überall und

$$\int \varphi_k = k \int \chi_N = 0.$$

Beppo-Levi: $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) < +\infty$ fast überall $\iff x \notin N$.

Also ist N eine Nullmenge.

(e) Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ offen. Früher wurde gezeigt: Wenn E beschränkt ist, ist χ_E fast überall stetig, also meßbar. Zu offenem E ist

$$E_k = E \cap (-k, k)^n$$

meßbar und $\chi_{E_k} \rightarrow \chi_E$. Damit ist χ_E auch meßbar. Zu abgeschlossenem E ist $F = \mathbb{R}^n \setminus E$ offen und

$$\chi_E = 1 - \chi_F$$

ist als Differenz zweier meßbarer Funktionen ebenfalls meßbar.

10.5.3 Satz

Ist $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ meßbar und $c \in \mathbb{R}$, so ist

$$E = \{x: f(x) < c\}$$

meßbar. Dies gilt ebenso für $\leq$, $>$ und $\geq$.

Beweis: Setze

$$\varphi_k(x) = \min(1, k \cdot (c - f(x))^+).$$

φ_k ist meßbar.

Für $x \in E$ ist $k \cdot (c - f(x))^+ > 1$ für $k \geq k_0$, d. h. $\varphi_k(x) = 1 = \chi_E(x)$ für $k \geq k_0$. Für $x \notin E$ ist $k \cdot (c - f(x))^+ = 0$, d. h. $\varphi_k(x) = 0$ für $k \in \mathbb{N}$ und $\varphi_k(x) \rightarrow 0 = \chi_E(x)$.

Da $\varphi_k \rightarrow \chi_E$ ist χ_E meßbar.

Aufgabe: Beweis für $\leq$.

10.5.4 Prinzip von Cavalieri

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar mit $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$, $(x, y) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ und $m(E) < \infty$. Sei

$$E_x := \{y: (x, y) \in E\} \subseteq \mathbb{R}^q.$$

Dann sind fast alle E_x meßbar in $\mathbb{R}^q$ mit

$$m_q(E_x) := \int \chi_{E_x}(y) dy < +\infty$$

und

$$m_n(E) = \int m_q(E_x) dx.$$

Umgekehrt: Ist $m_q(E_x) < +\infty$ fast überall, so gilt

$$m_n(E) = \int m_q(E_x) dx,$$

falls der rechte Term $< +\infty$ ist.

Beweis: Es ist

$$m_n(E) = \int \chi_E(x, y) d(x, y).$$

Mit Fubini gilt:

$$x \mapsto \int \chi_E(x, y) dy < +\infty$$

fast überall und in $L(\mathbb{R}^p)$. Außerdem ist

$$m_n(E) = \int_{\mathbb{R}^p} m_q(E_x) dx = \int_{\mathbb{R}^p} \int \chi_{E_x}(y) dy dx.$$

Die Umkehrung entspricht dem Satz von Tonelli, da $m_q > 0$ ist.

10.5.5 Definition: Integrierbarkeit über E

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar und $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. f heißt *integrierbar* über E , $f \in L(E)$, wenn ihre triviale Fortsetzung

$$f_0(x) = \begin{cases} f(x) & x \in E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

in $L(\mathbb{R}^n)$ ist. Man setzt

$$\int_E f = \int_E f(x) dx := \int f_0.$$

10.5.6 Definition: Ordinatenmengen

Sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar und $F: E \rightarrow [0, \infty)$. Dann heißt

$$E(f) := \{(x, y) : x \in E, 0 \leq y \leq f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Ordinatenmenge. Analoges gilt für $<$, $\leq$; $\leq$, $<$ und $<$, $<$.

Analog seien auch $f, g: E \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) \leq g(x)$:

$$E(f, g) = \{(x, y) : x \in E, f(x) \leq [<] y \leq [<] g(x)\}.$$

10.5.7 Satz

Sind f und g meßbar, so ist auch $E(f, g)$ meßbar.

Ist $g - f \in L(E)$, so ist

$$m_{n+1}(E(f, g)) = \int E(g(x) - f(x)) dx.$$

Beweis: Hier für $E(g) = E(0, g)$.

Zeige die Meßbarkeit. Dann wende Cavalieri an, da

$$(E(g))_x = \{y: 0 \leq y \leq g(x)\}$$

$$m_1((E(g))_x) = g(x).$$

Behauptung:

$$\chi_{E(g)}(x, y) = \chi_E(x) \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x, y)$$

mit

$$\varphi_k(x, y) = \min \left(1, k^2 \left[\left(y + \frac{1}{k} \right) \left(g(x) + \frac{1}{k} - y \right) \right]^+ \right).$$

Dabei ist $\varphi_k(x, y)$ meßbar.

Für $x \notin E$ ist $\chi_{E(g)}(x, y) = 0$ für alle $y \in \mathbb{R}$. Für $x \in E$ gilt:

Wenn $y > g(x)$ ist, ist

$$g(x) + \frac{1}{k} - y < 0 \text{ für } k \geq k_0$$

und $y + \frac{1}{k} > 0$.

Damit ist $[\dots]^+ = 0$ und $\varphi_k(x, y) = 0$.

Ist $y < 0$ dann ist genauso $\varphi_k(x, y) = 0$ für $k \geq k_0$.

Für $0 \leq y \leq g(x)$ und $(x, y) \in E(g)$ ist

$$y + \frac{1}{k} \geq \frac{1}{k}$$

und

$$g(x) + \frac{1}{k} - y \geq \frac{1}{k}.$$

Damit ist $[\dots]^+ \geq \frac{1}{k^2}$ und damit $\varphi_k(x, y) = 1$, $\chi_{E(g)} = 1$.

Zusammen folgt, daß $\chi_{E(g)}$ meßbar.

Aufgabe: Führe den Beweis für $\{(x, y): 0 < y \leq g(x)\}$.

10.5.8 Folgerung

Ist $f \in R([a, b])$, dann ist $\text{graph } f$ eine Nullmenge im $\mathbb{R}^2$ (vergleiche mit 10.1.3, Punkt (f)).

Jetzt: Ist $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ meßbar für meßbares $E \subseteq \mathbb{R}^n$, so ist

$$\text{graph } f = \{(x, f(x)): x \in E\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

eine $(n + 1)$ -dimensionale Nullmenge.

$$\text{graph } f = E(f, f)$$

ist meßbar mit dem Maß

$$\int_E f(x) - f(x) dx = 0.$$

10.5.9 Bemerkung

zum Beispiel 10.4.8, Seite 276. Es ist

$$E = \left\{ (x, y, z) : z > 1, x^2 + y^2 < \frac{1}{z^2} \right\}$$

$$F = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Es ist $f(x, y) = 1$ auf E und $g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ auf $E \setminus \{0\}$.

$E = F(f, g)$ ist meßbar, da f und g meßbar sind.

Dabei ist ∂E eine Nullmenge.

10.5.10 Beispiel: Maß der n -dimensionalen Kugel

Sei

$$K_n(r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$$

die n -dimensionale r -Kugel. Dann ist

$$m(K_n(r)) = c_n \cdot r^n$$

mit

$$c_1 = 2$$

$$c_{n+1} = 2 \cdot c_n \cdot \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} dt.$$

Zum Beispiel ist

$$c_2 = \pi$$

$$c_3 = \frac{4}{3}\pi.$$

Ohne Beweis gilt

$$c_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(1 + \frac{n}{2})}.$$

Beweis: Durch Induktion nach n :

$n = 1$: ✓

$n \mapsto n + 1$: Sei $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ und $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$.

Es ist

$$K_{n+1}(r) = \{(x, y) : \|x\|^2 + y^2 \leq r^2\}$$

$$= \{(x, y) : \|x\| \leq r, |y| \leq \sqrt{r^2 - \|x\|^2}\}$$

und

$$(K_{n+1}(r))_y = K_n(\sqrt{r^2 - y^2}).$$

Mit dem Prinzip von Cavalieri gilt dann

$$\begin{aligned}
 m_{n+1}(K_{n+1}(r)) &= \int_{-r}^r m_n((K_{n+1}(r))_y) dy = \int_{-r}^r c_n \left(\sqrt{r^2 - y^2}\right)^n dy \\
 &= 2c_n \int_0^r (r^2 - y^2)^{n/2} dy = \left| \begin{array}{l} y = r \sin t \\ dy = r \cos t dt \end{array} \right| \\
 &= 2c_n \int_0^{\pi/2} r^n (\cos t)^n \cdot r \cdot \cos t dt = 2c_n r^{n+1} \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} dt \\
 &= c_{n+1} \cdot r^{n+1}.
 \end{aligned}$$

Zeige nun $c_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$:

$$c_{n+1} = c_n \cdot 2 \int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} dt$$

Dabei ist $\int_0^{\pi/2} (\cos t)^{n+1} dt \rightarrow 0$.

Für $n \geq n_0$ ist $c_{n+1} \leq \frac{2}{3}c_n$.

10.5.11 Rotationskörper im $\mathbb{R}^3$

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f: I \rightarrow [0, \infty)$. Setze den Rotationskörper

$$R = \{(x, y, z) : x \in I, y^2 + z^2 \leq (f(x))^2\}.$$

Wenn $f^2 \in L(\mathbb{R})$ ist, dann ist

$$m_3(R) = \pi \int_I (f(x))^2 dx.$$

Wende den Satz von Cavalieri auf $\mathbb{R}$ an: Betrachte R_x für $x \in I$:

$$R_x = \{(y, z) : y^2 + z^2 \leq (f(x))^2\}$$

$$m_2(R_x) = \pi (f(x))^2$$

$$m_3(R) = \pi \int_I (f(x))^2 dx$$

10.5.12 Satz

Sind $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar, so sind auch $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ und insbesondere $\mathbb{R}^n \setminus B$ meßbar und es gilt

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B).$$

Beweis:

$$\chi_{A \setminus B} = \chi_A \cdot (1 - \chi_B)$$

$$\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B$$

$$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}$$

sind allesamt meßbar.

Also ist

$$\begin{aligned}\chi_{A \cup B} + \chi_{A \cap B} &= \chi_A + \chi_B \\ \int \chi_{A \cup B} + \int \chi_{A \cap B} &= \int \chi_A + \int \chi_B.\end{aligned}$$

Aufgabe: Zeige dies per Induktion auch für endlich viele $A_1, \dots, A_m$.

10.5.13 Satz

Sind $A_1, A_2, \dots \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar und

$$V = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \text{ und } D = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k,$$

so sind V und D meßbar, und es ist

$$m(V) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(A_k).$$

Speziell gilt:

(a) $m(V) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k)$, falls $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$.

(b) $m(D) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k)$, falls $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$.

(c) $m(V) = \sum_{k=1}^{\infty} m(A_k)$, falls $A_j \cap A_k = \emptyset$ oder Nullmenge für $i \neq k$ ist (σ -Additivität des Lebesguemaßes).

Beweis: $D_k = A_1 \cap \dots \cap A_k$ und $V_k = A_1 \cup \dots \cup A_k$ sind meßbar mit

$$\chi_{D_k} = \chi_{A_1} \cdots \chi_{A_k} \text{ und } \chi_{V_k} = \min(1, \chi_{A_1} + \dots + \chi_{A_k}).$$

$\chi_D = \lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{D_k}$ ($\searrow$) ist meßbar und

$\chi_V = \lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{V_k}$ ($\nearrow$) ist meßbar.

$$\begin{aligned}m(V) &= \int \chi_V = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \chi_{V_k} \text{ (Beppo-Levi, falls konvergent)} \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int \chi_{A_1} + \dots + \int \chi_{A_k} \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(A_j).\end{aligned}$$

(a) $V_k = A_k$: $m(V) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k)$

(b) $D_k = A_k$: $m(D) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(D_k)$

(c) „ $\leq$ “: siehe oben $\checkmark$

„ $\geq$ “: Es ist $\chi_{A_1} + \dots + \chi_{A_k}$ nur in einer Nullmenge, also ist fast überall

$$\chi_{V_k} = \chi_{A_1} + \dots + \chi_{A_k}.$$

Damit ist

$$m(V_k) = \sum_{j=1}^k m(A_j)$$

und für $k \rightarrow \infty$ ist

$$m(V) = \sum_{j=1}^{\infty} m(A_j).$$

10.5.14 Beispiel einer nicht meßbaren Menge in $\mathbb{R}$

Die Relation

$$x \sim y : \iff x - y \in \mathbf{Q}$$

ist eine Äquivalenzrelation mit den Äquivalenzklassen $[x]$. Es ist entweder $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] = \emptyset$. Sei A Vertretersystem in $[0, 1)$, d. h. zu jedem $x \in \mathbb{R}$ gibt es genau ein $\xi \in A$ mit $\xi \in [x]$, sprich $\xi \sim x$ (Auswahlaxiom, äquivalent zum Lemma von Zorn, Wohlordnungssatz).

Die Menge A ist nicht meßbar.

Beweis: Setze

$$A + r := \{a + r : a \in A, r \in \mathbf{Q}, 0 \leq r < 1\}$$

und

$$A_r := \{a + r : a \in A, a + r < 1\} \cup \{a + r - 1 : a \in A, a + r \geq 1\}.$$

Zeige

(1) $A_r \cap A_s = \emptyset$ für $r \neq s$.

(2) $\bigcup_{r \in [0, 1)} A_r = [0, 1)$.

Wenn dann nun A meßbar wäre, dann auch $A + r$ mit $m(A + r) = m(A)$.

Ebenso wäre $m(A_r) = m(A) = m(A_0)$. Damit ist

$$1 = m([0, 1)) = \sum_{r \in [0, 1)} m(A_r) = \sum_{r \in [0, 1)} m(A) = 0.$$

WIDERSPRUCH! Also kann A nicht meßbar sein.

ad (1): Sei $x \in A_r \cap A_s$ mit $0 \leq r, s < 1$ und $r \neq s$.

Es existieren $a \in A$ und $b \in A$ mit

$$x = a + r \text{ oder } a + r - 1$$

$$x = b + s \text{ oder } b + s - 1.$$

Subtraktion liefert

$$a - b = s - r \in \mathbf{Q}.$$

Damit ist $a \sim b$.

Daraus folgt nach der Konstruktion von A , daß $a = b$ und damit $r = s$ sein muß. Dies ist ein WIDERSPRUCH! Also muß $A_r \cap A_s$ für $r \neq s$ eine leere Menge sein.

ad (2): „ $\subseteq$ “:

$$\bigcup_{r \in [0,1)} A_r \subseteq [0, 1)$$

ist klar, weil $A_r \subseteq [0, 1)$ ist.

„ $\supseteq$ “: Sei $x \in [0, 1)$: $x \sim a$ für ein $a \in A$.

Damit ist $x - a = r \in \mathbf{Q}$ und $-1 < x - a < 1$, $x \in A + r$, $x \in A_r$.

Für $0 \leq r < 1$ gilt: $x \in A_r$.

Für $-1 < r < 0$ gilt: $x = a + r + 1 - 1 \in A_s = A_{r+1}$ mit $s = r + 1 \in (0, 1)$, weil $a + s \geq 1$ ist.

10.5.15 Satz, absolute Stetigkeit des L-Integrals

Sei $f \in L(\mathbb{R}^n)$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gibt es

(a) $f = g + h$ mit $g, h \in L(\mathbb{R}^n)$, g beschränkt und $\int |h| < \varepsilon$.

(b) ein $\delta > 0$ mit

$$\int_E |f| < \varepsilon$$

für jede meßbare Menge mit $m(E) < \delta$
(Absolute Stetigkeit des Lebesgue-Integrals).

Beweis:

1. Setze

$$f_k = \begin{cases} k & \text{wo } f > k \\ -k & \text{wo } f < -k \\ f & \text{sonst} \end{cases}$$

Es ist $|f_k| \leq k$, $|f_k| \leq |f|$ und $f_k \rightarrow f$ überall für $k \rightarrow \infty$.

Nach dem Satz von Lebesgue gilt für $k \rightarrow \infty$

$$\int f_k \rightarrow \int f.$$

Es ist auch aus demselben Grund für $k \rightarrow \infty$

$$\int |f - f_k| \rightarrow 0,$$

denn es ist $|f - f_k| \leq 2|f|$.

Wähle k so, daß $\int |f - f_k| < \varepsilon$ ist.

$g = f_k$ ist beschränkt durch k . Setze $h = f - f_k$. Dann ist $\int |h| < \varepsilon$ und $f = g + h$.

2. Sei $f = g + h$ mit $|g| \leq M$ und $\int |h| < \varepsilon/2$ (geht nach Teil (a)) und $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$.

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ sei meßbar und $m(E) < \delta$. Dann ist

$$\begin{aligned} \int_E |f| &< \int_E |g| + \int_E |h| \\ &\leq M \cdot m(E) + \int_{\mathbb{R}^n} |h| < M \cdot \delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

10.6 Die Transformationsformel

10.6.1 Motivation

Im Abschnitt 5.3.6 auf der Seite 105 wird gezeigt:

Für $f \in R([a, b])$, $\Phi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, bijektiv und stetig differenzierbar, gilt die Substitutionsregel:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\Phi(t)) \cdot \Phi'(t) dt.$$

Was gibt es für Möglichkeiten beim Lebesgue-Integral?

10.6.2 Die Transformationsformel

Seien $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $\Phi: U \rightarrow V$ ein Diffeomorphismus (d. h. Φ ist bijektiv und Φ, Φ^{-1} sind stetig differenzierbar). Dann gilt

$$\int_V f(x) dx = \int_U f(\Phi(t)) \cdot |\det \Phi'(t)| dt,$$

wenn eine von beiden Seiten als Lebesgue-Integral existiert.

$$\left(\int_V g(\Phi^{-1}(x)) \cdot |\det(\Phi^{-1})'(x)| dx = \int_U g(t) dt \right)$$

Beweis: Später.

10.6.3 Satz (Spezialfall von 10.6.2)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix, $b \in \mathbb{R}^n$ und $\Phi(x) := Ax + b$. Dann gilt:

$$m(\Phi(E)) = |\det A| \cdot m(E) \tag{10.1}$$

für jedes meßbare $E \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $m(E) < \infty$.

Beweis:

- (1) Sei $\Phi(x) = x + b$ eine Verschiebung und E ein Intervall mit der zugehörigen charakteristischen Funktion χ_E . $\Phi(E)$ ist ebenfalls ein Intervall mit $m(\Phi(E)) = 1 \cdot m(E)$. Es ist $1 = |\det(\text{Einheitsmatrix})|$. (10.1) gilt für $E = \text{endl. Vereinigung von Intervallen}$.

$$(10.1) \iff \int \chi_{\Phi(E)}(x) dx = \int_E \chi_E(x) dx$$

$$\chi_{\Phi(E)}(x) = \chi_E(x - b)$$

$$(10.1) \iff \int \chi_E(x - b) dx = \int \chi_E(x)$$

$E = \text{endl. Vereinigung von Intervallen}$.

Grenzübergang: Für jede meßbare Menge E mit $m(E) < \infty$.

$$[E \text{ meßbar} \iff \chi_E \text{ meßbar} \iff \exists \varphi_k \text{ TF: } \varphi_k \rightarrow \chi_E \text{ f.ü.}]$$

(2) Sei $\Phi(x) = Ax$:

(a) Sei $\det A = 0$. Dann ist $\Phi(E) \subseteq H$. H ist Hyperebene des $\mathbb{R}^n$, also ist $m(\Phi(E)) \leq m(H) = 0$ und $|\det A| \cdot m(E) = 0$.

(b) Sei

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

E sei Intervall mit den Kantenlängen $\ell_1, \dots, \ell_n$. Dann ist $\Phi(E)$ ein Intervall mit den Kantenlängen $|\lambda_1|\ell_1, \dots, |\lambda_n|\ell_n$.

$$m(\Phi(E)) = |\lambda_1 \dots \lambda_n| \cdot \ell_1 \dots \ell_n = |\det A| \cdot m(E)$$

$$\int_{\Phi(E)} \chi_E(x) dx = \left(\int_E \chi_E(x) dx \right) \cdot |\det A|$$

Wie unter (1) schließt man auf meßbare Mengen E mit $m(E) < \infty$.

(c) Sei nun $\Phi(x) = Ax$ mit $\det A \neq 0$.

Setze $W = [0, 1]^n$ der Einheitswürfel und

$$\alpha(A) := m(\Phi(W)).$$

Zeige, daß die folgende Gleichung gilt:

$$\alpha(A) = |\det A|.$$

Setze

$$\begin{aligned} E &= a + [0, \ell]^n = \{a + x : 0 \leq x_\nu \leq \ell \text{ für } \nu = 1, \dots, n\} \\ &= a + \Psi(W). \end{aligned}$$

Dabei ist

$$\Psi(x) = \ell x$$

und damit

$$\begin{aligned} m(\Phi(E)) &\stackrel{(1)}{=} m(\Phi(\Psi(W))) = m(\Psi(\Phi(W))) \\ &\stackrel{(b)}{=} \underbrace{\ell^n}_{=m(E)} \cdot \underbrace{m(\Phi(W))}_{=\alpha(A)} = \alpha(A) \cdot m(E). \end{aligned}$$

Genauer gesagt, ist für Würfel $E \subseteq \mathbb{R}^n$

$$m(\Phi(E)) = \alpha(A) \cdot m(E).$$

Dasselbe gilt für meßbares E (Zeige dies als Aufgabe. Schließe dabei von Würfeln auf Intervalle).

Wenn E offen ist, dann ist E die Vereinigung von sich nicht überlappenden Würfeln.

Die Beziehung $\alpha(A) = |\det A|$ ist richtig für

(i) $\det A = 0$. Dies wurde in (2a) gezeigt.

(ii) $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Dies wurde in (2b) gezeigt.

(iii) orthogonales A ($A^T A = E_n =$ Einheitsmatrix). Dies wird in (d) gezeigt.

(iv) beliebiges A mit $\det A \neq 0$. Dies wird in (e) gezeigt.

(d) Sei nun A orthogonal, d.h. es ist $A^T A = E_n$.

Setze $E = K(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$.

$$A^T \cdot A = E_n \Rightarrow \Phi(E) = E$$

$$m(\Phi(E)) = m(E) = \alpha(A) \cdot m(E)$$

$$\Rightarrow \alpha(A) = 1$$

$$1 = \det A \cdot \det A^T = (\det A)^2$$

$$\Rightarrow |\det A| = 1.$$

(e) Sei nun A beliebig mit $\det A \neq 0$.

$A^T \cdot A$ ist symmetrisch und positiv definit, also ist $A^T \cdot A = S^T \cdot D \cdot S$ mit einer orthogonalen Matrix S und $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ mit $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$, den Eigenwerten von $A^T \cdot A$ (Hauptachsentransformation für $A^T \cdot A$).

Setze

$$\Delta = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \quad \Delta^2 = D.$$

Dann ist

$$\Delta^{-1} \cdot D \cdot \Delta^{-1} = E_n$$

und

$$S \cdot A^T \cdot A \cdot S^T = S \cdot (S^T \cdot D \cdot S) \cdot S^T = D = \Delta \cdot \Delta.$$

Es ist

$$\begin{aligned} E_n &= \Delta^{-1} \cdot D \cdot \Delta^{-1} = \underbrace{\Delta^{-1} \cdot S \cdot A^T}_{:=S_1} \cdot A \cdot S^T \cdot \Delta^{-1} \\ S_1 \cdot S_1^T &= \Delta^{-1} \underbrace{S \cdot A^T \cdot A \cdot S^T}_{=D} \cdot \Delta^{-1} = E_n \end{aligned}$$

Also ist S_1 orthogonal und

$$\begin{aligned} E_n &= S_1 \cdot A \cdot S^T \cdot \Delta^{-1} \\ \underbrace{\alpha(E)}_1 &\stackrel{(\neq)}{=} \underbrace{\alpha(S_1)}_1 \cdot \alpha(A) \cdot \underbrace{\alpha(S^T)}_1 \cdot \underbrace{\alpha(\Delta^{-1})}_{|\det(\Delta^{-1})|} \\ \Rightarrow \alpha(A) &= \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\lambda_1} \cdots \frac{1}{\lambda_n}}} = \sqrt{\lambda_1 \cdots \lambda_n}. \end{aligned}$$

Es ist

$$|\det A| = \sqrt{\det(A^T \cdot A)} = \sqrt{\lambda_1 \cdots \lambda_n}$$

Also ist $\alpha(A) = |\det a|$.

Nachtrag zu ($\neq$):

Seien A und B $n \times n$ -Matrizen. Dann ist

$$\alpha(AB) = \alpha(A)\alpha(B).$$

Beweis: $\alpha(AB), \Phi(x) = Ax, \Psi(x) = Bx.$
 $m(\Phi(E)) = \alpha(A) \cdot m(E):$

$$\alpha(AB) \cdot m(E) = m(\Phi(\Psi(E))) = \alpha(A) \cdot m(\Psi(E)) = \alpha(A) \cdot \alpha(B) \cdot m(E).$$

Also ist $\alpha(AB) = \alpha(A) \cdot \alpha(B).$

Bis hierhin ist bewiesen, daß für $\Phi(x) = Ax + b$ gilt: $m(\Phi(E)) = |\det A| \cdot m(E).$

10.6.4 Hilfssatz 1

Sei $\Phi \in C^1(K(0, \varrho), \mathbb{R}^n)$ und W_k Folge von Würfeln mit $0 \in W_k$ und $\text{diam } W_k \rightarrow 0.$ Dabei ist $\text{diam } E = \sup\{\|x - y\| : x, y \in E\}$ der Durchmesser von $E.$ Dann gelten folgende Aussagen:

(a) Für $k \rightarrow \infty$ ist

$$\frac{1}{m(W_k)} \int_{W_k} |\det \Phi'(x)| \rightarrow |\det \Phi'(0)|.$$

(b) Für $k \rightarrow \infty$ ist

$$\frac{m(\Phi(W_k))}{m(W_k)} \rightarrow |\det \Phi'(0)|.$$

Beweis:

(a) Als Aufgabe. Sogar für stetige f gilt

$$\frac{1}{m(W_k)} \int_{W_k} f(x) dx \rightarrow f(0).$$

(b) (i) Sei zuerst $\Phi'(0) = E_n$ die Einheitsmatrix im $\mathbb{R}^n,$ d.h. es ist $\Phi(x) = x + r(x) \cdot \|x\|$ mit $r(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0.$

Sei nun $\varepsilon > 0$ und $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}.$ Dazu existiert ein $\delta > 0$ mit $\|r(x)\| < \varepsilon$ für $\|x\| < \delta.$

Für $k \geq k_0$ gilt: $W_k \subseteq K(0, \delta).$

Sei nun $y = \Phi(x)$ mit $x \in W_k.$ Dann ist

$$y_\nu = x_\nu + \underbrace{\|x\|}_{\leq \sqrt{n} \cdot \ell_k} \cdot \underbrace{r_\nu(x)}_{|\cdot| < \varepsilon}$$

Für W_k gilt dann

$$\begin{aligned} \Phi(W_k) \subseteq & [-\sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_1^{(k)}, \sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_1^{(k)} + \ell_k] \\ & \times \cdots \times [-\sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_n^{(k)}, \sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_n^{(k)} + \ell_k] \end{aligned} \quad (10.2)$$

und

$$\begin{aligned} \Phi(W_k) \supseteq & [+ \sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_1^{(k)}, -\sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_1^{(k)} + \ell_k] \\ & \times \cdots \times [+ \sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_n^{(k)}, -\sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \varepsilon + a_n^{(k)} + \ell_k] \end{aligned} \quad (10.3)$$

Also

$$\begin{aligned} \ell_k^n \cdot (1 - 2\sqrt{n} \cdot \varepsilon)^n & \leq m(\Phi(W_k)) \leq \ell_k^n \cdot (1 + 2\sqrt{n} \cdot \varepsilon)^n \\ \underbrace{(1 - 2\sqrt{n} \cdot \varepsilon)^n - 1}_{> -\text{const} \cdot \varepsilon} & \leq \frac{m(\Phi(W_k))}{m(W_k)} - 1 \leq \underbrace{(1 + 2\sqrt{n} \cdot \varepsilon)^n - 1}_{< \text{const} \cdot \varepsilon} \end{aligned}$$

für $k \geq k_0$.

$$\Rightarrow \frac{m(\Phi(W_k))}{m(W_k)} \rightarrow 1 = |\det \Phi'(0)|$$

für $k \rightarrow \infty$.

(ii) Allgemeiner Fall. Sei $\Phi'(0) = A$. Zuerst sei $\det A \neq 0$.

Sei $\Phi(x) = A^{-1} \cdot \Psi(x)$. Damit ist $\Phi'(0) = E_n$.

$$\begin{aligned} &= \frac{m(A\Psi(W_k))}{m(W_k)} \\ &\stackrel{\odot}{=} |\det A| \cdot \frac{m(\Psi(W_k))}{m(W_k)} \\ &\stackrel{\otimes}{\rightarrow} |\det A| \cdot 1 \end{aligned}$$

($\odot$: Satz; $\otimes$: Spezialfall).

Sei nun $\Phi'(0) = A$ mit $\det A = 0$. Dann ist

$$\Phi(x) = Ax + \|x\| \cdot r(x) = Ax + f(x).$$

Es ist $\Phi(W_k) \subseteq H + f(W_k)$ mit einer Hyperebene H und $m(H) = 0$.

Für f gilt dabei:

$$f(W_k) = \left[-\sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \max_{x \in W_k} \|r(x)\|, \sqrt{n} \cdot \ell_k \cdot \max_{x \in W_k} \|r(x)\| \right]^n$$

mit

$$m(f(W_k)) = (2\sqrt{n} \cdot \ell_k)^n \cdot \varepsilon^n.$$

Daraus folgt dann:

$$\begin{aligned} \frac{m(f(W_k))}{m(W_k)} &\leq (2\varepsilon\sqrt{n})^n \\ \frac{m(f(W_k))}{m(W_k)} &\rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

10.6.5 Hilfssatz 2

(Satz über die Nullmengentreue)

Sei $\Phi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, U offen und $N \subseteq U$ eine Nullmenge. Dann ist $\Phi(N)$ eine Nullmenge.

Beweis: Sei $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} W_k$ mit kompakten Würfeln $W_k \subseteq U$.

Dann ist Φ auf W_k Lipschitzstetig, d. h.

$$\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq L_k \cdot \|x - y\|.$$

Sei nun $N_k = N \cap W_k$. Zeige, daß $\Phi(N_k)$ eine Nullmenge ist. Dann ist auch

$$\Phi(N) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Phi(N_k)$$

eine Nullmenge.

Nachweis, daß $\Phi(N_k)$ eine Nullmenge ist:

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig.

Dann existieren Würfel I_ν mit $N_k \subseteq \bigcup_{\nu=1}^{\infty} I_\nu$ und $\sum_{\nu=1}^{\infty} m(I_\nu) < \varepsilon$.

Also hat $\Phi(I_\nu)$ höchstens den L_k -fachen Durchmesser von I_ν ,

d. h. es existiert ein Würfel $J_\nu \supseteq \Phi(I_\nu)$ mit höchstens L_k -facher Kantenlänge von I_ν .

$$\begin{aligned} &\Rightarrow m(J_\nu) \leq (L_k)^n \cdot m(I_\nu) \\ &\Rightarrow \Phi(N_k) \subseteq \bigcup_{\nu=1}^{\infty} \Phi(I_\nu) \subseteq \bigcup_{\nu=1}^{\infty} J_\nu \end{aligned}$$

und damit

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} m(J_\nu) \leq (L_k)^n \cdot \sum_{\nu=1}^{\infty} m(I_\nu) \leq (L_k)^n \cdot \varepsilon$$

Also ist $\Phi(N_k)$ eine Nullmenge.

10.6.6 Hilfssatz 3

Sei $\Phi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und Φ injektiv. Insbesondere sei $\det(\Phi'(x)) \neq 0$ für alle $x \in U$. Dann gilt für jeden Würfel $W \subseteq U$:

$$m(\Phi(W)) = \int_W |\det \Phi'(x)| dx.$$

Beweis: Setze $W_0 = W$ und definiere $\alpha \in \mathbb{R}$ durch

$$m(\Phi(W)) = \alpha \cdot \int_W |\det \Phi'(x)| dx.$$

Zu zeigen ist nun: $\alpha = 1$.

Zerlege W_0 in 2^n kompakte, gleich große Würfel I_ν mit halber Kantenlänge.

Klar ist:

$$m(W_0) = \sum_{\nu=1}^{2^n} m(I_\nu).$$

Es gilt dann:

$$m(\Phi(W_0)) = \sum_{\nu=1}^{2^n} m(\Phi(I_\nu)),$$

denn es ist

$$W_0 = \left(\bigcup_{\nu=1}^{2^n} (I_\nu)^0 \right) \cup \underbrace{\left(\bigcup_{\nu=1}^{2^n} \partial I_\nu \right)}_{\text{Nullmenge}}.$$

Damit ist (weil Φ injektiv ist)

$$\Phi(W_0) = \left(\bigcup_{\nu=1}^{2^n} \Phi(I_\nu)^0 \right) \cup \underbrace{\left(\Phi \left(\bigcup_{\nu=1}^{2^n} \partial I_\nu \right) \right)}_{\text{Nullmenge nach HS 2}}.$$

Daraus folgt

$$m(\Phi(W_0)) = \sum_{\nu=1}^{2^n} m(\Phi((I_\nu)^0)) + 0 = \sum_{\nu=1}^{2^n} m(\Phi(I_\nu)).$$

Andererseits gilt ebenso

$$m(\Phi(W_0)) = \alpha \int_{W_0} |\det \Phi'(x)| dx = \sum_{\nu=1}^{2^n} \alpha \cdot \int_{I_\nu} |\det \Phi'(x)| dx.$$

Also existiert ein ν_0 mit

$$m(\Phi(I_{\nu_0})) \geq \alpha \cdot \int_{I_{\nu_0}} |\det \Phi'(x)| dx.$$

Setze $W_1 = I_{\nu_0}$. Genauso erhält man induktiv eine Folge von Würfeln W_k mit $W_k \subseteq W_{k-1}$, in der W_k die halbe Kantenlänge von W_{k-1} hat und für die gilt:

$$m(\Phi(W_k)) \geq \alpha \cdot \int_{W_k} |\det \Phi'(x)| dx.$$

Daraus folgt, daß es ein $\xi \in U$ gibt mit

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} W_k = \{\xi\}.$$

Teile nun die Ungleichung durch $m(W_k)$:

$$\frac{m(\Phi(W_k))}{m(W_k)} \geq \frac{1}{m(W_k)} \cdot \alpha \int_{W_k} |\det \Phi'(x)| dx.$$

Wende auf die linke Seite den Teil (a) und auf die rechte Seite Teil (b) vom Hilfssatz 1 an. Dann ist für $k \rightarrow \infty$:

$$|\det \Phi'(\xi)| \geq \alpha \cdot |\det \Phi'(\xi)|.$$

Also ist $\alpha \leq 1$. Zeige auf die gleiche Weise nun, daß $\alpha \geq 1$ ist. Damit ist dann die Behauptung bewiesen.

10.6.7 Hilfssatz 4

Sei $\Phi: U \rightarrow V$ eine Diffeomorphismus, d. h. $\Phi \in C^1(U, V)$, Φ ist bijektiv und $\Phi^{-1} \in C^1(U, V)$. Dabei seien U und V offene Mengen. Dann gilt:

$$m(V) = \int_U |\det \Phi'(x)| dx,$$

falls eine der Seiten endlich ist.

Beweis: Seien W_k kompakte Würfel mit

$$U = \bigcup_{k=1}^{\infty} W_k.$$

Dabei sei $W_k \cap W_j$ für $k \neq j$ eine Nullmenge. Dann gilt nach dem Hilfssatz 3

$$m(\Phi(W_k)) = \int_{W_k} |\det \Phi'(x)| dx$$

und dann

$$m(V) \stackrel{\text{HS2}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} m(\Phi(W_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{W_k} |\det \Phi'(x)| dx \stackrel{\oplus}{=} \int_U |\det \Phi'(x)| dx.$$

Dabei gilt $\oplus$ wegen Beppo-Levi für Reihen mit

$$f_k(x) = \begin{cases} |\det \Phi'(x)| & \text{für } x \in W_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

10.6.8 Beweis der Transformationsformel

Wiederholung der Transformationsformel:

Sei $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $\Phi(U, V)$ ein Diffeomorphismus. Dann gilt:

$$\int_U f(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)| dx = \int_V f(y) dy,$$

falls eines der Integrale existiert.

Oder

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

Beweis: Sei $f = \varphi$ eine Treppenfunktion, $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}$, etwa:

$$\varphi(x) = \begin{cases} c_j & \text{im Würfel } I_j^0 \subseteq V \text{ für } j = 1, \dots, p \\ 0 & \text{außerhalb aller } \bar{I}_j \end{cases}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \int_V \varphi(y) dy &= \sum_{j=1}^p \int_{I_j} \varphi(y) dy = \sum_{j=1}^p c_j \cdot m((I_j)^0) \\ &\stackrel{\text{HS4}}{=} \sum_{j=1}^p c_j \int_{U_j} |\det \Phi'(x)| dx \end{aligned}$$

mit $U_j = \Phi^{-1}((I_j)^0)$ ist hierfür

$$= \sum_{j=1}^p \int_{U_j} \varphi(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)| dx = \int_U \varphi(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)| dx,$$

d. h. die Transformationsformel gilt für alle Treppenfunktionen $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}$. Also gilt die Transformationsformel für $f \in L^+(V)$, denn $\varphi_k \nearrow f$ mit $\int \varphi_k \rightarrow \int f$:

$$\begin{aligned} \int_V f(y) dy &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_V \varphi_k(y) dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_U \underbrace{\varphi_k(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)|}_{\nearrow f(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)|} dx \\ &\stackrel{\text{B-L}}{=} \int_U f(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)| dx. \end{aligned}$$

Also gilt die Transformationsformel auch für $f \in L(V)$. Zeige nun noch: Auch aus der Existenz von

$$\int_U f(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)| dx$$

folgt die Formel.

Setze $\Psi(y) = \Phi^{-1}(y)$, Ψ Diffeomorphismus und $g(x) := f(\Phi(x)) \cdot |\det \Phi'(x)|$.

Nach Voraussetzung existiert $\int_U g(x) dx$.

$$\begin{aligned} \int_U g(x) dx &= \int_V g(\Psi(y)) \cdot |\det \Psi'(y)| dy \\ &= \int_V f(y) \cdot \underbrace{|\det \Psi'(y)| \cdot |\det(\Phi'(\Psi(y)))|}_{=1} dy = \int_V f(y) dy. \end{aligned}$$

10.6.9 Spezielle Transformationen

(a) Polarkoordinaten im $\mathbb{R}^2$: Setze

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ r^2 &= x^2 + y^2 \\ \Phi(r, \theta) &= \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

mit $\Phi: (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$. Es ist

$$\det \Phi' = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r > 0.$$

Für $f \in L(\mathbb{R}^2)$ gilt dann:

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d(x, y) = \int_P f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r d(r, \theta) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r d\theta dr.$$

(b) Kugelkoordinaten im $\mathbb{R}^3$: Setze

$$\begin{aligned} x &= r \cos \lambda \cdot \cos \beta \\ y &= r \sin \lambda \cdot \cos \beta \\ z &= r \sin \beta. \end{aligned}$$

Dabei ist λ die geographische Länge, β die Breite und $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ der quadrierte, zum Punkt (x, y, z) gehörige Radius.

Es ist $0 \leq \lambda \leq 2\pi$ (oder $-\pi \leq \lambda \leq \pi$ und $-\pi/2 \leq \beta \leq \pi/2$).

Herleitung: Setze $z = r \sin \beta$ mit $-\pi/2 \leq \beta \leq \pi/2$

$$x^2 + y^2 = r^2 - r^2 \sin^2 \beta = (r \cos \beta)^2$$

Polarkoordinaten für (x, y) :

$$x = (r \cos \beta) \cos \lambda$$

$$y = (r \cos \beta) \sin \lambda.$$

Also:

$$\Phi(r, \lambda, \beta) = \begin{pmatrix} r \cos \lambda \cos \beta \\ r \sin \lambda \cos \beta \\ r \sin \beta \end{pmatrix}$$

mit $0 < r < \infty$, $0 < \lambda < 2\pi$ [$-\pi < \lambda < \pi$] und $-\pi/2 < \beta < \pi/2$.

$$\Phi: (0, \infty) \times (0, 2\pi) \times (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus N$$

ist Diffeomorphismus mit einer Nullmenge

$$N = \{(r \cos \beta, 0, r \sin \beta) : r \geq 0, -\pi/2 \leq \beta \leq \pi/2\} = \{(x, 0, z) : (x, z) \in \mathbb{R}^2, x \geq 0\}$$

und

$$\det \Phi' = \begin{vmatrix} \cos \lambda \cos \beta & -r \sin \lambda \cos \beta & -r \cos \lambda \sin \beta \\ \sin \lambda \cos \beta & r \cos \lambda \cos \beta & -r \sin \lambda \sin \beta \\ \sin \beta & 0 & r \cos \beta \end{vmatrix} = r^2 \cos \beta > 0.$$

Zusammen ist

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(x, y, z) d(x, y, z) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\Phi(r, \lambda, \beta)) \cdot r^2 \cdot \cos \beta d\beta d\lambda dr.$$

(c) Zylinderkoordinaten: Setze

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

mit $r^2 = x^2 + y^2$ und $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\Phi(r, \theta, z) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z \end{pmatrix}$$

$$\det \Phi' = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

(d) Kugelkoordinaten im $\mathbb{R}^n$:

Sei $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ mit $\|x\| = r$.

$$x = \Phi_n(r, \theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n-2})$$

z. B.

$$\begin{aligned} \Phi_2(r, \theta_0) &= r \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \\ \sin \theta_0 \end{pmatrix} \\ \Phi_3(r, \theta_0, \theta_1) &= r \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_0 \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix} \\ \Phi_n(r, \theta_0, \dots, \theta_{n-2}) &= r \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \cdot \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-3} \cdot \cos \theta_{n-2} \\ \sin \theta_0 \cdot \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-3} \cdot \cos \theta_{n-2} \\ \sin \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \dots \cos \theta_{n-3} \cdot \cos \theta_{n-2} \\ \vdots \\ \sin \theta_{n-3} \cdot \cos \theta_{n-2} \\ \sin \theta_{n-2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und es ist

$$\det \Phi'_n = r^{n-1} (\cos \theta_1) (\cos \theta_2)^2 (\cos \theta_3)^3 \dots (\cos \theta_{n-2})^{n-2}$$

unter den Bedingungen $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \theta_0 \leq 2\pi$, $-\pi/2 \leq \theta_j \leq \pi/2$ für $j = 1, \dots, n-2$.

Herleitung: Setze $x_n = r \sin \theta_{n-2}$ für $-\pi/2 \leq \theta_{n-2} \leq \pi/2$.

$\|x\| = r$, $\bar{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$

$$\|\bar{x}\|_{\mathbb{R}^{n-1}}^2 = r^2 - r^2 \sin^2 \theta_{n-2} = (r \cos \theta_{n-2})^2$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} \bar{x} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi_{n-1}(r \cos \theta_{n-2}, \theta_0, \dots, \theta_{n-3}) \\ r \sin \theta_{n-2} \end{pmatrix} = \Phi_n(r, \theta_0, \dots, \theta_{n-2}) \\ \theta_4 &= \begin{pmatrix} r \cos \theta_2 \cos \theta_0 \cos \theta_1 \\ r \cos \theta_2 \sin \theta_0 \cos \theta_1 \\ r \cos \theta_2 \sin \theta_1 \\ r \sin \theta_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Allgemein gilt für $n-1 \mapsto n$:

$$\Phi_n = \begin{pmatrix} r \cos \theta_{n-2} (\cos \theta_0 \dots \cos \theta_{n-3}) \\ r \cos \theta_{n-2} (\sin \theta_0 \dots \cos \theta_{n-3}) \\ \vdots \\ r \cos \theta_{n-2} (\sin \theta_{n-3}) \\ r \sin \theta_{n-2} \end{pmatrix}$$

Schreibe $\Phi_n = \Phi \circ \Psi$:

$$\begin{aligned} \Phi(\varrho, \theta_0, \dots, \theta_{n-3}, t) &= \begin{pmatrix} \Phi_{n-1}(\varrho, \theta_0, \dots, \theta_{n-3}) \\ t \end{pmatrix} \\ \Psi(r, \theta_0, \dots, \theta_{n-2}) &= \begin{pmatrix} r \cos \theta_{n-2} \\ \theta_0 \\ \vdots \\ \theta_{n-3} \\ r \sin \theta_{n-2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\Phi \circ \Psi(r, \theta_0, \dots, \theta_{n-2}) = \begin{pmatrix} \Phi_{n-1}(r \cos \theta_{n-2}, \theta_0, \dots, \theta_{n-3}) \\ r \sin \theta_{n-2} \end{pmatrix}$$

Es ist

$$\det \Phi'_n = \det(\Phi' \circ \Psi) \cdot \Psi'$$

mit

$$\det \Phi' \circ \Psi = \begin{vmatrix} \Phi'_{n-1} \circ \Psi & 0 \\ 0 \dots 0 & 1 \end{vmatrix} = \det \Phi'_{n-1}(r \cos \theta_{n-2}, \theta_0, \dots, \theta_{n-3})$$

$$\det \Psi' = \begin{vmatrix} \cos \theta_{n-2} & 0 & 0 & \dots & 0 & -r \sin \theta_{n-2} \\ 0 & 1 & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 0 \\ \sin \theta_{n-2} & 0 & 0 & \dots & 0 & r \cos \theta_{n-2} \end{vmatrix} = r \text{ (als Aufgabe)}$$

Rekursionsformel für die Determinante:

$$\underbrace{\det \Phi'_n}_{\Delta_n}(r, \theta_0, \dots, \theta_{n-2}) = r \cdot \underbrace{\det \Phi'_{n-1}}_{\Delta_{n-1}}(r \cos \theta_{n-2}, \theta_0, \dots, \theta_{n-3})$$

$$\Delta_2 = r, \Delta_3 = r \cos \theta_1$$

$$\Delta_{n-1} = r^{n-2} \cos \theta_1 (\cos \theta_2)^2 \dots (\cos \theta_{n-3})^{n-3}$$

$$\Delta_n = r \cdot (r \cos \theta_{n-2})^{n-2} \cos \theta_1 (\cos \theta_2)^2 \dots (\cos \theta_{n-3})^{n-3}.$$

10.6.10 Beispiele

(a) Polarkoordinaten im $\mathbb{R}^2$: Berechnung von

$$I = \int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Beweis: Sei $Q = \{(x, y) : x, y > 0\}$. Dann ist

$$\int_Q e^{-(x^2+y^2)} d(x, y) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dy dx = \int_0^\infty e^{-x^2} dx \cdot \int_0^\infty e^{-y^2} dy = I^2.$$

Mit Polarkoordinaten ist

$$\begin{aligned} \int_Q e^{-(x^2+y^2)} d(x, y) &= \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} e^{-r^2} \cdot r d\theta dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-r^2} \cdot (-2r) dr = -\frac{\pi}{4} e^{-r^2} \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(b) Kugelkoordinaten im $\mathbb{R}^3$: Aufgabe: Berechne $m(K(0, r)) = ?$

(c) Zylinderkoordinaten:

Berechne den Inhalt von

$$E = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{1+z^2} \right\}.$$

Es ist $z \in \mathbb{R}$ und $0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}$.

$$\begin{aligned} m(E) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{(1+z^2)^{-1/2}} \int_0^{2\pi} r \, d\theta \, dr \, dz = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r^2}{2} \Big|_0^{(1+z^2)^{-1/2}} dz \\ &= \pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{1+z^2} = \pi \arctan z \Big|_{-\infty}^{\infty} = \pi^2. \end{aligned}$$

(d) Allgemeine Kugelkoordinaten: Aufgabe: Berechne $m(K(0, r)) = ?$

10.7 Parameterintegrale

10.7.1 Feste Bezeichnungen

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ ist meßbar und $\neq \emptyset$.

$\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$.

$f: D \times E \rightarrow \mathbb{R}$. Für $f(x, y)$ ist $x \in D$ und $y \in E$.

f ist bezüglich y integrierbar über E .

$g: E \rightarrow [0, \infty)$ ist integrierbar.

$$F(x) := \int_E f(x, y) \, dy$$

$F: D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Parameterintegral mit dem Parameter x .

Beispiel: Die Gamma-Funktion

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} \, dt$$

10.7.2 Satz über die Stetigkeit

Sei $|f(x, y)| \leq g(y)$ für alle $(x, y) \in D \times E$, und sei $x \mapsto f(x, y)$ stetig in $x = a \in D$ für fast alle $y \in E$.

Dann ist F stetig in $x = a$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_E f(x, y) \, dy = \int_E \underbrace{(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y))}_{=: f(a, y)} \, dy$$

Beweis: $(x^{(k)})$ sei Folge in D mit $x^{(k)} \rightarrow a$.

$$f_k(y) := |f(x^{(k)}, y) - f(a, y)| \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty \text{ fast überall in } E$$

$$0 \leq f_k(y) \leq 2g(y).$$

Mit dem Satz von Lebesgue gilt:

$$\int_E f_k(y) \, dy \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

$$\begin{aligned}
|F(x^{(k)}) - F(a)| &= \left| \int_E f(x^{(k)}, y) - f(a, y) dy \right| \\
&\leq \int_E |f(x^{(k)}, y) - f(a, y)| dy \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty.
\end{aligned}$$

10.7.3 Differenzierbarkeit von Parameterintegralen

Sei $f: D \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^m$ und

$$F(x) = \int_E f(x, y) dy.$$

Ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $x \mapsto f(x, y)$ diffbar in $x = a$ für fast alle y und gilt

$$|f(x, y) - f(a, y)| \leq \|x - a\|g(y) \text{ (mit } g \in L),$$

so ist F differenzierbar in $x = a$ und es gilt

$$\frac{\partial F}{\partial x_\nu}(a) = \int_E \frac{\partial f}{\partial x_\nu}(a, y) dy.$$

Beweis:

$$\frac{\partial f}{\partial x_\nu}(a, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te^\nu, y) - f(a, y)}{t}$$

(ex. nach Vor. für fast alle y)

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{f(a + \frac{1}{k}e^\nu, y) - f(a, y)}{\frac{1}{k}}}_{\text{meßbar bzgl. } y} = \text{meßbar}$$

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_\nu}(a, y) \right| \leq g(y) \text{ für } \nu = 1, \dots, n$$

also integrierbar.

Sei $h \in \mathbb{R}^n$, $\|h\| < \delta$, δ so, daß $\{x: \|x - a\| < \delta\} \subseteq D$:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\|h\|} \left| F(a + h) - F(a) - \sum_{\nu=1}^n h_\nu \cdot \int_E \frac{\partial F}{\partial x_\nu}(a, y) dy \right| \\
&\leq \frac{1}{\|h\|} \int_E \left| f(a + h, y) - f(a, y) - \sum_{\nu=1}^n h_\nu \frac{\partial f}{\partial x_\nu}(a, y) \right| dy \\
&\stackrel{?}{\rightarrow} 0 \text{ für } h \rightarrow 0
\end{aligned}$$

Setze

$$\Phi(h, y) := \frac{1}{\|h\|} \left| \underbrace{f(a + h, y) - f(a, y)}_{\leq g(y) \cdot \|h\|} - \underbrace{\sum_{\nu=1}^n h_\nu \frac{\partial f}{\partial x_\nu}(a, y)}_{\leq \|h\| \cdot n \cdot g(y)} \right|$$

ist stetig für $0 < \|h\| < \delta$ für fast alle y .

Es ist $\Phi(0, y) := 0$.

Wenn $h \mapsto \Phi(h, y)$ stetig ist in $K(0, \delta)$ für fast alle y , dann gilt nach dem Stetigkeitssatz mit $|\Phi(h, y)| \leq g(y) + n \cdot g(y) = (n+1)g(y)$ das obige $\xrightarrow{?}$.

Weise nun die Stetigkeit im Punkt $h = 0$ (für fast alle y) nach:

Für welche y gilt $\Phi(h, y) \rightarrow 0$, wenn $h \rightarrow 0$ ist?

Genau für alle y , in denen $f(x, y)$ bzgl. x differenzierbar ist im Punkt $x = a$.

10.7.4 Beispiel

Die Gamma-Funktion ist für $x > 0$ definiert durch

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Die Beta-Funktion ist für $x > 0$ und $y > 0$ definiert durch

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt.$$

(a) Γ ist stetig.

(b) Γ ist stetig differenzierbar ($\Gamma \in C^\infty(0, \infty)$).

(c) Es ist

$$\Gamma^{(k)} = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} (\log t)^k dt.$$

Beweis:

zu (a): $x \mapsto e^{-t} t^{x-1}$ ist stetig für alle $t > 0$.

Sei $a \in D = [\alpha, \beta] \subseteq (0, \infty) = E$. Dann ist

$$e^{-t} t^{x-1} \leq \left\{ \begin{array}{l} t^{\alpha-1} \text{ für } 0 < t \leq 1 \\ e^{-t} t^{\beta-1} \text{ für } t > 1 \end{array} \right\} =: g(t)$$

g ist Majorante. $\Rightarrow$ Stetigkeitssatz anwenden.

zu (b): Es ist

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{-t} t^{x-1} = e^{-t} t^{x-1} \log t.$$

Sei $a > 0$, $0 < \alpha < a < \beta < \infty$ und $D = (\alpha, \beta)$. Dann ist

$$\left| \frac{\partial}{\partial x} e^{-t} t^{x-1} \right| \leq |\log t| \cdot g(t)$$

integrierbar (Aufgabe).

Satz über die Differenzierbarkeit anwendbar, da

$$|e^{-t} t^{x-1} - e^{-t} t^{a-1}| \stackrel{\text{MWS}}{=} |x - a| \cdot |e^{-t} t^{\xi-1} \log t|$$

(wobei ξ zwischen a und x ist)

$$\leq |x - a| \cdot \underbrace{|\log t| \cdot g(t)}_{\text{Majorante}}.$$

zu (c): Ohne Beweis.

10.7.5 Beispiel: Das Newton-Potential

Für dieses Beispiel ist $n \geq 3$.

Sei $K \subseteq \mathbb{R}^n$ kompakt, $\varrho: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ meßbare, beschränkte Massendichte und

$$u(x) = \int_K \frac{\varrho(\xi)}{\|x - \xi\|^{n-2}} d\xi$$

Behauptung:

- $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$
- $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus K)$

Zeige:

- (a) $u \in C^2(D)$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$ Gebiet mit $\bar{D} \cap K = \emptyset$
- (b) u ist stetig in $a \in K$
- (c) Das Newton-Potential ist harmonisch in $\mathbb{R}^n \setminus K$, d. h.

$$\sum_{\nu=1}^n u_{x_\nu x_\nu} = 0,$$

kurz:

$$\Delta u = 0$$

mit dem *Laplace-Operator*

$$\Delta = \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_\nu^2}.$$

Beweis:

zu (a): Sei $a \in \mathbb{R}^n \setminus K$, D eine Umgebung um a mit $\bar{D} \cap K = \emptyset$.

Für $x \in D$ gilt:

$$\|x - \xi\| \geq d > 0 \text{ für alle } \xi \in K, x \in D.$$

Außerdem ist

$$|\varrho(\xi)| \leq M.$$

C⁰:

$$x \mapsto \frac{\varrho(\xi)}{\|x - \xi\|^{n-2}}$$

ist stetig in D für alle $\xi \in K$. Eine Majorante in K ist

$$g(\xi) = \frac{M}{d^{n-2}}.$$

Also ist $u \in C^0(\mathbb{R}^n)$.

C¹:

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_\nu} \frac{\varrho(\xi)}{\|x - \xi\|^{n-2}} \right| = \left| \varrho(\xi)(-n+2)\|x - \xi\|^{-n+1} \frac{\partial}{\partial x_\nu} \|x - \xi\| \right|$$

mit $\frac{\partial}{\partial x_\nu} \|x\| = \frac{x_\nu}{\|x\|}$

$$\begin{aligned} &= \left| (-n+2) \cdot \varrho(\xi) \cdot \|x - \xi\|^{-n+1} \cdot \frac{x_\nu - \xi_\nu}{\|x - \xi\|} \right| \\ &\leq (n-2)M \cdot \|x - \xi\|^{-n+1} \\ &\leq (n-2)Md^{-n+1} \end{aligned}$$

mit $\xi \in K, x \in D$.

C²:

Es ist

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} \frac{\partial}{\partial x_\nu} \left(\frac{1}{\|x - \xi\|^{n-2}} \right) = -(+n-2) \frac{\partial}{\partial x_\mu} \frac{x_\nu - \xi_\nu}{\|x - \xi\|^n}$$

Mit

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu} \left(\frac{x_\nu - \xi_\nu}{\|x - \xi\|^n} \right) = \begin{cases} (x_\nu - \xi_\nu) \cdot (-n) \|x - \xi\|^{-n-1} \cdot \frac{x_\mu - \xi_\mu}{\|x - \xi\|} & \mu \neq \nu \\ (x_\nu - \xi_\nu)^2 \cdot (-n) \|x - \xi\|^{-n-2} + \frac{1}{\|x - \xi\|^n} & \mu = \nu \end{cases}$$

ist dann

$$\frac{\partial^2}{\partial x_\mu \partial x_\nu} \frac{1}{\|x - \xi\|^{n-2}} = \frac{-n(x_\nu - \xi_\nu)(x_\mu - \xi_\mu)}{\|x - \xi\|^{n+2}}$$

und

$$\frac{\partial^2}{\partial x_\nu^2} \frac{1}{\|x - \xi\|^{n-2}} = \frac{-n(x_\nu - \xi_\nu)^2}{\|x - \xi\|^{n+2}} + \frac{1}{\|x - \xi\|^n}$$

⇒ Majoranten klar: immer von der Form $\frac{\text{const}}{d^n}$ für C^n .

zu (b): Stetigkeit in $x = a \in K$: Sei $a \in K, U = K(a, \delta), \delta$ fest: Es ist

$$u(x) = \underbrace{\int_{K \setminus U} \frac{\varrho(\xi)}{\|x - \xi\|^{n-2}} d\xi}_{w(x)} + \underbrace{\int_{K \cap U} \frac{\varrho(\xi)}{\|x - \xi\|^{n-2}} d\xi}_{v(x)}.$$

$w(x)$ ist stetig in U , wie schon gezeigt.

Sei $\varepsilon > 0, \sigma > 0, \sigma < \delta/2$, so daß $K(a, \sigma) \subseteq K$ ist.

Sei $\|x - a\| < \sigma$:

$$\begin{aligned} |v(x) - v(a)| &= \left| \int_{K \cap U} \frac{\varrho(x)}{\|x - \xi\|^{n-2}} - \frac{\varrho(\xi)}{\|a - \xi\|^{n-2}} d\xi \right| \\ &\leq \int_{K \cap U} \left| \frac{\varrho(x)}{\|x - \xi\|^{n-2}} - \frac{\varrho(\xi)}{\|a - \xi\|^{n-2}} \right| d\xi \\ &\leq M \left(\int_{K \cap U} \frac{d\xi}{\|x - \xi\|^{n-2}} + \int_{K \cap U} \frac{d\xi}{\|a - \xi\|^{n-2}} \right) \\ &\leq M \left(\int_U \frac{d\xi}{\|x - \xi\|^{n-2}} + \int_U \frac{d\xi}{\|a - \xi\|^{n-2}} \right) \end{aligned}$$

Berechne das 2. Integral:

$$\begin{aligned} \int_U \frac{d\xi}{\|a - \xi\|^{n-2}} &= \left| \begin{array}{l} \text{Subst.:} \\ \xi = a + \delta \cdot y \\ d\xi = \delta^n \cdot dy \end{array} \right| \\ &= \delta^n \int_{K(0,1)} \frac{dy}{\delta^{n-2} \|y\|^{n-2}} \\ &= \delta^2 \int_{K(0,1)} \frac{dy}{\|y\|^{n-2}} \end{aligned}$$

Berechne nun das 1. Integral mit Substitution $\xi = x + \delta \cdot y$:

$$\delta^2 \int_{K(0,3/2)} \frac{dy}{\|y\|^{n-2}} = \text{const} \cdot \delta^2$$

Sei nun $\varepsilon > 0$ und $\delta > 0$ so, daß $\text{const} \cdot \delta^2 < \varepsilon/2$ ist:

$$\begin{aligned} u(x) - u(a) &= v(x) - v(a) + w(x) - w(a) \\ |v(x) - v(a)| &< \varepsilon/2 \text{ für } \|x - a\| < \delta/2 \\ |w(x) - w(a)| &< \varepsilon/2 \text{ für } \|x - a\| < \sigma < \delta/2 \\ \Rightarrow |u(x) - u(a)| &< \varepsilon \text{ für } \|x - a\| < \delta. \end{aligned}$$

zu (c):

$$\Delta u = \int_E \varrho(\xi) \underbrace{\left(\Delta \frac{1}{\|x - \xi\|^{n-2}} \right)}_{=0 \text{ für alle } \xi} d\xi = 0,$$

denn es ist

$$\Delta \frac{1}{\|x - \xi\|^{n-2}} = \frac{n}{\|x - \xi\|^n} - \frac{n}{\|x - \xi\|^{n-2}} \sum_{\nu=1}^n (x_\nu - \xi_\nu)^2 = 0.$$

10.8 Das eindimensionale Lebesgue-Integral

In diesem Abschnitt ist immer $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und

$$\int_{[a,b]} f(x) dx =: \int_a^b f(x) dx.$$

Zur Wiederholung: Wenn $f' \in R([a, b])$ ist, dann gilt

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

10.8.1 Satz

Ist f monoton wachsend (fallend), so ist f fast überall differenzierbar und für das Lebesgueintegral gilt:

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a)$$

(beziehungsweise $\geq$).

Beweis: Später in 10.8.3.

10.8.2 Hilfssatz (Sunrise-Lemma)

(nach Riesz) Sei $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und

$$E = \{x \in (a, b) : \text{es ex. } \xi > x \text{ mit } g(\xi) > g(x)\}.$$

Behauptung: E ist offen, also $E = \bigcup_k (a_k, b_k)$ oder $= \emptyset$ und $g(a_k) = g(b_k)$, außer, wenn $a_k = a$ ist.

Dort gilt nur: $g(a_k) \leq g(b_k)$.

Beweis: Sei $x \in E$ und dazu $\xi > x$ mit $g(\xi) > g(x)$. Es existiert ein $\delta > 0$ mit: Ist $|x' - x| < \delta$, so gilt: $x' < \xi$ und $g(x') < g(\xi)$ (wegen der Stetigkeit).

Also ist $(x - \delta, x + \delta) \cap (a, b) \subseteq E$, E ist offen. Damit ist $E = \bigcup_k (a_k, b_k)$.

Zeige noch, daß $g(a_k) = g(b_k)$ ist:

1. Sei $a_k > 0$. Dann ist $g(a_k) \geq g(b_k)$, sonst wäre nämlich $a_k \in E$ (sonst: $g(a_k) < g(b_k)$ für $a_k < b_k \Rightarrow a_k \in E$).
2. Sei $x \in (a_k, b_k)$ und x' definiert durch:

$$g(x') = \max\{g(t) : x \leq t \leq b_k\}.$$

Wen $x' < b_k$ ist, existiert ein $\xi > b_k$ mit $g(\xi) > g(x')$, weil $x' \in E$ und $g(x')$ maximal ist. Damit wäre dann $g(\xi) > g(x') \geq g(b_k)$ und damit $b_k \in E$. WIDERSPRUCH! Also ist $g(x) \leq g(x') = g(b_k)$. Für $x \rightarrow a_k$ gilt dann:

$$g(a_k) \leq g(b_k).$$

Zusammen ist also $g(a_k) = g(b_k)$.

10.8.3 Beweis zu 10.8.1

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsend.

Behauptung 1: f ist fast überall in $[a, b]$ differenzierbar.

Beweis: Sei $x \in (a, b)$. Setze

$$\Lambda_r = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\lambda_r = \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Dies ist die rechtsseitige obere, bzw. untere Ableitung.

Definiere analog (mit $h \rightarrow 0^-$) die linksseitige obere/untere Ableitung Λ_ℓ und λ_ℓ . $f'(x)$ existiert nun genau dann, wenn $\lambda_\ell = \Lambda_\ell = \lambda_r = \Lambda_r < \infty$ ist.

Da f monoton wachsend ist, sind $\lambda_\ell, \dots, \Lambda_r \geq 0$. Zeige noch in 3 Schritten:

- 1.) $\Lambda_r < +\infty$ fast überall.
- 2.) $\Lambda_r < \lambda_\ell$ fast überall.

3.) $\Lambda_\ell \leq \lambda_r$ fast überall.

Zusammen folgt dann:

$$\Lambda_\ell \leq \lambda_r \leq \Lambda_r \leq \lambda_\ell \leq \lambda_l < \infty \text{ fast überall,}$$

d. h. f ist fast überall differenzierbar.

1.) Es ist

$$E_\infty = \{x \in (a, b) : \Lambda_r = +\infty\} \subseteq \{x \in (a, b) : \Lambda_r > n\} = E_n$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Sei $x \in E_n$. Dann existiert ein $\xi = x + h > x$ mit

$$\frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} > n,$$

d. h.

$$\underbrace{f(\xi) - n \cdot \xi}_{=:g(\xi)} > \underbrace{f(x) - n \cdot x}_{=:g(x)}.$$

Mit dem Sunrise-Lemma folgt damit: $E_n \cup (a_k, b_k)$ mit $g(a_k) \leq g(b_k)$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} f(a_k) - f(b_k) &\leq n(a_k - b_k) \\ (b_k - a_k) &\leq \frac{1}{n}(f(b_k) - f(a_k)). \end{aligned}$$

Summiere auf:

$$\begin{aligned} \sum_k (b_k - a_k) &\leq \frac{1}{n} \sum_k f(b_k) - f(a_k) \\ &\leq \frac{1}{n}(f(b) - f(a)) \\ &< \varepsilon \text{ für } n \geq n_0. \end{aligned}$$

Damit ist $m(E_\infty) \leq m(E_n) < \varepsilon$ für $n \geq n_0$, also ist $m(E_\infty) = 0$ und damit $\Lambda_r < +\infty$ fast überall.

2.) Setze

$$E_{c,d} = \{x \in (a, b) : \Lambda_r > d > c > \lambda_\ell\}$$

und

$$E = \{x \in (a, b) : \Lambda_r > \lambda_\ell\} = \bigcup_{0 \leq c < d \text{ rational}} E_{c,d}.$$

E ist eine abzählbare Vereinigung.

Zeige: $m(E_{c,d}) = 0$, also $m(E) = 0$.

Sei $x \in E_{c,d}$: Es existiert ein $\xi < x$ mit

$$\frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x} < c.$$

Setze $g(x) = f(x) - c \cdot x$. Dann gilt:

$$g(\xi) < g(x)$$

und mit dem Hilfssatz (Sunrise-Lemma) folgt dann:

$E_{c,d} \subseteq \bigcup_k (a_k, b_k)$ mit $g(b_k) = g(a_k)$ oder

$$c(b_k - a_k) = f(b_k) - f(a_k).$$

Sei nun $x \in (a_k, b_k)$, $x \in E_{c,d}$:

Es existiert $\xi > x$, $\xi \in (a, b)$ mit: $g(x) := f(x) - dx$: $g(\xi) > g(x)$.

Hilfssatz, angewandt auf $[a_k, b_k]$:

$\Rightarrow E_{c,d} \cap (a_k, b_k) \subseteq \bigcup_{\ell} (a_{k_\ell}, b_{k_\ell})$ mit $g(a_{k_\ell}) = g(b_{k_\ell})$,

d. h. $d(b_{k_\ell} - a_{k_\ell}) = f(b_{k_\ell}) - f(a_{k_\ell})$. Setze

$$\Sigma_1 = \bigcup_k \bigcup_{\ell} (a_{k_\ell}, b_{k_\ell}).$$

Es ist

$$\begin{aligned} m(\Sigma_1) &= \sum_k \sum_{\ell} (b_{k_\ell} - a_{k_\ell}) = \frac{1}{d} \sum_k \underbrace{\left(\sum_{\ell} f(b_{k_\ell}) - f(a_{k_\ell}) \right)}_{\leq f(b_k) - f(a_k) = c(b_k - a_k)} \\ &= \underbrace{\frac{c}{d}}_{=q < 1} \sum_k (b_k - a_k) = q \cdot m(\Sigma'_1) \end{aligned}$$

mit $\Sigma'_1 = \bigcup_k (a_k, b_k)$.

Zusammen: (1) $E_{c,d} \subseteq \Sigma'_1$ und $E \subseteq \Sigma_1$,

$$m(\Sigma_1) \leq q \cdot m(\Sigma'_1).$$

Wiederhole (1), angewandt auf die Teilintervalle von Σ_1 .

Erhalte Σ_2, Σ'_2 mit $E_{c,d} \subseteq \Sigma_2$,

$$\begin{aligned} m(\Sigma_2) &\leq q \cdot m(\Sigma'_2) \\ \Sigma'_2 &\subseteq \Sigma_1 \end{aligned}$$

und damit

$$m(\Sigma_2) \leq q^2 \cdot m(\Sigma'_1).$$

Allgemein erhält man mit Induktion Σ_n, Σ'_n mit

$$\begin{aligned} m(\Sigma_n) &\leq q \cdot m(\Sigma'_n) \\ \Sigma'_n &\subseteq \Sigma_{n-1} \\ E_{c,d} &\subseteq \Sigma_n. \end{aligned}$$

Also gilt für jedes n

$$\begin{aligned} m(E_{c,d}) &\leq m(\Sigma_n) \leq q^n \cdot m(\Sigma'_1) \\ &\leq q^n \cdot (b - a) < \varepsilon \text{ für } n \geq n_0. \end{aligned}$$

Damit ist $m(E_{c,d}) = 0$, also auch $m(E) = 0$ und $\Lambda_r \leq \lambda_\ell$ fast überall.

3.) analog zu 2.)

Behauptung 2: Ist $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, wachsend, so gilt für das L-Integral

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a).$$

Beweis: Setze

$$f_k(x) = \frac{f(x + \frac{1}{k}) - f(x)}{\frac{1}{k}}.$$

f_k ist meßbar.

Es ist fast überall

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f'(x).$$

Also ist f' meßbar (Setze $f' = 0$, wo die Ableitung nicht existiert).

Dann ist

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_a^b f_k(x) dx &= k \left[\int_a^b f\left(x + \frac{1}{k}\right) dx - \int_a^b f(x) dx \right] \\ &= k \left[\int_{a+1/k}^{b+1/k} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right] \\ &= -\frac{\int_a^{a+1/k} f(x) dx}{\frac{1}{k}} + \frac{\int_b^{b+1/k} f(x) dx}{\frac{1}{k}} \\ &\stackrel{\odot}{\rightarrow} -f(a) + f(b). \end{aligned}$$

Dabei ist $\odot$ eine frühere Aufgabe.

Es gilt also

$$\int_a^b f_k(x) dx \rightarrow f(b) - f(a).$$

Mit dem Lemma von Fatou gilt dann: $f' \in L$ und

$$\int_a^b f'(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_k(x) dx = f(b) - f(a).$$

10.8.4 Beispiel

(Aufgabenblatt) Zu jeder Nullmenge $N \subseteq (a, b)$

gibt es eine stetige und wachsende Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \rightarrow +\infty$$

für $x \in N$.

Konstruktion: Es gibt Intervalle I_k mit

$$\sum_k m(I_k) \leq 1, \quad N \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} I_k \text{ für alle } n$$

$$f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k \cap [a, x])$$

hat alle Eigenschaften.

10.8.5 Beispiel einer stetigen, streng wachsenden Funktion mit Ableitung 0

Gesucht ist eine Funktion $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ mit $f'(x) = 0$ fast überall, f ist stetig, $f(0) = 0$ und $f(1) = 1$.

Konstruiere eine Folge (f_n) mit $f_n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Dabei soll f_n auf jedem Teilintervall $I_k^n = [k \cdot 2^{-n}, (k+1) \cdot 2^{-n}]$ linear sein. Für $n = 0$ wird $f_0(x) = x$ gesetzt. Konstruiere nun f_n . Es ist

$$I_k^n = I_{2k}^{n+1} \cup I_{2k+1}^{n+1}.$$

Setze in $k \cdot 2^{-n}$ und $(k+1) \cdot 2^{-n}$, den Endpunkten von I_k^n

$$f_{n+1} = f_n.$$

Im Mittelpunkt $(2k+1) \cdot 2^{-n-1}$ (dies ist der rechte Mittelpunkt von I_{2k}^{n+1} , bzw. der linke Endpunkt von I_{2k+1}^{n+1}) ist

$$f_{n+1}((2k+1) \cdot 2^{-n-1}) = \frac{1}{3}f_n(k \cdot 2^{-n}) + \frac{2}{3}f_n((k+1) \cdot 2^{-n}).$$

Zwischen diesen Punkten wird f_{n+1} linear definiert.

Alle f_n sind stetig und streng wachsend.

(a) $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ existiert punktweise und ist schwach wachsend.

Da $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq 1$ ist, existiert $f(x)$.

Da f_n monoton ist, ist auch f monoton, aber nicht unbedingt streng monoton.

(b) f ist streng monoton wachsend: Sei $0 \leq x < y \leq 1$. Wähle k und n so, daß

$$\begin{aligned} x &< k \cdot 2^{-n} \\ y &> (k+1) \cdot 2^{-n}. \end{aligned}$$

Dann ist

$$f(x) \leq f(k \cdot 2^{-n}) = f_n k \cdot 2^{-n} < f_n((k+1)2^{-1}) = f((k+1)2^{-1}) \leq f(y).$$

(c) Sei $I_{k_n}^n = [\alpha_n, \beta_n]$ geschachtelt, d. h. $I_{k_n}^n \supseteq I_{k_{n+1}}^{n+1}$. Dann ist

$$0 \leq f(\beta_{n+1}) - f(\alpha_{n+1}) \tag{10.4}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3}f(\alpha_n) + \frac{2}{3}f(\beta_n) - f(\alpha_n) & \text{im linken Intervall} \\ f(\beta_n) - \frac{1}{3}f(\alpha_n) - \frac{2}{3}f(\beta_n) & \text{im rechten Intervall} \end{cases} \tag{10.5}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{3}(f(\beta_n) - f(\alpha_n)) & \text{im linken Intervall} \\ \frac{1}{3}(f(\beta_n) - f(\alpha_n)) & \text{im rechten Intervall} \end{cases} \tag{10.6}$$

$$\leq \frac{2}{3}(f(\beta_n) - f(\alpha_n)). \tag{10.7}$$

(d) Stetigkeit in $x \in [0, 1]$: Sei $x \in (\alpha_n, \beta_n) \cup [\beta_n, \gamma_n)$ mit $\alpha_n = k_n \cdot 2^{-n}$, $\beta_n = (k_n + 1) \cdot 2^{-n}$ und $\gamma_n = (k_n + 2) \cdot 2^{-n}$.

Sei $\varepsilon > 0$: Wähle n so, daß

$$2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n < \varepsilon.$$

Setze $I = (\alpha_n, \beta_n)$. Sei nun $y \in I$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq f(\gamma_n) - f(\alpha_n) \\ &= f(\gamma_n) - f(\beta_n) + f(\beta_n) - f(\alpha_n) \\ &\leq 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot (f(1) - f(0)) < \varepsilon. \end{aligned}$$

(e) Nach dem Satz existiert f' fast überall. Zeige nun: $f'(x) = 0$ dort, wo f' existiert.

$$\begin{aligned} \frac{f(\beta_{n+1}) - f(\alpha_{n+1})}{\beta_{n+1} - \alpha_{n+1}} &= \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} \cdot \left(2 \cdot \left(\frac{1}{2} \pm \frac{1}{6} \right) \right) \\ &= \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} \cdot \left(1 \pm \frac{1}{3} \right). \end{aligned}$$

Wenn $f'(x)$ existiert mit $x \in [\alpha_n, \beta_n]$, dann ist

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} \stackrel{\text{Ind.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{3} \varepsilon_k \right)$$

mit $\varepsilon_k = 1$ oder $\varepsilon_k = -1$. Setze

$$p_n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{3} \varepsilon_k \right) \quad \text{und} \quad p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n.$$

p existiert genau dann, wenn $p = 0$ ist. Annahme $p > 0$:

Dann ist $(1 + \frac{1}{3} \varepsilon_n) = \frac{p_{n+1}}{p_n} \rightarrow \frac{p}{p} = 1$ für $n \rightarrow \infty$.

Damit ist $\varepsilon_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. WIDERSPRUCH! Also ist $f'(x) = 0$ fast überall.

10.8.6 Satz

Seien $f_k: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, monoton wachsend und

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$$

sei konvergent in $[a, b]$.

Dann ist f stetig, wachsend und es ist fast überall

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f'_k(x).$$

Beweis: Sei OBdA $f_n(a) = 0$ (sonst betrachte $\sum_{k=0}^{\infty} (f_k(x) - f_k(a))$). Setze

$$\begin{aligned} s_n(x) &= \sum_{k=0}^n f_k(x) \\ r_n(x) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x). \end{aligned}$$

f ist monoton wachsend (klar).

$0 \leq r_n(x) \leq r_n(b) \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Also liegt gleichmäßige Konvergenz vor und damit ist f stetig.

Sei

$$E = \{x: f'(x) \text{ oder eine Ableitung } f'_k(x) \text{ existiert nicht.}\}$$

E ist Nullmenge. Sei $x \in [a, b] \setminus E$. Dann konvergiert die Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} f'_k(x),$$

da $s'_n(x) \leq s'_{n+1}(x) \stackrel{\otimes}{\leq} f'(x)$ ist.

Dabei gilt $\otimes$, da $f = s_n + r_n$ und damit $f' = s'_n + \underbrace{r'_n}_{\geq 0} \geq s'_n$ ist.

Wähle n_k so, daß

$$\sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{(f(b) - s_{n_k}(b))}_{r_{n_k}(b)}$$

konvergiert. Dann konvergiert die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} (f(x) - s_{n_k}(x))$$

gleichmäßig, da

$$0 \leq \underbrace{f(x) - s_{n_k}(x)}_{=r_{n_k}(x)} \leq r_{n_k}(x).$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (f'(x) - s'_{n_k}(x))$$

konvergiert wie $\sum s'_k(x)$.

Also ist $s'_{n_k}(x) \rightarrow f'(x)$ für $k \rightarrow \infty$ und damit $s'_{n_k}(x) \rightarrow f'(x)$, da $((s'_n(x)) \uparrow)$.

10.8.7 Definition: absolute Stetigkeit

Eine Funktion $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt absolut stetig, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gilt mit:

Sind $(a_k, b_k) \subseteq [a, b]$ für $k = 1, \dots, n$ paarweise disjunkt mit

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta,$$

dann gilt

$$\sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon.$$

10.8.8 Beispiele und Bemerkungen

(a) Absolut stetige Funktionen sind stetig.

(b) Funktionen der Form

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

mit $f \in L([a, b])$ sind absolut stetig.

(c) Absolut stetige Funktionen sind von endlicher Variation, also insbesondere existiert F' fast überall.

(d) Wenn F absolut stetig ist, gibt es F_1, F_2 , beide wachsend *und* absolut stetig, mit $F = F_1 - F_2$.

Beweis:

(a) Gilt nach Definition der absoluten Stetigkeit mit $n = 1$.

(b) Setze

$$E = \bigcup_k (a_k, b_k).$$

Es ist

$$m(E) = \sum (b_k - a_k) < \delta.$$

Damit ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| &\leq \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{b_k} |f(t)| dt \\ &= \int_E |f(t)| dt \stackrel{\oplus}{<} \varepsilon. \end{aligned}$$

$\oplus$ gilt wegen der absoluten Stetigkeit des L-Integrals (10.5.15 auf Seite 284).

(c) Zu $\varepsilon = 1$ existiert ein δ mit ... (Definition).

Wähle $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{b-a}{\delta} \leq n$.

Sei Z Zerlegung von $[a, b]$:

$$(a + j \cdot h, a + (j + 1) \cdot h) \setminus Z = (a_1, a_2) \cup (a_2, a_3) \cup \dots \cup (a_m, b_m)$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (a_k - a_{k-1}) &= h < \delta \\ \Rightarrow \sum_{k=2}^n |F(a_k) - F(a_{k-1})| &< 1. \end{aligned}$$

Für jedes $j = 0, \dots, n - 1$ gilt:

$$\Rightarrow \text{var}(F, Z) < n$$

$$\Rightarrow V_a^b(F) \leq n.$$

(d) In ANALYSIS II wurde gezeigt, daß sich F , eine Funktion von endlicher Variation, folgendermaßen darstellen läßt:

$$F(x) - F(a) = p(x) - n(x).$$

Dabei ist p die positive und n die negative Variation:

$$p(x) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^m (F(x_k) - F(x_{k-1}))^+ : \{x_0, \dots, x_m\} \text{ ist Zerlegung von } [a, x] \right\}$$

Zeige: p ist absolut stetig.

Sei $\varepsilon > 0$ und dazu $\delta > 0$ aus der absoluten Stetigkeit von F .

Zerlegung $\{x_0, \dots, x_m\}$ von $[a, b]$ mit

$$p(b) < \varepsilon + \sum_{k=1}^m (F(x_k) - F(x_{k-1}))^+.$$

Seien $(a_1, b_1), \dots, (a_s, b_s) \subseteq [a, b]$ paarweise disjunkt mit

$$\sum_{k=1}^s b_k - a_k < \delta.$$

Es ist

$$Z_k = ((a_k, b_k) \cap Z) \cup \{a_k, b_k\} = \{t_0^k, t_1^k, \dots, t_{\ell_k}^k\}$$

und damit:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^s \underbrace{p(b_k) - p(a_k)}_{\geq 0} &\stackrel{\text{ANA II}}{\leq} \sum_{k=1}^s \sum_{j=1}^{\ell_k} (F(t_j^k) - F(t_{j-1}^k))^+ + \varepsilon \\ &\leq \sum_{k=1}^s \sum_{j=1}^{\ell_k} |F(t_j^k) - F(t_{j-1}^k)| + \varepsilon. \end{aligned}$$

(t_{j-1}^k, t_j^k) sind disjunkt für alle j und k ,

$$\sum_{j,k} (t_j^k - t_{j-1}^k) = \sum_k b_k - a_k < \delta$$

$\Rightarrow$

$$\sum_{k=1}^s (p(b_k) - p(a_k)) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Also ist p absolut stetig.

10.8.9 Hauptsatz

$F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann absolut stetig, wenn für das Lebesgue-Integral

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt$$

mit $f \in L([a, b])$ ist. Es gilt: $F'(x) = f(x)$ fast überall.

Beweis: Sei OBdA F monoton wachsend, bzw. $f \geq 0$ überall.

„ $\Leftarrow$ “: Sei

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt$$

mit $f \in L$ und $f \geq 0$.

F ist wachsend und absolut stetig (siehe Beispiel (b)).

Zeige noch: $F'(x) = f(x)$ fast überall.

Zuerst: $f \in L^+$, es existiert eine Folge (φ_k) von Treppenfunktionen mit $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$, $\varphi_k \rightarrow f$ fast überall.

Setze

$$\Phi_k(x) = F(a) + \int_a^x \varphi_k(t) dt.$$

Es ist $\Phi'_k(x) = \varphi_k(x)$ außer in den Sprungstellen (ANALYSIS I).
Mit $\Phi_0(x) = 0$ ist dann:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} (\Phi_k(x) - \Phi_{k-1}(x)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x) \\ &= F(a) + \int_a^x f(t) dt = F(x). \end{aligned}$$

Außerdem ist

$$\underbrace{\Phi_k(x) - \Phi_{k-1}(x)}_{\substack{\text{monoton} \\ \text{wachsende Funktion}}} = \int_a^x \underbrace{(\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t))}_{\geq 0} dt \geq 0.$$

Damit gilt dann:

$$\begin{aligned} F'(x) &\stackrel{\text{f.ü.}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} (\Phi'_k(x) - \Phi'_{k-1}(x)) \\ &\stackrel{\text{f.ü.}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} (\varphi_k(x) - \varphi_{k-1}(x)) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k \\ &\stackrel{\text{f.ü.}}{=} f(x). \end{aligned}$$

„ $\Rightarrow$ “: Sei F absolut stetig und monoton.

F' existiert fast überall und es ist $F' \geq 0$.

Es wurde schon gezeigt, daß F' integrierbar ist mit

$$F(b) - F(a) \geq \int_a^b F'(t) dt.$$

Setze

$$\Phi(x) := \int_a^x F'(t) dt.$$

$h(x) := F(x) - \Phi(x)$ ist als Differenz zweier absolut stetiger Funktionen absolut stetig und monoton wachsend, denn für $a \leq x < y \leq b$ gilt:

$$h(y) - h(x) = F(y) - F(x) - \int_x^y F'(t) dt \geq 0.$$

Nach dem 1. Teil des Beweises ist

$$h' = f' - \Phi' = F' - F' = 0 \text{ fast überall.}$$

Zeige noch, daß h konstant ist. Setze

$$N = \{x : h'(x) \text{ existiert oder ist größer als } 0\}.$$

N ist Nullmenge. Sei $\varepsilon > 0$. Dazu gehöre aus der absoluten Stetigkeit von h ein $\delta > 0$. Dann existieren (α_ν, β_ν) mit

$$N \subseteq \bigcup_{\nu} (\alpha_\nu, \beta_\nu)$$

und

$$\sum_{\nu} \beta_{\nu} - \alpha_{\nu} < \delta.$$

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt (mit der absoluten Stetigkeit von h):

$$\sum_{\nu=1}^n \beta_{\nu} - \alpha_{\nu} < \delta \Rightarrow \sum_{\nu=1}^n h(\beta_{\nu}) - h(\alpha_{\nu}) < \varepsilon.$$

Für $n \rightarrow \infty$ gilt:

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} h(\beta_{\nu}) - h(\alpha_{\nu}) \leq \varepsilon.$$

Daraus folgt:

$$m\left(h\left(\bigcup_{\nu} (\alpha_{\nu}, \beta_{\nu})\right)\right) \leq \sum_{\nu} h(\beta_{\nu}) - h(\alpha_{\nu}) \leq \varepsilon.$$

Sei $x \in (a, b) \setminus N = E$. Dann existiert ein $\xi > x$ mit

$$\frac{h(\xi) - h(x)}{\xi - x} < \varepsilon,$$

da $h'(x) = 0$ ist. Also existiert ein $\xi > x$ mit

$$h(\xi) - \varepsilon \cdot \xi > h(x) - \varepsilon \cdot x.$$

Nach dem Sunrise-Lemma gilt dann:

$$E = \bigcup_k (a_k, b_k)$$

mit

$$\begin{aligned} h(a_k) - \varepsilon \cdot a_k &= h(b_k) - \varepsilon \cdot b_k \\ h(b_k) - h(a_k) &= \varepsilon \cdot (b_k - a_k) \\ h([a, b]) &\subseteq \{a, b\} \cup \bigcup_{\nu} (h(\alpha_{\nu}), h(\beta_{\nu})) \cup \bigcup_k (h(a_k), h(b_k)) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} m(h([a, b])) &\leq \sum_{\nu} h(\beta_{\nu}) - h(\alpha_{\nu}) + \sum_k \underbrace{h(b_k) - h(a_k)}_{=\varepsilon \cdot (b_k - a_k)} \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon(b - a). \end{aligned}$$

Also ist $m(h([a, b])) = 0 = m([h(a), h(b)])$.

Also ist $h(a) = h(b)$, d. h. h ist konstant (h ist monoton wachsend).

10.8.10 Folgerungen aus dem Hauptsatz

Folgerung 1: Absolut stetige Funktionen sind nullmengentreu, d. h.

$$m(N) = 0 \Rightarrow m(F(N)) = 0.$$

Folgerung 2: Ist F stetig und von endlicher Variation auf $[a, b]$, so ist $F = \Phi + G$ mit absolut stetigem Φ und G von endlicher Variation mit $G' = 0$ fast überall.

Beweis:

Folgerung 1: Als Aufgabe:

$$m(F(N)) \leq \int_N |F'(x)| dx = 0.$$

Folgerung 2: (Beweis des Hauptsatzes)

F' existiert fast überall, $F' \in L([a, b])$ und

$$\Phi(x) = \int_a^x F'(t) dt$$

ist absolut stetig.

$G := F - \Phi$ ist von endlicher Variation und $G' = F' - \Phi' = 0$ fast überall.

11 Vektoranalysis¹

11.1 Der Gaußsche Integralsatz im $\mathbb{R}^2$

11.1.1 Definition: Normalbereich

Ein y -Normalbereich $B \subseteq \mathbb{R}^2$ ist eine Menge

$$B = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\},$$

wobei φ und ψ stückweise C^1 sind, sowie $\varphi(x) < \psi(x)$ in (a, b) ist. ∂B wird als geschlossene Kurve

$$\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$$

aufgefaßt. Dabei ist

$$\gamma_1: \begin{pmatrix} t \\ \varphi(t) \end{pmatrix}, a \leq t \leq b$$

$$\gamma_2: \begin{pmatrix} b \\ t \end{pmatrix}, \varphi(b) \leq t \leq \psi(b)$$

$$\gamma_3: \begin{pmatrix} t \\ \psi(t) \end{pmatrix}, a \leq t \leq b$$

$$\gamma_4: \begin{pmatrix} a \\ t \end{pmatrix}, \varphi(a) \leq t \leq \psi(a)$$

11.1.2 Integralsatz von Gauß

Sei B ein xy -Normalbereich, $u, v: B \rightarrow \mathbb{R}$ seien stetig und u_x, v_y seien stetig und beschränkt in B^0 . Dann gilt:

$$\int_B (u_x + v_y) d(x, y) = \int_{\partial B} u dy - v dx$$

Beweis

$$\begin{aligned} \int_B v_y d(x, y) &= \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} v_y(x, y) dy \right) dx = \int_a^b v(x, \psi(x)) dx - \int_a^b v(x, \varphi(x)) dx \\ &= \int_a^b v(t, \psi(t)) dt - \int_a^b v(t, \varphi(t)) dt \\ &= - \int_{-\gamma_3} v(x, y) dx - \int_{\gamma_1} v(x, y) dx \end{aligned}$$

---

¹Version 191 vom 13. Februar 2006

Außerdem ist

$$\int_{\gamma_2} v(x, y) dx = \int_{\varphi(b)}^{\psi(b)} v(b, t) \cdot 0 dt = 0 = \int_{\gamma_4} v(x, y) dx = 0.$$

Zusammen gilt also:

$$\int_B v_y d(x, y) = \int_{\partial B} -v dx.$$

Genauso wird gezeigt, daß

$$\int_B u_x d(x, y) = \int_{\partial B} u dy$$

ist. ✓

11.1.3 Bemerkungen

(a) Der Satz von Gauß gilt für Normalbereiche $B = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_m$, mit xy -Normalbereichen B_j , wobei $B_j^0 \cap B_k^0 = \emptyset$ für $j \neq k$ ist.

(b) Sei $f = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ ein Vektorfeld. Dann heißt

$$\operatorname{div} f = u_x + v_y$$

Divergenz von f .

(c) ∂B sei parametrisiert nach der Bogenlänge:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi(s) \\ \Psi(s) \end{pmatrix}, \quad 0 \leq s \leq L(\partial B) = \text{Länge von } \partial B$$

Es ist dabei

$$(\Phi'(s))^2 + (\Psi'(s))^2 = 1$$

(außer für endlich viele s).

Der Tangentialvektor von ∂B an der Stelle s_0 ist

$$\begin{pmatrix} \Phi'(s_0) \\ \Psi'(s_0) \end{pmatrix}$$

An dieser Stelle gilt für den Normalenvektor ν :

$$\nu = \begin{pmatrix} \Psi'(s_0) \\ -\Phi'(s_0) \end{pmatrix}, \quad \|\nu\| = 1$$

Damit ist dann:

$$\begin{aligned} \int_{\partial B} u dy - v dx &= \int_0^{L(\partial B)} (u \cdot \Psi' - v \cdot \Phi') ds \\ &= \int_0^{L(\partial B)} f \cdot \nu ds \end{aligned}$$

(d) Divergenzsatz (Zusammenfassung von (b) und (c)):

$$\int_B \operatorname{div} f d(x, y) = \int_{\partial B} \nu \cdot f ds$$

11.1.4 Folgerung: Fläche eines Normalbereiches

Ein Normalbereich hat das Maß

$$m(B) = \int_{\partial B} x \, dy = - \int_{\partial B} y \, dx = \frac{1}{2} \int_{\partial B} x \, dy - y \, dx$$

Beweis: Wähle

$$f = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \text{ oder } \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix} \text{ oder } \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Für alle diese Funktionen ist

$$\operatorname{div} f = 1.$$

Deshalb ist

$$m(B) = \int_B 1 \, d(x, y) = \int_{\partial B} x \, dy = \dots$$

11.1.5 Beispiel: Fläche einer Ellipse

Zu berechnen sei die Fläche einer Ellipse

$$B = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$$

Für den Rand der Ellipse gilt:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Setze für $0 \leq t \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} x &= a \cos t \\ y &= b \sin t. \end{aligned}$$

Es ist dann

$$\begin{aligned} m(B) &= \int_{\partial B} \frac{1}{2} (x \, dy - y \, dx) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a \cos t \cdot b \cos t - b \sin t \cdot a(-\sin t) \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a \cdot b \, dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot 2\pi = \pi \cdot a \cdot b \end{aligned}$$

11.1.6 Leibnizsche Sektorformel

Sei S ein Sektor, der von einem C^1 -Jordanbogen γ begrenzt wird (siehe Abbildung 11.1) Es ist dann:

$$m(S) = \frac{1}{2} \int_{\gamma} x \, dy - y \, dx$$

Abbildung 11.1: Sektor im $\mathbb{R}^2$ zur Verdeutlichung der Leibnizschen Sektorformel

Beweis: falls S Normalbereich:

$$\partial S = \overline{0a} + \gamma + \overline{b0}$$

Für die Strecke $0a$ gilt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 t \\ a_2 t \end{pmatrix}, \quad \text{mit } 0 \leq t \leq 1 \text{ und } a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Damit ist dann:

$$\begin{aligned} x \, dy - y \, dx &= a_1 t a_2 \, dt - a_2 t a_1 \, dt = 0 \, dt \\ \Rightarrow m(S) &= \int_{\partial B} \frac{1}{2} (x \, dy - y \, dx) = \int_{\gamma} \frac{1}{2} (x \, dy - y \, dx) \end{aligned}$$

11.1.7 Beispiel zu Gauß

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet und seien $u, v \in C^1(D)$.

Zusätzlich sollen die Cauchy-Riemann-Gleichungen gelten:

$$\begin{aligned} u_x = v_y \quad \text{und} \quad u_y = -v_x \\ \Rightarrow u_x - v_y = 0 \end{aligned}$$

Sei nun $B \subseteq D$ Normalbereich.

Dann folgt mit Gauß für u und $-v$:

$$0 = \int_B (u_x - v_y) \, d(x, y) = \int_{\partial B} u \, dy + v \, dx$$

und für v und u :

$$0 = \int_B (v_x + u_y) \, d(x, y) = \int_{\partial B} v \, dy - u \, dx$$

Setze nun $z = x + iy$ und

$$f(z) := u(x, y) + i \cdot v(x, y).$$

f heißt differenzierbar in z , wenn für $h \in \mathbb{C}$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} =: f'(z)$$

existiert.

f heißt *holomorph*, wenn f im gesamten Definitionsbereich differenzierbar ist. f diffbar $\Rightarrow$ Cauchy-Riemann gilt (Aufgabe). Beschreibe den Rand von B mit

$$\partial B: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix}, \quad a \leq t \leq b.$$

Komplex ist dann:

$$z = \varphi(t) + i \cdot \psi(t)$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial B} f(z) dz &:= \int_{\partial B} (u + iv)(\varphi' + i\psi') dt \\ &= \int_a^b (u\varphi' - v\psi') dt + i \int_a^b (u\psi' + v\varphi') dt \\ &= \int_{\partial B} u dx - v dy + i \int_{\partial B} u dy + v dx = 0 \end{aligned}$$

(Cauchy'scher Integralsatz)

11.1.8 Die Greenschen Formeln

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Gebiet, $B \subseteq D$ ein Normalbereich und $u, v: D \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gelten

1. ($u \in C^1(D)$, $v \in C^2(D)$)

$$\int_B (u\Delta v + (\text{grad } u) \cdot (\text{grad } v)) d(x, y) = \int_{\partial B} u \frac{\partial v}{\partial \nu} ds$$

2. ($u, v \in C^2(D)$)

$$\int_B (u\Delta v - v\Delta u) d(x, y) = \int_{\partial B} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) ds$$

mit dem Laplace-Operator Δ :

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy}$$

und ν , der äußeren Normalen von ∂B .

Beweis

1. Setze

$$f = \begin{pmatrix} u \cdot v_x \\ u \cdot v_y \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \text{div } f &= (uv_x)_x + (uv_y)_y = u_x v_x + uv_{xx} + u_y v_y + uv_{yy} \\ &= u\Delta v + (\text{grad } u) \cdot (\text{grad } v) \end{aligned}$$

Mit $\nu = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix}$ gilt dann:

$$\begin{aligned} f \cdot \nu &= u(v_x \cdot \nu_1 + v_y \cdot \nu_2) \\ &= u \cdot (\text{grad } v) \cdot \nu \\ &= u \cdot \frac{\partial v}{\partial \nu} \text{ (Richtungsableitung)} \end{aligned}$$

Gaußschen Satz anwenden: ✓

2. Folgt aus 1.: u und v vertauschen, dann beide Integrale voneinander abziehen.

11.1.9 Definition: harmonisch, Potentialfunktion

$u \in C^2(D)$ heißt *harmonisch* oder *Potentialfunktion*, wenn $\Delta u = 0$ in D .

11.1.10 Gaußsche Mittelwertformel

Sei u harmonisch in D , $(x_0, y_0) \in D$. Dann gilt

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$$

für $0 < r < r_0(x_0, y_0)$.

Beweis: Sei OBdA $(x_0, y_0) \equiv (0, 0)$:

2. Greensche Formel für $v \equiv 1$:

$$\int_{\partial B} \frac{\partial u}{\partial \nu} ds = 0$$

Setze $B = K(0, r)$: Dann ist

$$\partial B: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Für den Normalenvektor gilt:

$$\nu = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

Mit $ds = r d\theta$ gilt dann:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{2\pi} (u_x \cdot \cos \theta + u_y \cdot \sin \theta) \quad | u_x(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} u(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{d}{dr} \int_0^{2\pi} u(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\ &\Rightarrow \int_0^{2\pi} u(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta = \text{const} \quad \text{für } 0 < r < r_0 \end{aligned}$$

Für $r \rightarrow 0$ geht das Integral gegen $u(0, 0) \cdot 2\pi$.

11.1.11 Minimum- Maximum-Prinzip

Ist u stetig in $\bar{D}$ und harmonisch in D , so ist u konstant oder

$$\min_{\partial D} u < u(x, y) < \max_{\partial D} u \text{ für } (x, y) \in D.$$

Beweis: Für max. (Für min betrachte $-u$): Setze

$$\begin{aligned} M &= \max_{\bar{D}} u \\ A &= \{(x, y) \in D : u(x, y) = M\} \\ B &= D - A = \{(x, y) \in D : u(x, y) < M\} \end{aligned}$$

B ist offen, da u stetig ist.

Sei nun $(x_0, y_0) \in A$:

$$\begin{aligned} M &= u(x_0, y_0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta)}_{\leq M} d\theta \text{ für } 0 < r < r_0 \\ &\leq M \end{aligned}$$

Da u stetig ist, gilt für $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r < r_0$:

$$u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) = M.$$

Das heißt, daß $K((x_0, y_0), r_0) \subseteq A$, A offen.

Da $A \cap B = \emptyset$ und D zusammenhängend, folgt:

$\Rightarrow$ 1. Alternative: $A = \emptyset$, $B = D$: $u < M$ in D .

$\Rightarrow$ 2. Alternative: $B = \emptyset$, $A = D$: $u = M$ in D .

11.2 Flächen im $\mathbb{R}^3$

11.2.1 Definition: Vektorprodukt

Für $a, b \in \mathbb{R}^3$,

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

heißt

$$a \times b = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Vektorprodukt oder *Kreuzprodukt*.

Mit den Einheitsvektoren e^1 , e^2 und e^3 ist

$$a \times b = \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} e^1 - \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} e^2 + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} e^3.$$

Symbolisch geschrieben:

$$a \times b = \begin{vmatrix} e^1 & a_1 & b_1 \\ e^2 & a_2 & b_2 \\ e^3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

11.2.2 Bemerkungen/Regeln

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}^3$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

(a) $a \times b = -b \times a$.

(b) $(\lambda a + \mu b) \times c = \lambda(a \times c) + \mu(b \times c)$.

(c) $a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$.

(d)

$$(a \times b) \cdot c = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \det(a, b, c).$$

(e) $a \times b = 0 \iff a, b$ sind linear abhängig.

(f) $a \times b$ ist orthogonal zu a und b , also auch zu

$$E = \{\lambda a + \mu b : \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

(g) Seien a und b linear unabhängig und

$$P = \{\lambda a + \mu b : 0 \leq \lambda, \mu \leq 1\}$$

das von a und b aufgespannte Parallelotop. Dann ist

$$\begin{aligned} \det(a, b, a \times b) &= \text{3-dimensionales Volumen von} \\ &\quad \{\lambda a + \mu b + \nu(a \times b) : 0 \leq \lambda, \mu, \nu \leq 1\} \\ &= \text{Fläche von } P = \|a \times b\|^2. \end{aligned}$$

Damit ist

$$\det(a, b, a \times b) = (a \times b) \cdot (a \times b) = \|a \times b\|^2$$

und

$$\text{Fläche von } P = \|a \times b\|$$

11.2.3 Def.: Parameterdarstellung eines Flächenstücks

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ein beschränktes Gebiet, $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ heißt *Parameterdarstellung* des Flächenstücks $\Phi(D)$, wenn gilt:

1) Φ ist stetig differenzierbar, $\text{rg } \Phi' = 2$ überall,

2) Φ ist injektiv.

Die Ebene durch den Punkt $\Phi(u, v)$,

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \Phi(u, v) + \lambda \Phi_u(u, v) + \mu \Phi_v(u, v) : \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

heißt Tangentialebene im Punkt $\Phi(u, v)$.

$$\nu = \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|}$$

ist der Normalenvektor an $\Phi(D)$. ν steht senkrecht auf der Tangentialebene.

11.2.4 Explizite Fläche

„ $z = \varphi(x, y)$ “: Sei $\varphi \in C^1(D)$, $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}$.

Setze

$$\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ \varphi(u, v) \end{pmatrix}.$$

Es ist dann

$$\Phi' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \varphi_u & \varphi_v \end{pmatrix}, \quad \text{rg } \Phi' = 2,$$

$$\Phi_u \times \Phi_v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \varphi_u \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \varphi_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\varphi_u \\ -\varphi_v \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{1 + \varphi_u^2 + \varphi_v^2}} \cdot \begin{pmatrix} -\varphi_u \\ -\varphi_v \\ 1 \end{pmatrix}.$$

11.2.5 Mantelfläche

γ sei ein ebener Jordanbogen mit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(s) \\ \psi(s) \end{pmatrix}, \quad a \leq s \leq b.$$

$$s \mapsto \begin{pmatrix} \varphi(s) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

ist injektiv, $\varphi, \psi \in C^1([a, b])$.

Seien $\alpha, \beta: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, C^1 , $\alpha < \beta$.

Wähle

$$D = \{(s, t) : a < s < b, \alpha(s) < t < \beta(s)\}$$

und die Parameterdarstellung

$$\Phi(s, t) = \begin{pmatrix} \varphi(s) \\ \psi(s) \\ t \end{pmatrix}$$

mit

$$\Phi_s \times \Phi_t = \begin{pmatrix} \varphi' \\ \psi' \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi'(s) \\ -\varphi'(s) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

11.2.6 Rotationsfläche

„ $r = r(x)$ “: Sei $r: (a, b) \rightarrow (0, \infty)$ stetig differenzierbar. Rotiere den Graphen von r um die x -Achse.

Wähle

$$D = \{(t, \theta) : a < t < b, 0 < \theta < 2\pi\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Dann ist

$$\Phi(t, \theta) = \begin{pmatrix} t \\ r(t) \cos \theta \\ r(t) \sin \theta \end{pmatrix}$$

die Parameterdarstellung einer Rotationsfläche mit

$$\Phi_t \times \Phi_\theta = \begin{pmatrix} 1 \\ r'(t) \cos \theta \\ r'(t) \sin \theta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -r(t) \sin \theta \\ r(t) \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) \cdot r'(t) \\ -r(t) \cos \theta \\ -r(t) \sin \theta \end{pmatrix}.$$

11.2.7 Satz

Stellen $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ und $\Psi: G \rightarrow \mathbb{R}^3$ dasselbe Flächenstück $\mathcal{F} = \Phi(D) = \Psi(G)$ dar, dann gibt es einen Diffeomorphismus $h: D \rightarrow G$ (h injektiv, C^1 und h^{-1} ebenfalls injektiv und C^1) mit $\Phi = \Psi \circ h$.

Beweis: Definiere $h = \Psi^{-1} \circ \Phi$. Zeige: $h \in C^1$.

Es ist $\text{rg } \Psi' = 2$. Sei $(s_0, t_0) \in G$: Dann gilt z. B.

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial \Psi_1}{\partial s} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial s} \\ \frac{\partial \Psi_1}{\partial t} & \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} \end{pmatrix} \neq 0 \text{ in } (s_0, t_0).$$

Setze

$$\bar{\Phi} = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \end{pmatrix}, \quad \bar{\Psi} = \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix}.$$

$\bar{\Psi}$ hat Umkehrfunktion in einer Umgebung von $\bar{\Psi}(s_0, t_0) = (u_0, v_0)$.

$\bar{\Psi}^{-1}$ ist C^1 (Satz über die Umkehrfunktion bei mehreren Veränderlichen).

$\bar{\Psi}^{-1} \circ \bar{\Phi}$ ist C^1 in einer Umgebung von (u_0, v_0) .

Es gilt: $h = \bar{\Psi}^{-1} \circ \bar{\Phi}$ in Umgebung von (u_0, v_0) .

Es ist $\bar{\Phi} = \bar{\Psi} \circ h$ nach Definition.

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_1 = \Psi_1 \circ h \\ \Phi_2 = \Psi_2 \circ h \\ \Phi_3 = \Psi_3 \circ h \end{array} \right\} \bar{\Phi} = \bar{\Psi} \circ h, \quad h = \bar{\Psi}^{-1} \circ \bar{\Phi}$$

Dasselbe für $h^{-1} = \bar{\Phi}^{-1} \circ \bar{\Psi}$, also ist auch h^{-1} in C^1 .

11.2.8 Zusatz

Es gilt:

$$\Phi_u \times \Phi_v = (\Psi_s \times \Psi_t) \circ h \cdot \det h'.$$

Beweis: Es ist $\Phi = \Psi \circ h$.

Damit ist $\Phi' = \Psi' \circ h \cdot h'$. Setze

$$\Phi' = (\Phi_u, \Phi_v) =: (a, b)$$

$$\Psi' = (\Psi_s, \Psi_t) =: (c, d)$$

und

$$h' = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}.$$

Dabei sei

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \dots$$

Damit ist

$$\begin{aligned} a &= c_{11}c + c_{21}d \\ b &= c_{12}c + c_{22}d \end{aligned}$$

Daraus folgt dann:

$$\begin{aligned} \Phi_u \times \Phi_v &= a \times b = c_{11}c_{22}(c \times d) + c_{21}c_{12}(d \times c) \\ &= (c_{11}c_{22} - c_{21}c_{12})(c \times d) = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix} (c \times d) \end{aligned}$$

11.2.9 Definition: Flächenintegral, Oberfläche

Ist $\mathcal{F}$ ein Flächenstück und $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so heißt

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do := \int_D f(\Phi(u, v)) \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, d(u, v)$$

Oberflächenintegral von f über $\mathcal{F}$, und

$$\int_{\mathcal{F}} do = \int_D \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, d(u, v)$$

die Oberfläche von $\mathcal{F}$ (Flächeninhalt).

11.2.10 Satz

Die Definition von

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do$$

ist unabhängig von der Parameterdarstellung Φ .

Beweis: Seien $\Phi: D \rightarrow \mathcal{F}$ und $\Psi: G \rightarrow \mathcal{F}$ zwei Darstellungen von $\mathcal{F}$. Es ist dann $\Phi = \Psi \circ h$ und

$$\Phi_u \times \Phi_v = (\Psi_s \times \Psi_t) \circ h \cdot \det h'.$$

Damit ist

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| = \|(\Psi_s \times \Psi_t) \circ h\| \cdot |\det h'|$$

und mit der Transformationsformel gilt:

$$\begin{aligned} &\int_D f(\Phi(u, v)) \|\Phi_u \times \Phi_v\| \, d(u, v) \\ &= \int_D f(\Psi(h(u, v))) \cdot \|(\Psi_s \times \Psi_t) \circ h(u, v)\| \cdot |\det h'(u, v)| \, d(u, v) \\ &= \int_G f(\Psi(s, t)) \|\Psi_s \times \Psi_t\| \, d(s, t) \end{aligned}$$

11.2.11 Beispiele

Explizite Fläche: Sei $z = \varphi(x, y)$, $\varphi \in C^1(D)$. Dann ist

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do = \int_D f(x, y, \varphi(x, y)) \sqrt{1 + (\varphi_x(x, y))^2 + (\varphi_y(x, y))^2} \, d(x, y)$$

Konkret: Oberfläche der nördlichen Halbkugel: Setze

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

für

$$(x, y) \in D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Damit gilt dann:

$$\begin{aligned} \text{Oberfläche} &= \int_D \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{1 - x^2 - y^2}} \, d(x, y) = \int_D \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \, d(x, y) \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{Polarkoordinaten:} \\ x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{array} \right| = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} r \, d\theta \, dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} \, dr = 2\pi \left(-\sqrt{1 - r^2} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \end{aligned}$$

Rotationsfläche: $r = r(x)$:

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do = \int_a^b \int_0^{2\pi} f(t, r(t) \cos \theta, r(t) \sin \theta) r(t) \cdot \sqrt{1 + (r'(t))^2} \, d\theta \, dt$$

Mantelfläche:

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do = \int_a^b \int_{\alpha(s)}^{\beta(s)} f(\varphi(s), \psi(s), t) \sqrt{q + (\varphi'(s))^2 + (\psi'(s))^2} \, dt \, ds$$

z. B. Torus:

Darstellung der Kreislinie: $(x - R)^2 + z^2 = r^2$, $y = 0$.

Polarkoordinaten der Kreislinie:

$$\begin{aligned} x &= R + r \cos \theta \\ y &= 0 \\ z &= r \sin \theta \end{aligned}$$

Darstellung des Torus:

$$\Phi(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (R + r \cos \theta) \cdot \cos \varphi \\ (R + r \cos \theta) \cdot \sin \varphi \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$$

mit $0 < \varphi < 2\pi$ und $0 < \theta < 2\pi$. Dann ist

$$\begin{aligned} \Phi_\theta \times \Phi_\varphi &= \begin{pmatrix} -r \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ -r \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} (R + r \cos \theta)(-\sin \varphi) \\ (R + r \cos \theta)(\cos \varphi) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -r(R + r \cos \theta) \cos \theta \cdot \cos \varphi \\ r(R + r \cos \theta) \cos \theta \cdot \sin \varphi \\ r(R + r \cos \theta) \sin \theta \cdot (-1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\|\Phi_\theta \times \Phi_\varphi\| = r(R + r \cos \theta) \cdot 1$$

Für die Oberfläche gilt dann:

$$\begin{aligned} \text{Oberfläche} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} r(R + r \cos \theta) \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi \left(2\pi \cdot r \cdot R + r \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta \right) = (2\pi R)(2\pi r) \end{aligned}$$

11.2.12 Bemerkungen

(a)

$$\int_{\mathcal{F}} f \, do$$

heißt auch *nichtorientiertes Flächenintegral*.

(b) Sei $\mathcal{F}$ ein Flächenstück, $\Phi: D \rightarrow \mathcal{F}$, $\nu = \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|}$.
 $g: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei Vektorfeld mit $g = (g_1, g_2, g_3)^T$.

$$\int_F g \cdot \nu \, do$$

ist wohldefiniert und ist das *orientierte Flächenintegral*.

Sei jetzt $\Psi: G \rightarrow \mathcal{F}$ eine zweite Darstellung der Fläche mit $\Phi = \Psi \circ h$, $h: D \rightarrow G$ ist Diffeomorphismus und es gilt

$$\begin{aligned} \Phi_u \times \Phi_v &= (\Psi_s \times \Psi_t) \circ g \cdot \det h' \\ \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|} &= \frac{\Psi_s \times \Psi_t}{\|\Psi_s \times \Psi_t\|} \cdot \underbrace{\frac{\det h'}{|\det h'|}}_{\equiv +1 \text{ oder } -1 \text{ überall}} \end{aligned}$$

Das heißt, daß das Vorzeichen von ν von Φ abhängt.

(c) Sind $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_m$ Flächenstücke mit $\mathcal{F}_j \cap \mathcal{F}_k = \emptyset$ für $j \neq k$, so setzt man

$$\int_{\mathcal{F}_1 \cup \dots \cup \mathcal{F}_m} f \, do := \sum_{j=1}^m \int_{\mathcal{F}_j} f \, do.$$

11.3 Integralsätze (Gauß, Stokes) im $\mathbb{R}^3$

11.3.1 Definition/Motivation

Ein z -Normalbereich $B \subseteq \mathbb{R}^3$ ist eine Menge der Form

$$B = \{(x, y, z) : \varphi(x, y) < z < \psi(x, y), (x, y) \in D\}$$

mit einem Gebiet $D \subseteq \mathbb{R}^2$, das von einer stückweise C^1 -Kurve berandet ist und mit stetig differenzierbaren $\phi, \psi: D \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x, y) < \psi(x, y)$ in D und φ, ψ stetig in $\overline{D}$.

Der Rand ∂B wird aufgefaßt als Vereinigung von drei Flächenstücken: dem Mantel, dem Boden und dem Deckel.

Der Mantel M ist

$$M = \{(x, y, z) : (x, y) \in \partial D, \varphi(x, y) < z < \psi(x, y)\}.$$

Die Normale ν am Mantel ist

$$\nu = \begin{pmatrix} * \\ * \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Boden F_u ist

$$F_u = \{(x, y, \varphi(x, y)) : (x, y) \in D\}.$$

Die Normale ν am Boden ist

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}} \begin{pmatrix} \varphi_x(x, y) \\ \varphi_y(x, y) \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Der Deckel F_o ist

$$F_o = \{(x, y, \psi(x, y)) : (x, y) \in D\}.$$

Die Normale ν am Deckel ist

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2}} \begin{pmatrix} -\psi_x(x, y) \\ -\psi_y(x, y) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Sei nun $w: \overline{B} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, w_z stetig in B und beschränkt. Dann ist

$$\begin{aligned} \int_B w_z(x, y, z) d(x, y, z) &= \int_D \left(\int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} w_z dz \right) d(x, y) \\ &= \int_D w(x, y, \psi(x, y)) d(x, y) - \int_D w(x, y, \varphi(x, y)) d(x, y) \\ &= \int_D w(x, y, \psi(x, y)) \cdot \nu_3 \cdot \sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2} d(x, y) \\ &\quad - \int_D w(x, y, \varphi(x, y)) \cdot \nu_3 \cdot \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2} d(x, y) \\ &= \int_{F_o} w \cdot \nu_3 do + \int_{F_u} w \cdot \nu_3 do + \underbrace{\int_M w \cdot \nu_3 do}_{=0, \text{ da } \nu_3=0} \end{aligned}$$

$$= \int_{\partial B} w \cdot \nu_3 \, d\sigma \quad (\text{Nach Definition})$$

11.3.2 Integralsatz von Gauß im $\mathbb{R}^3$

$$\int_B \operatorname{div} f \, d(x, y, z) = \int_{\partial B} f \cdot \nu \, d\sigma$$

Dabei gilt:

$B \subseteq \mathbb{R}^3$ ist ein xyz -Normalbereich,

$f = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ ist ein C^1 -Vektorfeld in B , stetig auf $\bar{B}$,

u_x, v_y, w_z seien beschränkt,

∂B wird als Vereinigung von Flächen aufgefaßt, ν = Normale zur Fläche ∂B und

$$\operatorname{div} f = u_x + v_y + w_z$$

Beweis: ✓, siehe oben, fasse für alle drei Richtungen zusammen.

11.3.3 Bemerkung

- 1) Die Greenschen Formeln (siehe 11.1.8 auf der Seite 319) gelten auch hier (mit $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$).
- 2) Der Gaußsche Satz gilt für *Normalbereiche*, d. h. endliche disjunkte Vereinigung von xyz -Normalbereichen.

11.3.4 Bezeichnungen der Vektoranalysis

Der *Nablaoperator*:

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Es ist

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = \operatorname{grad} u$$

Der *Laplaceoperator*:

$$\Delta := \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$

Formal gilt:

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)^2 \quad (= \nabla^2)$$

Die *Divergenz* von f :

$$\operatorname{div} f = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} + \frac{\partial f_3}{\partial z} = \nabla \cdot f$$

Die *Rotation* von f :

$$\operatorname{rot} f = \left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z}, \frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x}, \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right)$$

Es ist

$$\operatorname{rot} f = \nabla \times f$$

11.3.5 Regeln

Sei u eine skalare Funktion, f ein Vektorfeld, definiert in $D \subseteq \mathbb{R}^3$. Dann ist

1. $\operatorname{rot}(uf) = u \operatorname{rot} f + (\nabla u) \times f$ für $u, f \in C^1$.
2. $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = 0$ für $u \in C^2$.
3. $\operatorname{div} \operatorname{rot} f = 0$ für $f \in C^2$.

11.3.6 Satz: Lemma von Poincaré

Im Lemma von Poincaré (9.5.6 auf Seite 249) wurde gezeigt:

Im Sterngebiet $D \subseteq \mathbb{R}^3$ besitzt ein C^1 -Vektorfeld genau dann eine Stammfunktion, wenn $\operatorname{rot} f = 0$ ist.

11.3.7 Integralsatz von Stokes im $\mathbb{R}^3$

Es ist

$$\int_{\mathcal{F}} (\operatorname{rot} f) \cdot \nu \, d\sigma = \int_{\partial\mathcal{F}} P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

Dabei ist:

1. $D \subseteq \mathbb{R}^3$ Gebiet, $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, zweimal stetig differenzierbar, injektiv, $\operatorname{rg} \Phi' = 2$
2. $B \subseteq D$, B Normalbereich
3. $\mathcal{F} = \Phi(B)$ Fläche
4. $\partial\mathcal{F} := \Phi(\partial B)$ Kurve im $\mathbb{R}^3$
5. $f = \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix}$ ist C^1 -Vektorfeld in einer offenen Menge $U \supset \mathcal{F} \cup \partial\mathcal{F}$.

Beweis: Sei ∂B parametrisiert nach der Bogenlänge:

$$\begin{aligned} u &= \varphi(s) \\ v &= \psi(s) \end{aligned} \quad 0 \leq s \leq \text{Länge von } \partial B = L$$

Φ habe die Koordinaten X, Y und Z :

$$p(u, v) := P(\Phi(u, v)) = P(X(u, v), Y(u, v), Z(u, v))$$

Damit gilt für $\partial\mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} x &= X(\varphi(s), \psi(s)) \\ y &= Y(\varphi(s), \psi(s)) \\ z &= Z(\varphi(s), \psi(s)) \end{aligned}$$

Daraus folgt dann:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\mathcal{F}} P dx &= \int_0^L p(\varphi(s), \psi(s)) \cdot \left(\frac{d}{ds} X(\varphi(s), \psi(s)) \right) ds \\ &= \int_0^L p(X_u \cdot \varphi' + X_v \cdot \psi') ds = \int_{\partial B} pX_u du + pX_v dv \\ &\stackrel{\odot}{=} \int_B ((pX_v)_u - (pX_u)_v) d(u, v) \end{aligned}$$

(mit $\odot$: Gauß im $\mathbb{R}^2$).

Nach dem Satz von H. A. Schwarz gilt:

$$(pX_v)_u - (pX_u)_v = p_u X_v - p_v X_u$$

Für den Gradienten von p gilt:

$$\begin{aligned} p_u &= P_x X_u + P_y Y_u + P_z Z_u \\ p_v &= P_x X_v + P_y Y_v + P_z Z_v \end{aligned}$$

Damit gilt dann:

$$\begin{aligned} (pX_v)_u - (pX_u)_v &= p_u X_v - p_v X_u \\ &= P_y Y_u X_v - P_y Y_v X_u + P_z Z_u X_v - P_z Z_v X_u \\ &= P_y \begin{pmatrix} Y_u & X_u \\ Y_v & X_v \end{pmatrix} + P_z \begin{pmatrix} Z_u & X_u \\ Z_v & X_v \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Zusammen gilt dann für das Integral:

$$\begin{aligned} \int_{\partial\mathcal{F}} P dx &= \int_B ((pX_v)_u - (pX_u)_v) d(u, v) \\ &= \int_B P_y \begin{pmatrix} Y_u & X_u \\ Y_v & X_v \end{pmatrix} + P_z \begin{pmatrix} Z_u & X_u \\ Z_v & X_v \end{pmatrix} d(u, v) \\ &\stackrel{?}{=} \int_{\mathcal{F}} (-P_y \nu_3 + P_z \nu_2) do \end{aligned}$$

Gilt das „?“?

Sei

$$\nu = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} = \frac{\Phi_u \times \Phi_v}{\|\Phi_u \times \Phi_v\|}.$$

Damit ist dann

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{F}} (-P_y \cdot \nu_3 + P_z \cdot \nu_2) do &= \int_B (-P_y \cdot \nu_3 + P_z \cdot \nu_2) \cdot \|\Phi_u \times \Phi_v\| d(u, v) \\ &= \int_B (-P_y \cdot (\Phi_u \times \Phi_v)_3 + P_z (\Phi_u \times \Phi_v)_2) d(u, v) \end{aligned}$$

Für $\Phi_u \times \Phi_v$ gilt:

$$\begin{aligned}\Phi_u \times \Phi_v &= \begin{vmatrix} e^1 & X_u & X_v \\ e^2 & Y_u & Y_v \\ e^3 & Z_u & Z_v \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} Y_u & Y_v \\ Z_u & Z_v \end{vmatrix} e^1 - \underbrace{\begin{vmatrix} X_u & X_v \\ Z_u & Z_v \end{vmatrix}}_{\nu_2} e^2 + \underbrace{\begin{vmatrix} X_u & X_v \\ Y_u & Y_v \end{vmatrix}}_{\nu_3} e^3,\end{aligned}$$

d. h.: Das „?“ gilt, wenn

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| \cdot (-\nu_3) = \begin{vmatrix} Y_u & X_u \\ Y_v & X_v \end{vmatrix}$$

und

$$\|\Phi_u \times \Phi_v\| \cdot \nu_2 = \begin{vmatrix} Z_u & X_u \\ Z_v & X_v \end{vmatrix}$$

Dies ist erfüllt. ✓

Zusammen gilt dann:

$$\begin{aligned}\int_{\partial\mathcal{F}} P dx &= \int_{\mathcal{F}} (-P_y \nu_3 + P_z \nu_2) do \\ \int_{\partial\mathcal{F}} Q dy &= \int_{\mathcal{F}} (-Q_z \nu_1 + Q_x \nu_3) do \\ \int_{\partial\mathcal{F}} R dz &= \int_{\mathcal{F}} (-R_x \nu_2 + R_y \nu_1) do.\end{aligned}$$

Addition liefert:

$$\begin{aligned}\int_{\partial\mathcal{F}} P dx + Q dy + R dz &= \int_{\mathcal{F}} \nu_1(R_y - Q_z) + \nu_2(P_z - R_x) + \nu_3(Q_x - P_y) do \\ &= \int_{\mathcal{F}} \nu \cdot \operatorname{rot} f do\end{aligned}$$

11.4 Differentialformen

In diesem Abschnitt gilt immer: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen. Alle Funktionen $U \rightarrow \mathbb{R}$ sind wenigstens stetig, bzw. aus C^n .

11.4.1 Definition: multilinear, alternierend, p -Form

Eine stetige Funktion $\omega: U \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{p\text{-mal}}$ heißt p -Form ($0 \leq p \leq n$), wenn sie *multilinear* und

alternierend ist.

Sei $\omega(x, h^1, h^2, \dots, h^p)$ mit $h^1, \dots, h^p \in \mathbb{R}^n$, $x \in U$.

Dann heißt multilinear:

$$\omega(x, \dots, \alpha h^i + \beta k^i, \dots, h^p) = \alpha \cdot \omega(x, \dots, h^i, \dots) + \beta \cdot \omega(x, \dots, k^i, \dots)$$

und alternierend:

$$\omega(\dots h^i \dots h^j \dots) = -\omega(\dots h^j \dots h^i \dots) \text{ für } i \neq j$$

11.4.2 Beispiele

(a) $p = 0$: Dann ist $\omega: U \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktion.

(b) $p = 1$:

$$\omega(x, h) = \omega\left(x, \sum_{\nu=1}^n h_{\nu} \cdot e^{\nu}\right) = \sum_{\nu=1}^n \omega(x, e^{\nu}) h_{\nu}$$

(Linearform)

(c) $p = 2$:

$$\omega(x, h, k) = \sum_{\nu=1}^n \omega(x, e^{\nu}, k) h_{\nu} = \sum_{\mu, \nu=1}^n \omega(x, e^{\nu}, e^{\mu}) h_{\nu} h_{\mu}$$

(quadratische Form)

$(\omega(x, e^{\nu}, e^{\mu}))_{\mu, \nu=1}^n$ ist schiefsymmetrisch:

$$\omega(x, e^{\nu}, e^{\mu}) = -\omega(x, e^{\mu}, e^{\nu})$$

(d) $p = n$:

$$\omega(x, h^1, \dots, h^n) = a(x) \begin{vmatrix} h_1^1 & h_1^2 & \dots & h_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_n^1 & h_n^2 & \dots & h_n^n \end{vmatrix}$$

11.4.3 Grundformen

Für $i_1, \dots, i_p \in \{1, \dots, n\}$ heißt

$$\omega(h^1, \dots, h^p) := \begin{vmatrix} h_{i_1}^1 & \dots & h_{i_1}^p \\ h_{i_2}^1 & & h_{i_2}^p \\ \vdots & & \vdots \\ h_{i_p}^1 & \dots & h_{i_p}^p \end{vmatrix}$$

Grundform. Sie wird bezeichnet mit

$$dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}(h^1, \dots, h^p) = \omega(h^1, \dots, h^p)$$

11.4.4 Beispiel

(b) $p = 1$:

$$\omega(x, h) = \sum_{\nu=1}^n \underbrace{\omega(x, e^{\nu})}_{a_{\nu}(x)} dx_{\nu}(h)$$

(c) $p = 2$:

$$\omega(x, h, k) = \sum_{\mu, \nu=1}^n \underbrace{\omega(x, e^{\nu}, e^{\mu})}_{a_{\nu\mu}(x)} dx_{\nu} \wedge dx_{\mu}$$

(d) $p = n$:

$$\omega = a(x) dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n$$

11.4.5 Darstellungssatz

Jede p -Form lässt sich darstellen als

$$(*) \quad \omega = \sum_{i_1, \dots, i_p} a_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} b_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$$

Beweis: in 11.4.7

11.4.6 Beispiele im $\mathbb{R}^3$

Im $\mathbb{R}^3 \Rightarrow n = 3$.

$p = 1$:

$$a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3$$

$p = 2$:

$$\begin{aligned} & \underbrace{a_{11} dx_1 \wedge dx_1}_{=0} + a_{12} dx_1 \wedge dx_2 + a_{13} dx_1 \wedge dx_3 \\ & \quad + a_{21} dx_2 \wedge dx_1 + \underbrace{a_{22} dx_2 \wedge dx_2}_{=0} + a_{23} dx_2 \wedge dx_3 \\ & \quad + a_{31} dx_3 \wedge dx_1 + a_{32} dx_3 \wedge dx_2 + \underbrace{a_{33} dx_3 \wedge dx_3}_{=0} = 0 \\ & = (a_{12} - a_{21}) dx_1 \wedge dx_2 + (a_{13} - a_{31}) dx_1 \wedge dx_3 + (a_{23} - a_{32}) dx_2 \wedge dx_3 \end{aligned}$$

$p = 3$:

$$a dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$$

11.4.7 Beweis des Darstellungssatzes (11.4.5)

$$\begin{aligned} \omega(x, h^1, \dots, h^p) &= \omega \left(x, \sum_{i_1=1}^n h_{i_1}^1 e^{i_1}, \dots, \sum_{i_p=1}^n h_{i_p}^p e^{i_p} \right) = \sum_{i_1=1}^n \omega \left(x, e^{i_1}, \dots, \sum_{i_p=1}^n h_{i_p}^p e^{i_p} \right) h_{i_1}^1 \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n \omega(x, e^{i_1}, e^{i_2}, \dots, e^{i_p}) h_{i_1}^1 \dots h_{i_p}^p \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n a_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} (e^{i_1}, \dots, e^{i_p}) h_{i_1}^1 \dots h_{i_p}^p \\ &= \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n a_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} (h^1, \dots, h^p) \end{aligned}$$

ordnen:

$$= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} b_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$$

11.4.8 Definition: Ableitung von p -Formen

Eine p -Form $(*)$ heißt k -mal stetig differenzierbar, wenn alle $a_{i_1 \dots i_p} \in C^k(U)$ sind. Für $p = 0$, $\omega = a(x)$ heißt

$$d\omega := \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu} dx_\nu$$

äußere Ableitung von ω ,
und für $p \geq 1$,

$$\omega = a(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$$

ist

$$d\omega = \sum_{i_1, \dots, i_p} (da_{i_1 \dots i_p}) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} = \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu}(x) dx_\nu \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}.$$

$d\omega$ ist eine $(p+1)$ -Form.

11.4.9 Multiplikation von Formen

$$dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge (dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}) := dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}$$

Damit ist auch für p -Form ω und q -Form σ $(d\omega) \wedge (d\sigma)$ erklärt.

11.4.10 Regeln zur Differenzierung von Formen

(1) Seien ω_1 und ω_2 p -Formen:

$$d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2$$

(2) Sei a eine 0-Form und ω eine p -Form:

$$d(a\omega) = (da) \wedge \omega + a(d\omega)$$

(3) Sei ω_1 eine p -Form und ω_2 eine q -Form:

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2) = (d\omega_1) \wedge \omega_2 + (-1)^p \omega_1 \wedge d(\omega_2)$$

Beweis: Aufgabe

11.4.11 Beispiele

(a) $p = 0$:

$$\begin{aligned} \omega(x) &= a(x) \\ da(h) &= \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu} dx_\nu(h) = \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu} h_\nu = (\text{grad } a) \cdot h \end{aligned}$$

(b) $a(x) = x_\nu$:

$$da = dx_\nu$$

(c)

$$\begin{aligned}\omega &= a_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &\quad - a_2 dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n + \cdots \\ &\quad + (-1)^{n+1} a_n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d\omega &= \sum_{\nu=1}^n \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_\nu} dx_\nu \right) dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n - \cdots + \cdots \\ &= \frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n + \cdots \\ &= \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial a_n}{\partial x_n} \right) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n = (\operatorname{div} a) \cdot dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n\end{aligned}$$

$$\text{mit } a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

(d) $n = 3$:

$$\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3$$

$$\begin{aligned}d\omega &= \underbrace{\frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_1}_{=0} + \frac{\partial a_1}{\partial x_2} dx_2 \wedge dx_1 + \frac{\partial a_1}{\partial x_3} dx_3 \wedge dx_1 \\ &\quad + \frac{\partial a_2}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_2 + \underbrace{\frac{\partial a_2}{\partial x_2} dx_2 \wedge dx_2}_{=0} + \frac{\partial a_2}{\partial x_3} dx_3 \wedge dx_2 \\ &\quad + \frac{\partial a_3}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_3 + \frac{\partial a_3}{\partial x_2} dx_2 \wedge dx_3 + \underbrace{\frac{\partial a_3}{\partial x_3} dx_3 \wedge dx_3}_{=0} \\ &= \left(\frac{\partial a_3}{\partial x_2} - \frac{\partial a_2}{\partial x_3} \right) dx_2 \wedge dx_3 \\ &\quad + \left(\frac{\partial a_1}{\partial x_3} - \frac{\partial a_3}{\partial x_1} \right) dx_3 \wedge dx_1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x_1} - \frac{\partial a_1}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 \\ &\stackrel{\text{formal}}{=} (\operatorname{rot} a) \cdot (dx_2 \wedge dx_3, dx_3 \wedge dx_1, dx_1 \wedge dx_2)\end{aligned}$$

11.4.12 SatzFür jede C^2 -Form ω gilt:

$$d(d\omega) = 0$$

Beweis: In zwei Abschnitten:

- 1.) für $p = 0$,
- 2.) für $p \geq 1$.

zu 1.) Sei $p = 0$, $\omega = a(x)$:

$$\begin{aligned} d(da) &= d\left(\sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu} dx_\nu\right) = \sum_{\mu=1}^n \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial}{\partial x_\mu} \left(\frac{\partial a}{\partial x_\nu}\right) dx_\mu \wedge dx_\nu \\ &= \sum_{1 \leq \mu < \nu \leq n} \underbrace{\left(\frac{\partial^2 a}{\partial x_\mu \partial x_\nu} - \frac{\partial^2 a}{\partial x_\nu \partial x_\mu}\right)}_{=0 \text{ (H. A. Schwarz)}} dx_\mu \wedge dx_\nu \\ &= 0 \end{aligned}$$

zu 2.)

$$\omega = a(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p = a\sigma$$

$$d\omega \stackrel{(2)}{=} (da) \wedge \sigma + a \underbrace{(d\sigma)}_{=0}$$

$$d(d\omega) \stackrel{(3)}{=} d(da) \wedge \sigma + (-1)^1 da \wedge \underbrace{(d\sigma)}_{=0} = d(da) = 0,$$

denn es gilt

$$d\sigma = d(x_1 \wedge \cdots \wedge dx_p) = (d_1) \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p = 0$$

11.4.13 Bemerkungen

(a) $d(da) = 0 \iff$ Satz von Schwarz.

(b) Sei u eine C^1 -Funktion, $n = 3$:

$$\omega = \frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial u}{\partial x_3} dx_3 = du$$

$$d\omega = d(du) = 0 \iff \operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = 0$$

(c)

$$\begin{aligned} \omega &= a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 \\ d\omega &= (\operatorname{rot} a) \cdot (dx_2 \wedge dx_3, dx_3 \wedge dx_1, dx_1 \wedge dx_2) \\ 0 &= d(d\omega) = (\operatorname{div}(\operatorname{rot} a)) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \\ &\Rightarrow \operatorname{div} \operatorname{rot} a = 0 \end{aligned}$$

11.4.14 Definition: Stammform, geschlossen

(a) Eine p -Form ω heißt *exakt*, wenn es eine $(p-1)$ -Form α gibt mit $d\alpha = \omega$. α heißt dann *Stammform*.

(b) Eine stetig differenzierbare p -Form ω heißt *geschlossen*, wenn $d\omega = 0$ ist.

11.4.15 Beispiele/Bemerkungen

- (1) Ist
- ω
- exakt und
- C^1
- , so ist
- ω
- geschlossen.

Beweis:

$$\omega = d\alpha \implies d\omega = d(d\alpha) = 0$$

- (2) Sei
- ω
- geschlossene 1-Form,
- U
- ein Sterngebiet und
- $\omega \in C^1$
- . Dann ist
- ω
- exakt.

Beweis: Sei

$$\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + \cdots + a_n dx_n$$

mit $a_1, \dots, a_n \in C^1(U)$. ω geschlossen:

$$\implies d\omega = 0 = \sum_{1 \leq \mu < \nu \leq n} \left(\frac{\partial a_\mu}{\partial x_\nu} - \frac{\partial a_\nu}{\partial x_\mu} \right) dx_\mu \wedge dx_\nu$$

also

$$\frac{\partial a_\mu}{\partial x_\nu} = \frac{\partial a_\nu}{\partial x_\mu}$$

Daraus folgt (Analysis II):

$$(a_1, \dots, a_n) = \text{grad}(u)$$

mit $u \in C^2(U)$. U : Nullform:

$$du = \sum_{\nu=1}^n \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_\nu}}_{a_\nu} dx_\nu = \omega$$

- (3)

$$\omega = \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

ist geschlossen (Aufgabe).

 ω ist in $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ nicht exakt, sonst wäre

$$2\pi = \int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0$$

für jede geschlossene Kurve $C \subseteq \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

- (4) Wenn
- ω
- nicht geschlossen ist, aber
- $M(x)\omega$
- geschlossen ist, dann heißt
- M
- integrierender Faktor.

 $p = 1$: Sei

$$\begin{aligned} \omega &= a_1 dx_1 + \cdots + a_n dx_n \\ M\omega &= Ma_1 dx_1 + \cdots + Ma_n dx_n \end{aligned}$$

Sei nun $M\omega$ geschlossen:

$$\begin{aligned} \iff \frac{\partial(Ma_\mu)}{\partial x_\nu} &= \frac{\partial(Ma_\nu)}{\partial x_\mu} \\ \iff X_{x_\nu} a_\mu + M \frac{\partial a_\mu}{\partial x_\nu} &= M_{x_\mu} a_\nu + M \frac{\partial a_\nu}{\partial x_\mu} \end{aligned}$$

für $\mu, \nu = 1, \dots, n, \mu < \nu$.

Dies ist ein *System partieller Differentialgleichungen 1. Ordnung*.

$n = 2$: Sei $\omega = a dx + b dy$:

$$\begin{aligned} M\omega \text{ ist geschlossen} &\iff (Ma)_y = (Mb)_x \\ &\iff M_y a + M a_y = M_x b + M b_x \\ &\iff a M_y - b M_x = (b_x - a_y) M \quad (*) \end{aligned}$$

mit $M = M(x, y)$.

konkret: Sei

$$\omega = \underbrace{(2 + xy)e^{xy}}_{=:a} dx + \underbrace{x^2 e^{xy}}_{=:b} dy$$

Dann ist

$$\begin{aligned} a_y &= x e^{xy} + (2 + xy) x e^{xy} = 3x e^{xy} + x^2 y e^{xy} \\ b_x &= 2x e^{xy} + x^2 y e^{xy} \end{aligned}$$

Es ist also $a_y \neq b_x$. Gesucht ist nun ein integrierender Faktor $M = M(x, y)$. Aus (*) folgt die Bedingung für M :

$$(2 + xy)e^{xy} M_y - x^2 e^{xy} M_x \stackrel{!}{=} -x e^{xy} M$$

Ansatz: Der Multiplikator M ist hier von x abhängig:

$$M_x = \frac{1}{x} M$$

Eine Lösung ist $M = x$:

$$x\omega = (2x + y^2 y) e^{xy} dx + x^3 e^{xy} dy = d(x^2 e^{xy})$$

ist exakt, also auch geschlossen.

11.4.16 Definition

Sei $p \geq 1$ und

$$\sigma_{i_1 i_2 \dots i_p} := \sum_{\nu=1}^p (-1)^{\nu-1} x_{i_\nu} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge \widetilde{dx_{i_\nu}} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$$

($\widetilde{dx_{i_\nu}}$ bedeutet: dx_{i_ν} ist auszulassen). $\sigma_{i_1 i_2 \dots i_p}$ ist eine $(p-1)$ -Form. Ist

$$\omega = \sum_{i_1 \dots i_p} a_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$$

mit Koeffizienten $a_{i_1 \dots i_p}$ im Sterngebiet U bzgl. 0 definiert, dann setzt man

$$I\omega := \sum_{i_1 \dots i_p} \left[\int_0^1 t^{p-1} a_{i_1 \dots i_p}(tx) dt \right] \cdot \sigma_{i_1 \dots i_p}.$$

11.4.17 Bemerkung

Ist ω geschlossen, dann ist $I\omega$ eine Stammform.

Beweis:

$$\alpha = I\omega$$

$$d\alpha = \omega - \underbrace{I(d\omega)}_{=0} = \omega$$

11.4.18 Hilfssatz Sei ω eine p -Form, stetig differenzierbar im sternförmigen Gebiet $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$I(d\omega) + d(I\omega) = \omega.$$

Beweis: Hier OBdA für $\omega = a(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$ .Für dieses ω ist

$$d\omega = \sum_{\nu=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_\nu} dx_\nu \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$$

eine $(p+1)$ -Form.

Es ist

$$I(d\omega) = \sum_{\nu=1}^n \left[\int_0^1 t^{(p+1)-1} \frac{\partial a}{\partial x_\nu}(xt) dt \right] \sigma_{\nu,1,2,\dots,p}$$

$$I\omega = \left[\int_0^1 t^{p-1} a(tx) dt \right] \sigma_{1,2,\dots,p}$$

und

$$d(I\omega) = \sum_{\nu=1}^n \left[\int_0^1 t^{p-1} \cdot t \frac{\partial a}{\partial x_\nu}(tx) dt \right] dx_\nu \wedge \sigma_{1,\dots,p} + \left[\int_0^1 t^{p-1} a(tx) dt \right] d\sigma_{1,\dots,p}$$

Die weitere Berechnung von $d(I\omega)$ wird nun aufgeteilt:

(a)

$$d\sigma_{1,\dots,p} = \sum_{\nu=1}^p \sum_{\mu=1}^n (-1)^{\nu-1} \underbrace{\frac{\partial x_\nu}{\partial x_\mu}}_{\substack{=0 \text{ für } \mu \neq \nu \\ =1 \text{ für } \mu = \nu}} dx_\mu \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widetilde{dx_\nu} \wedge \cdots \wedge dx_p$$

$$= \sum_{\nu=1}^p (-1)^{\nu-1} dx_\nu \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widetilde{dx_\nu} \wedge \cdots \wedge dx_p$$

$$= \sum_{\nu=1}^p dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p = p dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$$

(b) Es ist

$$dx_\nu \wedge \sigma_{1,\dots,p} = \sum_{\mu=1}^p (-1)^{\mu-1} x_\mu dx_\nu \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \widetilde{dx_\mu} \wedge \cdots \wedge dx_p.$$

(i) Für $1 \leq \nu \leq p$ gilt dann:

$$dx_\nu \wedge \sigma_{1,\dots,p} = x_\nu dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p - \underbrace{\sigma_{\nu,1,2,\dots,p}}_{=0}$$

(ii) Und für $p < \nu \leq n$ gilt:

$$\begin{aligned} dx_\nu \wedge \sigma_{1,\dots,p} &= - \left[\sum_{\mu=1}^p (-1)^\mu x_\mu dx_\nu \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \widetilde{dx}_\mu \wedge \dots \wedge dx_p \right. \\ &\quad \left. + (-1)^0 x_\nu \widetilde{dx}_\nu \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p - x_\nu \widetilde{dx}_\nu \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p \right] \\ &= -\sigma_{\nu,1,2,\dots,p} + x_\nu dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p \end{aligned}$$

Nach (i) und (ii) gilt also immer:

$$dx_\nu \wedge \sigma_{1,2,\dots,p} = x_\nu dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p - \sigma_{\nu,1,2,\dots,p}$$

Aus (a) und (b) folgt dann:

$$\begin{aligned} I(d\omega) + d(I\omega) &= \sum_{\nu=1}^n \left[\int_0^1 t^p \frac{\partial a}{\partial x_\nu}(tx) dt \right] x_\nu dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p + \left[\int_0^1 t^{p-1} a(tx) dt \right] \cdot p dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p \\ &= \left\{ \int_0^1 \left[\sum_{\nu=1}^n \left(t^p \frac{\partial a}{\partial x_\nu}(tx) x_\nu \right) + p t^{p-1} a(tx) \right] dt \right\} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p \\ &\quad \stackrel{!}{=} \frac{d}{dt} (t^p a(tx)) \\ &= \underbrace{t^p a(tx)}_{=a(x)} \Big|_0^1 dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p = \omega \end{aligned}$$

11.4.19 Lemma von Poincaré

Ist ω eine stetig differenzierbare und geschlossene p -Form in einem sternförmigen Gebiet U , so ist sie exakt, d. h. es gibt eine Stammform α . Alle Stammformen sind gegeben durch

$$\alpha = I\omega + d\eta,$$

wobei η eine beliebige zweimal stetig differenzierbare $(p-2)$ -Form ist (im Fall $p=1$ ist $d\eta$ durch eine Konstante zu ersetzen).

Beweis: Zeige, daß $\alpha = I\omega$ eine Stammform ist:

$$d\alpha = d(I\omega) = \omega - I(d\omega) = \omega$$

($d\omega = 0$, da ω nach Voraussetzung geschlossen ist.)

Seien nun α und α_1 Stammformen:

$$d(\alpha_1 - \alpha) = d\alpha_1 - d\alpha = \omega - \omega = 0$$

Das heißt, daß $\alpha_1 - \alpha$ geschlossen ist. Also hat $\alpha_1 - \alpha$ eine Stammform η , d. h. $\alpha_1 - \alpha = d\eta$. Daraus folgt: $\alpha_1 = \alpha + d\eta$, wobei η zweimal stetig differenzierbar ist.

Analysis II, Kapitel 9.5.6: Dort ist $p = 1$, $\omega = a_1(x) dx_1 + \dots + a_n(x) dx_n$. Sei $u \in C^1(U)$ Stammform von ω . Dann ist

$$du = \frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n$$

d. h. $\text{grad } u = a = (a_1, \dots, a_n)$

$$\omega \text{ ist geschlossen} \iff \frac{\partial a_i}{\partial x_j} = \frac{\partial a_j}{\partial x_i}$$

11.4.20 Beispiel

Sei $n = 3$ und $p = 2$. Gegeben sei ein C^1 -Vektorfeld $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ in U (U sei sternförmig bzgl. 0).

Gesucht ist ein Vektorfeld $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ in $C^2(U)$ mit $\text{rot } v = b$.

$$\omega = b_1 dx_2 \wedge dx_3 + b_2 dx_3 \wedge dx_1 + b_3 dx_1 \wedge dx_2$$

ω geschlossen $\iff \text{div } b = 0$.

Damit ex. Stammform α von ω :

$$\alpha = v_1 dx_1 + v_2 dx_2 + v_3 dx_3$$

Für die Stammfunktion α von ω gilt in dieser Schreibweise, daß $\text{rot } v = b$ ist (früher mal gemacht).

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ gilt dann:

$$\begin{aligned} v_1(x) &= x_3 \int_0^1 t b_2(tx) dt - x_2 \int_0^1 t b_3(tx) dt + u_{x_1}(x) \\ v_2(x) &= x_1 \int_0^1 t b_3(tx) dt - x_3 \int_0^1 t b_1(tx) dt + u_{x_2}(x) \\ v_3(x) &= x_2 \int_0^1 t b_1(tx) dt - x_1 \int_0^1 t b_2(tx) dt + u_{x_3}(x) \end{aligned}$$

11.4.21 Zurückholen von Differentialformen

Sei

$$\omega = \sum_{i_1, \dots, i_p} a_{i_1 i_2 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \quad (*)$$

eine p -Form in $D \subseteq \mathbb{R}^n$ und $\Phi: G \rightarrow D$ stetig differenzierbar in $G \subseteq \mathbb{R}^m$. Dann erhält man die p -Form $\Phi^* \omega$ dadurch, indem man in $(*)$ dx_j ersetzt durch

$$\sum_{i=1}^m \frac{\partial \Phi_j}{\partial u_i} du_i$$

und x ersetzt durch $\Phi(u)$.

11.4.22 Beispiel

Für $n = 3$, $m = 2$, $p = 2$: Sei

$$\omega = b_1 dx_2 \wedge dx_3 + b_2 dx_3 \wedge dx_1$$

und

$$\Phi(u) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_1 - u_2 \end{pmatrix}$$

mit $D = \mathbb{R}^3$, $G = \mathbb{R}^2$.

Dann ist

$$\begin{aligned} \Phi^*\omega &= b_1(u_1, u_2, u_1 - u_2) \cdot [du_2 \wedge (du_1 - du_2)] \\ &\quad + b_2(u_1, u_2, u_1 - u_2) \cdot [(du_1 - du_2) \wedge du_1] \\ &= (-b_1(u_1, u_2, u_1 - u_2) + b_2(u_1, u_2, u_1 - u_2)) du_1 \wedge du_2 \end{aligned}$$

11.4.23 Regeln

(a) Für die p -Formen ω_1 und ω_2 gilt:

$$\Phi^*(\omega_1 + \omega_2) = \Phi^*\omega_1 + \Phi^*\omega_2$$

(b) Für die 0-Form a und die p -Form ω gilt:

$$\Phi^*(a\omega) = (\Phi^*a)(\Phi^*\omega)$$

(c) Für die p -Form ω_1 und die q -Form ω_2 gilt:

$$\Phi^*(\omega_1 \wedge \omega_2) = (\Phi^*\omega_1) \wedge (\Phi^*\omega_2)$$

Beweis: Aufgabe

11.4.24 Satz

Ist Φ zweimal stetig differenzierbar, so gilt:

$$d(\Phi^*\omega) = \Phi^*(d\omega)$$

Beweis:

(1) Sei $\omega = a$ Nullform. Dann ist

$$d\omega = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a(x)}{\partial x_j} dx_j.$$

Daraus folgt:

$$\Phi^*(d\omega) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_j}(\Phi(u)) \sum_{i=1}^m \frac{\partial \Phi_j}{\partial u_i} du_i$$

Ausserdem ist

$$\Phi^*\omega = a(\Phi(u)).$$

Und damit ist

$$\begin{aligned} d(\Phi^*\omega) &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial u_i} a(\Phi(u)) du_i \otimes \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial a}{\partial x_j}(\Phi(u)) \frac{\partial \Phi_j}{\partial u_i} du_i \\ &= \Phi^*(d\omega) \end{aligned}$$

Dabei wurde bei $\otimes$ die Kettenregel angewandt.

- (2) Sei nun $\omega = dx_1$ (Der Beweis geht für $\omega = dx_j$ genauso).

Es ist

$$d\omega = d(dx_1) = 0$$

und damit

$$\Phi^*(d\omega) = 0.$$

Andererseits ist

$$\Phi^*\omega = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \Phi}{\partial u_i} du_i$$

und damit

$$d(\Phi^*\omega) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial u_j \partial u_i} du_j \wedge du_i \stackrel{\oplus}{=} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial u_i \partial u_j} du_i \wedge du_j$$

mit dem Satz von Schwarz und Vertauschung von du_i und du_j bei $\oplus$.

Also: $d(\Phi^*\omega) = 0$.

- (3) Sei $\omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$. ($\omega = dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}$ genauso)

Es ist

$$d\omega = 0 \quad \Phi^*(d\omega) = 0$$

und

$$\Phi^*\omega = (\Phi^*dx_1) \wedge \cdots \wedge (\Phi^*dx_p).$$

Damit ist also

$$\begin{aligned} d(\Phi^*\omega) &= \sum_{j=1}^p (-1)^{j-1} (\Phi^*dx_1) \wedge \cdots \wedge \underbrace{d(\Phi^*dx_j)}_{=0 \text{ nach (2)}} \wedge \cdots \wedge (\Phi^*dx_p) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- (4) Sei $\omega = a(x) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$ ($\omega = a(x) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}$ genauso).

Setze dabei $\sigma := dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$.

$$d(\Phi^*\omega) \stackrel{(b)}{=} d((\Phi^*a)(\Phi^*\sigma)) = d(\Phi^*a) \wedge (\Phi^*\sigma) + (\Phi^*a) \underbrace{d(\Phi^*\sigma)}_{0 \text{ nach (3)}}$$

$$\stackrel{(1)}{=} \Phi^*(da) \wedge (\Phi^*\sigma)$$

$$\stackrel{(c)}{=} \Phi^*(da \wedge \sigma) = \Phi^*(d(a\sigma)) = \Phi^*(d\omega)$$

(5) Sei nun

$$\omega = \sum_{i_1 \dots i_p} a_{i_1 \dots i_p}(x) \sigma_{i_1 \dots i_p} = \sum \omega_{i_1 \dots i_p}$$

mit

$$\sigma_{i_1 \dots i_p} = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} d(\Phi^* \omega) &= d\left(\sum \Phi^* \omega_{i_1 \dots i_p}\right) = \sum d(\Phi^* \omega_{i_1 \dots i_p}) \\ &= \sum \Phi^*(d\omega_{i_1 \dots i_p}) = \Phi^*(d\omega). \end{aligned}$$

11.5 Flächen und Mannigfaltigkeiten

11.5.1 Definition: p -Flächenstück

Eine Abbildung $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt Parameterdarstellung eines p -Flächenstückes $\mathcal{F}$, ($1 \leq p \leq n$), wenn gilt:

- (1) $D \subseteq \mathbb{R}^p$ ist ein konvexes Gebiet. (d. h. mit $a, b \in D$ ist auch $\{a + t(b - a) : 0 \leq t \leq 1\} \subseteq D$).
- (2) Φ ist injektiv, $\mathcal{F} = \Phi(D)$, $\Phi^{-1}: \mathcal{F} \rightarrow D$ ist stetig.
- (3) Φ ist stetig differenzierbar, $\text{rg } \Phi' = p$ in D (Φ' ist $n \times p$ -Matrix).

11.5.2 Beispiel

für $n = 3$, $p = 2$: Sei

$$D = \{(u, v) : u^2 + v^2 < 1\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

und

$$\Phi(u, v) = \frac{1}{u^2 + v^2 + 1} \begin{pmatrix} 2u \\ 2v \\ 1 - u^2 - v^2 \end{pmatrix}$$

Prüfe nach, daß

$$\mathcal{F} = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_3 > 0\}$$

die Fläche der oberen Halbkugel ist.

Φ^{-1} ist stetig (einfach nachrechnen):

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2}{1 + u^2 + v^2} u & x_2 &= \frac{2}{1 + u^2 + v^2} v \\ u &= \varrho x_1 & v &= \varrho x_2 \end{aligned}$$

Aus

$$x_3 = \frac{1 - \varrho^2(x_1^2 + x_2^2)}{1 + \varrho^2(x_1^2 + x_2^2)}$$

folgt:

$$\begin{aligned} \varrho^2(1 + x_3)(x_1^2 + x_2^2) &= 1 - x_3 \\ x_1^2 + x_2^2 &= 1 - x_3^2 = (1 - x_3)(1 + x_3) \\ \varrho^2(1 + x_3)^2 &= 1 & \varrho &= \frac{1}{1 + x_3} \\ \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} &= \frac{1}{1 + x_3} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ist stetig.

11.5.3 Definition: Verträglichkeit von Flächenstücken

Zwei p -Flächenstücke $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ heißen *verträglich*, wenn es zu jedem $x \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ ein p -Flächenstück $\mathcal{F}_3$ gibt mit $x \in \mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$.

11.5.4 Bemerkungen

- (a) Gilt $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \emptyset$, dann sind $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ verträglich.
 (b) Sind $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ verträglich, $x_0 \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, $x_0 = \Phi(u_0) = \Psi(s_0)$, dann ist

$$h := \Psi^{-1} \circ \Phi$$

in einer Umgebung von u_0 erklärt und stetig differenzierbar.

Dasselbe gilt für

$$h^{-1} = \Phi^{-1} \circ \Psi$$

genauso, d.h. h ist ein Diffeomorphismus, $\Phi = \Psi \circ h$ und $\Psi = \Phi \circ h^{-1}$.

- (c) Sind Φ, Ψ Parameterdarstellungen von $\mathcal{F}$, so gilt $\Phi = \Psi \circ h$ mit einem Diffeomorphismus $h: D \rightarrow G$.

Beweis für (b):

Da $\text{rg } \Phi'(s_0) = p$ ist, existieren $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$ mit:

Für

$$\bar{\Psi} := \begin{pmatrix} \Psi_{i_1} \\ \vdots \\ \Psi_{i_p} \end{pmatrix}$$

ist $\det \bar{\Psi}'(s_0) \neq 0$.

$\bar{\Psi}$ hat eine Umkehrfunktion in einer Umgebung von $\bar{\Psi}(s_0)$,

$\bar{\Psi}$ und $\bar{\Psi}^{-1}$ sind stetig differenzierbar.

Setze in einer Umgebung von u_0

$$h := \Psi^{-1} \circ \Phi = \underbrace{\bar{\Psi}^{-1} \circ \bar{\Psi}}_{\in C^1}$$

$$\text{mit } \bar{\Phi} = \begin{pmatrix} \Phi_{i_1} \\ \vdots \\ \Psi_{i_p} \end{pmatrix}.$$

Für h^{-1} wird genauso verfahren.

11.5.5 Definition: Tangentialraum

Sei $\mathcal{F}$ ein p -Flächenstück mit Parameterdarstellung $\Phi: D \rightarrow \mathcal{F}$, $x \in \mathcal{F}$ und $x = \Phi(u)$.

Dann heißt der von $\Phi_{u_1}, \Phi_{u_2}, \dots, \Phi_{u_p}$ aufgespannte Vektorraum *Tangentialraum* im Punkt x . Geschrieben: $T_x \mathcal{F}$.

Es ist $T_x \mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^n$, $\dim T_x \mathcal{F} = p$.

Für $n = 3$ und $p = 2$ ist $T_x \mathcal{F}$ die in den Nullpunkt verschobene Tangentialebene.

11.5.6 Bemerkungen

- (a) Sind $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$ verträglich und ist $x \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, so ist $T_x \mathcal{F}_1 = T_x \mathcal{F}_2$.
 (b) $T_x \mathcal{F}$ hängt nicht von der Parameterdarstellung ab.

Beweis

- (a) Seien Φ, Ψ Parameterdarstellungen von $\mathcal{F}_1$ und $\mathcal{F}_2$.
Dann ist lokal $\Phi = \Psi \circ h$, $\det h' \neq 0$. Damit ist

$$\Phi' = (\Psi' \circ h) \cdot h'$$

Φ_{u_i} ist Linearkombination von $\Psi_{s_1}, \dots, \Psi_{s_p}$.

Ψ_{s_i} ist Linearkombination von $\Phi_{u_1}, \dots, \Phi_{u_p}$.

- (b) entspricht (a) mit $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2$.

11.5.7 Definition: gleichorientierte Flächenstücke

Zwei verträgliche Flächenstücke heißen *gleichorientiert*, wenn in $\Phi = \Psi \circ h$ (lokal) $\det h' > 0$ ist. Andernfalls heißen sie *entgegengesetzt-orientiert*.

11.5.8 Definition

Sei $\mathcal{F}$ ein p -Flächenstück, $\mathcal{F} \subseteq U$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, ω eine p -Form in U . Dann definiert man

$$\int_{\mathcal{F}} \omega := \int_D \omega(\Phi(u), \Phi_{u_1}(u), \dots, \Phi_{u_p}(u)) du,$$

falls die rechte Seite als Lebesgue-Integral existiert.

11.5.9 Beispiele

- (a) Für $p = 1$, $n \geq 2$:
Sei $\mathcal{F}$ definiert durch $\Phi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$, Kurve im $\mathbb{R}^n$ und

$$\omega = a_1(x) dx_1 + \dots + a_n(x) dx_n$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{F}} \omega &= \int_{\alpha}^{\beta} (a_1(\Phi(u))\Phi'_1(u) + \dots + a_n(\Phi(u))\Phi'_n(u)) du \\ &= \int_{\mathcal{F}} a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n \quad \text{„Kurvenintegral“} \end{aligned}$$

- (b) Für $n = 3$, $p = 2$:

Sei $\mathcal{F}$ definiert durch $\Phi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, und

$$\omega = b_1(x) dx_2 \wedge dx_3 + b_2(x) dx_3 \wedge dx_1 + b_3(x) dx_1 \wedge dx_2.$$

Dann ist

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathcal{F}} &= \int_D \left[b_1(\Phi(u)) \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial \Phi_2}{\partial u_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial u_2} \\ \frac{\partial \Phi_3}{\partial u_1} & \frac{\partial \Phi_3}{\partial u_2} \end{array} \right] + \dots \right] du \\
 &= \int_D b(\Phi(u)) \cdot (\Phi_{u_1}(u) \times \Phi_{u_2}(u)) du \\
 &= \int_D b(\Phi(u)) \cdot \underbrace{\frac{\Phi_{u_1} \times \Phi_{u_2}}{\|\Phi_{u_1} \times \Phi_{u_2}\|}}_{\substack{\text{Normalenvektor} \\ \nu(x), x=\Phi(u)}} \|\Phi_{u_1} \times \Phi_{u_2}\| du \\
 &= \int_D b(x) \cdot \nu(x) do
 \end{aligned}$$

11.5.10 Satz

Die Definition von $\int_{\mathcal{F}} \omega$ ist unabhängig von der gewählten Parameterdarstellung, d.h.:

Sind $\Phi: D \rightarrow \mathcal{F}$ und $\Psi: G \rightarrow \mathcal{F}$ zwei Parameterdarstellungen von $\mathcal{F}$ und ist $\Phi = \Psi \circ h$ mit einem Diffeomorphismus $h: D \rightarrow G$ mit $\det h' > 0$, so gilt:

$$\int_D \underbrace{\omega(\Phi(u), \Phi_{u_1}, \dots, \Phi_{u_p})}_{=: f(u)} du = \int_G \underbrace{\omega(\Psi(s), \Psi_{s_1}, \dots, \Psi_{s_p})}_{=: g(s)} ds$$

Beweis

$$\begin{aligned}
 \int_G g(s) ds &= \int_D g(h(u)) \cdot |\det h'(u)| du \\
 &= \int_D \underbrace{g(h(u)) \cdot \underbrace{\det h'(u)}_{>0}}_{f(u)} du = \int_D f(u) du
 \end{aligned}$$

11.5.11 Bemerkung

Die p -Form $\Phi^* \omega$ ist definiert in $D \subseteq \mathbb{R}^p$, also von der Form

$$f(u) du_1 \wedge \dots \wedge du_p.$$

D ist eine p -Fläche in $\mathbb{R}^p$ mit der Parameterdarstellung $\text{id}: D \rightarrow D$ (Identität)

$$\int_D \Phi^* \omega = \int_D f(u) du$$

also

$$\int_D f(u) du_1 \wedge \dots \wedge du_p = \int_D f(u) du$$

11.5.12 Definition: Flächenstück mit Rand

Sei $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ die Parameterdarstellung eines p -Flächenstückes und sei

$$H = \{u \in \mathbb{R}^p: u_1 < \alpha\}$$

ein Halbraum mit $D \cap H \neq \emptyset$, $D \not\subseteq H$.

Dann heißt $\mathcal{F}$ mit der Parameterdarstellung $\Phi|_{D \cap H}$ p -Flächenstück mit Rand.

$$\partial\mathcal{F} = \Phi(D \cap \partial H), \quad \partial H = \{u: u_1 = \alpha\}$$

$\overline{\mathcal{F}} := \mathcal{F} \cup \partial\mathcal{F}$ heißt Flächenstück mit Rand.

Beachte: $\partial\mathcal{F}$ ist *nicht* der topologische Rand, und $\overline{\mathcal{F}}$ ist *nicht unbedingt* der topologische Abschluß.

11.5.13 Bemerkung

Das Urbild von $\partial\mathcal{F}$ in D ,

$$\Delta = \{(u_2, \dots, u_p): (\alpha, u_2, \dots, u_p) \in D\}$$

ist ein *konvexes Gebiet* im $\mathbb{R}^{p-1}$.

$$(u_2, \dots, u_p) \mapsto \Phi(\alpha, u_2, \dots, u_p)$$

ist eine Parameterdarstellung von $\partial\mathcal{F}$. $\partial\mathcal{F}$ ist $(p-1)$ -Fläche (für $p \geq 2$).

11.5.14 Beispiele

(1) Anschaulich z. B. die Nordhemisphäre mit dem Äquator.

(2) Sei

$$\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^3: x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_1 > 0, x_3 > 0\}.$$

Suche Parameterdarstellung für

$$\partial\overline{\mathcal{F}} = \{x \in \mathbb{R}^3: x_1^2 + x_2^2 = 1, x_3 = 0, x_1 > 0\}.$$

Eine Parameterdarstellung für eine größere Fläche ist:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \beta \sin \lambda \\ -\sin \beta \end{pmatrix}$$

mit $-\pi/2 < \lambda < \pi/2$ und $-\pi/2 < \beta < \pi/2$ (rechte Halbsphäre).

Setze

$$D = \{(\beta, \lambda): -\pi/2 < \lambda, \beta < \pi/2\}$$

und

$$H = \{(\beta, \lambda): \beta < 0\}$$

(3) Für $n = 3$ und $p = 3$:

Sei

$$\mathcal{F} = \{(x_1, x_2, x_3): x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 1, x_1, x_2, x_3 > 0\}$$

der positive Kugel-Oktant im $\mathbb{R}^3$ und

$$\partial\mathcal{F} = \{(x_1, x_2, x_3): x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1, x_1, x_2, x_3 > 0\}$$

die dazugehörige Kugelabschnittsfläche.

Setze dazu

$$\mathcal{F}: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \beta \cos \lambda \\ r \cos \beta \sin \lambda \\ r \sin \beta \end{pmatrix}$$

für $0 < r < 1$, $0 < \lambda < \pi/2$ und $0 < \beta < \pi/2$. Für die große Fläche sei $0 < r < 2$.

$$\partial\mathcal{F}: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \beta \sin \lambda \\ \sin \beta \end{pmatrix}$$

für $0 < \lambda < \pi/2$ und $0 < \beta < \pi/2$.

Setze also für $D: 0 < r < 2$, $0 < \lambda < \pi/2$ und $0 < \beta < \pi/2$ und

$$H = \{(r, \beta, \lambda) : r < 1\}$$

11.5.15 Definition: p -Mannigfaltigkeit, p -Fläche

Sind $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_m$ verträgliche und orientierte p -Flächenstücke [mit Rand], so heißt

$$M = \mathcal{F}_1 \cup \dots \cup \mathcal{F}_m$$

orientierte p -Mannigfaltigkeit [mit Rand, falls $\partial\mathcal{F}_i \cap \mathcal{F}_j = \emptyset$ für $i \neq j$].

Wenn $M \subseteq \mathbb{R}^n$ zusammenhängend ist, so heißt M *orientierte p -Fläche*.

11.5.16 Beispiel

$$S^{n-1} = \{x : \|x\| = 1\}$$

ist eine $(n-1)$ -Fläche.

11.5.17 Bemerkung

$$\partial M := \partial\mathcal{F}_1 \cup \dots \cup \partial\mathcal{F}_m$$

ist eine $(p-1)$ -Mannigfaltigkeit.

Beweis Sei $\mathcal{F}_j \subseteq \tilde{\mathcal{F}}$ mit der Parameterdarstellung $\Phi_j: D_j \mapsto \tilde{\mathcal{F}}_j$.

Für $\mathcal{F}_j$ ist $\Phi_j: D_j \cap H \mapsto \mathcal{F}_j$ Parameterdarstellung mit $H = \{x : x_1 < 0\}$ und für $\partial\mathcal{F}_j$ ist $\Psi_j: \Delta_j \mapsto \partial\mathcal{F}_j$ Parameterdarstellung.

Dabei ist

$$\Delta_j = \{(u_2, \dots, u_p) : (0, u_2, \dots, u_p) \in D_j\},$$

also

$$\Psi(u_2, \dots, u_p) = \Phi_j(0, u_2, \dots, u_p).$$

Wir haben bisher:

$\Phi_1 = \Phi_2 \circ h$ mit $h: D_1 \mapsto D_2$ lokal diffeomorph.

Damit ist lokal $h(\Delta_1) \subseteq \Delta_2$, weil $h = \Phi_2^{-1} \circ \Phi_1$.

Es ist also

$$\Phi_1(u_1, u_2, \dots, u_p) = \Phi_2(h_1(u_1, \dots, u_p), h_2(u_1, \dots, u_p), \dots, h_p(u_1, \dots, u_p)).$$

Mit $u_1 = 0$ ist

$$\begin{aligned}\Psi_1(u_2, \dots, u_p) &= \Phi_2(0, h_2(0, u_2, \dots, u_p), \dots, h_p(0, u_2, \dots, u_p)) \\ &= \Psi_2(\bar{h}(u_2, \dots, u_p))\end{aligned}$$

mit $\bar{h} = \begin{pmatrix} h_2 \\ \vdots \\ h_p \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow \partial\mathcal{F}_1, \partial\mathcal{F}_2$ sind verträglich.

Noch zu zeigen:

$$\det h' > 0 \stackrel{?}{\implies} \det \bar{h}' > 0.$$

Es ist

$$h' = \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u_1} & \frac{\partial h_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial u_p} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u_1} & & & \\ \frac{\partial h_3}{\partial u_1} & & & \\ \vdots & & \bar{h}' & \\ \frac{\partial h_p}{\partial u_1} & & & \\ \frac{\partial h_1}{\partial u_1} & & & \end{pmatrix}$$

Dabei ist in Δ_1

$$\frac{\partial h_1}{\partial u_2} = \cdots = \frac{\partial h_1}{\partial u_p} = 0.$$

Also gilt dann:

$$0 < \det h' = \frac{\partial h_1}{\partial u_1} \cdot \bar{h}'.$$

Ist $\frac{\partial h_1}{\partial u_1} \geq 0$? Dann ist nämlich $\det \bar{h}' > 0$.

Zeige also noch: $\frac{\partial h_1}{\partial u_1} \geq 0$:

Es ist $h_1(0, u_2, \dots, u_p) = 0$,

$\bar{h}(\Delta_1) \subseteq \Delta_2$ und $h(D_1 \cap H) \subseteq D_2 \cap H$.

$\frac{\partial h_1}{\partial u_1} \geq 0$, weil $h_1(u_1, u_2, \dots, u_p) < 0$ für $u_1 < 0$.

11.5.18 Zerlegung der Eins

Sei M eine kompakte p -Mannigfaltigkeit,

$$M = \mathcal{F}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{F}_m, \quad \partial M = \partial\mathcal{F}_1 \cup \cdots \cup \partial\mathcal{F}_m.$$

Dabei sei

$$\bar{M} := M \cup \partial M \subseteq \mathbb{R}^n$$

kompakt.

Dann existieren endlich viele Kugeln $K_1, \dots, K_s$ mit dazu gehörenden C^∞ -Funktionen $\varphi_j: K_1 \cup \cdots \cup K_s \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\varphi_j(x) = 0$ außerhalb von K_j und $\varphi_j > 0$ in K_j und

$$\sum_{j=1}^s \varphi_j(x) = 1$$

für $x \in K_1 \cup \cdots \cup K_s$.

Weiter ist $\bar{M} \subseteq K_1 \cup \cdots \cup K_s$ und zu jedem $x \in \bar{M}$, $x \in K_j$, gibt es ein $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ mit $\bar{M} \cap K_j \subseteq \overline{\mathcal{F}_{\nu(j)}}$.

Geometrisch bedeutet das, daß es nicht erlaubt ist, daß der Schnitt von $\overline{M}$ mit K_j eine Unter-
menge irgendeines $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ sein muß; es darf kein $\mathcal{F}_{\nu(k)}$ zusätzlich in K_j ($\nu(k) \neq \nu(j)$) „hineinragen“. $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ darf aber z. B. (unter der Annahme, daß $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ eine Kurve ist) zeitweise die Kugel K_j verlassen und danach wieder schneiden.

Beweis: Sei $x \in \overline{M}$ beliebig.

Dazu existiert eine Kugel $K(x)$ und ein ν mit $K(x) \subseteq \tilde{\mathcal{F}}_\nu$.

Da $\overline{M} \subseteq \bigcup_{x \in \overline{M}} K(x)$, gilt:

$$\overline{M} \subseteq \bigcup_{j=1}^s K(x^{(j)}) =: \bigcup_{j=1}^s K_j$$

(Satz von Heine-Borel, 7.5.11 auf Seite 197)

Dabei ist $K_j \subseteq \overline{\mathcal{F}_{\nu(j)}}$ für geeignetes $\nu(j)$.

Wenn nun $\psi \in C^\infty$ ex. mit:

1. $\psi_j(x) > 0$ in K_j ,
2. $\psi(x) = 0$ in $\mathbb{R}^n \setminus K_j$,

dann setze in $K_1 \cup \dots \cup K_s$

$$\varphi_j(x) := \frac{\psi_j(x)}{\sum_{i=1}^s \psi_i(x)}$$

Nachweis der Existenz von ψ zu K : Setze $K = K(0, 1)$ und

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{\|x\|^2 - 1}\right) & \text{in } K(0, 1) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es ist $\psi \in C^\infty$ (Aufgabe).

Zu $K = K(\xi, r)$ gehört dann $\psi\left(\frac{x-\xi}{r}\right)$.

11.5.19 Def.: Integral von p -Form über p -Mannigfaltigkeit

Sei M eine kompakte, orientierte p -Mannigfaltigkeit, ω sei eine p -Form, definiert in der offenen Menge U , $U \supseteq \overline{M}$.

$\{\varphi_1, \dots, \varphi_s\}$ sei eine Zerlegung der Eins.

Dann wird definiert:

$$\int_M \omega := \sum_{j=1}^s \int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} \varphi_j \omega$$

11.5.20 Satz

Die Definition in 11.5.19 ist unabhängig von der Zerlegung der Eins.

Beweis: Seien $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ mit $K_1, \dots, K_s$ und $\psi_1, \dots, \psi_t$ mit $L_1, \dots, L_t$ eine Zerlegung der Eins:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^s \int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} \varphi_j \omega &= \sum_{j=1}^s \int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} \sum_{i=1}^t \psi_i \varphi_j \omega = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^t \int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} \psi_i \varphi_j \omega \\ &\stackrel{\otimes}{=} \sum_{i=1}^t \int_{\mathcal{F}_{\nu(i)}} \sum_{j=1}^s \varphi_j \psi_i \omega = \sum_{i=1}^t \int_{\mathcal{F}_{\nu(i)}} \psi_i \omega \end{aligned}$$

Wieso gilt $\otimes$?

Zu $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ und $\mathcal{F}_{\nu(i)}$ gehören die beiden Kugeln K_j und L_i , sie können sich schneiden, müssen es aber nicht, außerdem ist $\psi_i \varphi_j = 0$ außerhalb von $K_j \cap L_i$, deshalb ist es egal über welches $\mathcal{F}$ — beide sind Obermengen der Kugeln — integriert wird.

11.6 Der Integralsatz von Stokes

11.6.1 Integralsatz von Stokes

Sei M ein C^2 -Mannigfaltigkeit der Dimension p (p -Mannigfaltigkeit), ω eine $(p-1)$ -Form, stetig differenzierbar in $U \supseteq M$, U offen.

Dann gilt:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

Speziell für $p = n$ ist dies der Gaußsche Integralsatz (Divergenzsatz):

$$\begin{aligned} \int_M \left(\frac{\partial b_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial b_n}{\partial x_n} \right) \underbrace{dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n}_{(dx)} &= \int_{\partial M} b_1(x) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &\quad - b_2 dx_1 \wedge dx_4 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &\quad + \dots + (-1)^{n+1} b_n(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{n-1} \end{aligned}$$

11.6.2 Bemerkungen

(a) „ C^2 “-Mannigfaltigkeit:

$$M = \bigcup_{j=1}^m \mathcal{F}_j, \quad \Phi_j: D_j \rightarrow \mathcal{F}_j$$

alle Φ_j sind zweimal stetig differenzierbar.

(b) $\partial M = \emptyset$ ist möglich. Dann ist die Aussage:

$$\int_M d\omega = 0$$

(c) Für $p = 1$ ist M eine Kurve (Bogen oder geschlossen).

$$\Phi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

sei Parameterdarstellung von M .

Wenn M geschlossen ist, hat M keinen Rand, wenn M ein Bogen ist, sind die Endpunkte der

Rand.

ω sei eine 0-Form: $\omega = u: U \rightarrow \mathbb{R}$, eine Funktion. Dann ist

$$d\omega = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} dx_j.$$

Was ist

$$\int_{\partial M} \omega = \dots?$$

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_M \text{grad } u(x) \cdot dx && \text{„Kurvenintegral“} \\ &= u(\Phi(\beta)) - u(\Phi(\alpha)) =: \int_{\partial M} \omega \end{aligned}$$

11.6.3 Beweis zum Integralsatz von Stokes, 11.6.1

Sei

$$M = \bigcup_{j=1}^m \mathcal{F}_j \quad (\text{mit oder ohne Rand})$$

und $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ Zerlegung der Eins.

Dann ist

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \int_M d\left(\sum_{j=1}^s \varphi_j \omega\right) \\ &= \sum_{j=1}^s \int_M d(\varphi_j \omega) = \sum_{j=1}^s \int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} d(\varphi_j \omega) \end{aligned}$$

$\varphi_1, \dots, \varphi_s$ ist auch Zerlegung der Eins bezüglich $\partial B \subseteq \overline{M}$:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} \left(\sum_{j=1}^s \varphi_j \omega\right) = \sum_{j=1}^s \int_{\partial \mathcal{F}_{\nu(j)}} \varphi_j \omega$$

Zeige also:

$$\int_{\mathcal{F}_{\nu(j)}} d(\varphi_j \omega) = \int_{\partial \mathcal{F}_{\nu(j)}} \varphi_j \omega$$

Schreibe $\mathcal{F}$ anstelle von $\mathcal{F}_{\nu(j)}$ und ω anstelle von $\varphi_j \omega$.

Dann ist zu zeigen:

$$\int_{\mathcal{F}} d\omega = \int_{\partial \mathcal{F}} \omega$$

Dabei ist $\omega = 0$ außerhalb einer Kugel.

Sei

$$\Phi: D \cap H \rightarrow \mathcal{F}, \quad H = \{u: u_1 < 0\} \text{ (z.B.)}$$

eine Parameterdarstellung von $\mathcal{F}$ mit $\Phi \in C^2(D)$.

Setze nun $\sigma := \Phi^*\omega$ und damit $d\sigma = \Phi^*(d\omega)$.

Damit ist dann

$$\int_{\mathcal{F}} d\omega = \int_{D \cap H} d\sigma$$

und

$$\int_{\partial\mathcal{F}} \omega = \int_{\Delta} \sigma$$

mit $\Delta = \partial H \cap D$.

σ ist $(p-1)$ -Form im $\mathbb{R}^p$:

$$\begin{aligned} \sigma &= b_1 du_2 \wedge \cdots \wedge du_p - b_2 du_1 \wedge du_3 \wedge \cdots \wedge du_p \\ &\quad + \cdots + (-1)^{p-1} b_p du_1 \wedge \cdots \wedge du_{p-1} \\ d\sigma &= \left(\sum_{j=1}^p \frac{\partial b_j}{\partial u_j} \right) du_1 \wedge \cdots \wedge du_p \end{aligned}$$

Zu zeigen bleibt also:

$$\int_{D \cap H} \frac{\partial b_j}{\partial u_j} du_1 \wedge \cdots \wedge du_p = (-1)^{j-1} \int_{\Delta} b_j du_1 \wedge \cdots \wedge \widetilde{du_j} \wedge \cdots \wedge du_p$$

Der Fall $j = 1$: Es ist

$$\begin{aligned} \int_{D \cap H} \frac{\partial b_1}{\partial u_1} du_1 \wedge \cdots \wedge du_p &= \int_{D \cap H} \frac{\partial b_1}{\partial u_1} du \\ &= \int_{\Delta} \left[\int_{\alpha(\bar{u})}^0 \frac{\partial b_1}{\partial u_1} du_1 \right] d\bar{u} \\ &= \int_{\Delta} (b_1(0, \bar{u}) - \underbrace{b_1(\alpha(\bar{u}), \bar{u})}_{=0}) d\bar{u} \\ &= \int_{\Delta} b_1(0, \bar{u}) d\bar{u} = \int_{\Delta} b_1 du_2 \wedge du_3 \wedge \cdots \wedge du_p \end{aligned}$$

Der Fall $2 \leq j \leq p$: Sei z. B. $j = p$:

$$\begin{aligned} \int_{D \cap H} \frac{\partial b_p}{\partial u_p} du_1 \wedge \cdots \wedge du_p &= \left| \begin{array}{c} \text{Fubini} \\ \mathbb{R}^p = \mathbb{R}^{p-1} \times \mathbb{R} \end{array} \right| \\ &= \int \left(\int_{\alpha(\tilde{u})}^{\beta(\tilde{u})} \frac{\partial b_p}{\partial u_p} du_p \right) d\tilde{u} = 0 \end{aligned}$$

$$\int_{\Delta} b_p du_1 \wedge \cdots \wedge du_{p-1} = \int_{\Delta} b_p(0, u_2, \dots, u_p) du_1 \wedge \cdots \wedge du_{p-1} = 0$$

(Aufgabe!)

11.7 Oberflächenmaße

11.7.1 Definition: Gram'sche Matrix und Determinante

Sei A eine $n \times p$ -Matrix, $1 \leq p \leq n$.

Dann heißt

$$A^T A$$

Gram'sche Matrix, $(p \times p)$ -Matrix, und

$$\text{gr}(A) := \det(A^T A)$$

heißt Gram'sche Determinante.

11.7.2 Bemerkungen/Beispiele

(a) Ist a^i die i -te Spalte von A ($a_i \in \mathbb{R}^n$), dann hat $A^T A$ die Einträge $a^j \cdot a^i = g_{ji} = g_{ij}$, $A^T A$ ist symmetrisch.

(b) Sei $p = 2$, A habe die 2 Spalten a und b :

$$A^T A = \begin{pmatrix} a \cdot a & a \cdot b \\ a \cdot b & b \cdot b \end{pmatrix}$$

$$\text{gr}(A) = \|a\|^2 \cdot \|b\|^2 - (a \cdot b)^2 \stackrel{\text{CSU}}{\geq} 0$$

(c) Für $n = 3$, $p = 2$ ist $\text{gr}(A) = \|a \times b\|^2$ (Aufgabe!)

(d) Sei $c \in \mathbb{R}^n$ fest und

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \\ c_1 & \dots & c_n \end{pmatrix}, \quad A^T A = \begin{pmatrix} 1 + c_1^2 & c_1 c_2 & \dots & c_1 c_n \\ c_2 c_1 & 1 + c_2^2 & \dots & c_2 c_n \\ & & \ddots & \\ c_n c_1 & \dots & c_n c_{n-1} & 1 + c_n^2 \end{pmatrix}$$

Es ist dann:

$$\text{gr}(A) = 1 + c_1^2 + \dots + c_n^2 = 1 + \|c\|^2$$

Beweis zu (d): Berechnung der Eigenwerte von $A^T A$:

1 ist Eigenwert:

$$\begin{aligned} A^T A x = 1 \cdot x &\iff \sum_{j=1}^n c_i c_j x_j = 0 \text{ für } i = 1, \dots, n \\ &\iff c_i \cdot \sum_{j=1}^n c_j x_j = 0 \\ &\iff c_i (c \cdot x) = 0 \text{ für } i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Dies ist richtig, wenn $c \cdot x = 0$ ist.

Es gibt $(n - 1)$ linear unabhängige Lösungen von $c \cdot x = 0$.

Es gibt also die Eigenwerte $\underbrace{1, \dots, 1}_{(n-1) \times}$ und den Eigenwert

$$\begin{aligned}\lambda &= \text{spur}(A^T A) - \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{(n-1) \times} \\ &= (1 + c_1^2 + \dots + 1 + c_n^2) - (1 + \dots + 1) \\ &= 1 + c_1^2 + \dots + c_n^2\end{aligned}$$

Damit ist

$$\det(A^T A) = \underbrace{1 \cdots 1}_{(n-1) \times} (1 + c_1^2 + \dots + c_n^2)$$

11.7.3 Hilfssatz

(a) Es gilt: $\text{gr}(A) \geq 0$. Es ist $\text{gr}(A) = 0$ genau dann, wenn $a^1, a^2, \dots, a^p$ linear abhängig sind.

(b) Für eine $(p \times p)$ -Matrix C gilt:

$$\text{gr}(AC) = (\det C)^2 \cdot \text{gr}(A)$$

Beweis

(a) mit Induktion:

$\mathbf{p} = \mathbf{n}$: $\text{gr}(A) = (\det A)^2 \geq 0$, $= 0$ genau dann, wenn $a^1, \dots, a^n$ l. a.

$\mathbf{p} + \mathbf{1} \mapsto \mathbf{p}$: Sei $A = (a^1, \dots, a^p)$. Wähle $a \in \mathbb{R}^n$ so, daß $\|a\| = 1$ und $a \cdot a^i = 0$ für alle i . Setze $A' = (a^1, \dots, a^p, a)$:

$$0 \leq \text{gr}(A') = \det((A')^T A') = \text{gr}(A)$$

denn

$$\det \left(\begin{pmatrix} A^T \\ a^T \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & a \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} A^T A & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{gr}(A)$$

Dieses ist $= 0$, wenn $a^1, \dots, a^p, a$ linear abhängig sind. Da aber a senkrecht zu allen anderen Vektoren steht müssen $a^1, \dots, a^p$ l. a. sein.

11.7.4 Definition: Oberflächenintegral

Sei $\mathcal{F}$ ein p -Flächenstück mit der Parameterdarstellung $\Phi: D \subseteq \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $f: \Phi(D) = \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann heißt

$$\int_{\mathcal{F}} f(x) \, do := \int_D f(\Phi(u)) \sqrt{\text{gr}(\Phi'(u))} \, du$$

Oberflächenintegral, sofern die rechte Seite als Lebesgueintegral existiert. Insbesondere heißt

$$|\mathcal{F}| = \int_{\mathcal{F}} 1 \cdot do = \int_{\mathcal{F}} do$$

p -dimensionaler Inhalt von $\mathcal{F}$.

11.7.5 Bemerkungen

(a) $\int_{\mathcal{F}} f(x) do$ läßt sich mittels einer Zerlegung der Eins für Flächen bzw. Mannigfaltigkeiten erklären.

(b) Für $n = 3, p = 2$:

Sei $\Phi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$: dann ist

$$\text{gr}(\Phi') = \|\Phi_u \times \Phi_v\|^2$$

(Übereinstimmung mit früherer Definition.)

(c) Sei nun n beliebig, $p = 1$ und

$$\Phi: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

eine Parameterdarstellung von $\mathcal{F}$ mit

$$\Phi' = \begin{pmatrix} \Phi'_1 \\ \vdots \\ \Phi'_n \end{pmatrix}, \quad \text{gr}(\Phi') = \det((\Phi')^T \cdot \Phi') = \|\Phi'\|^2$$

Damit ist

$$\int_{\mathcal{F}} f(x) do = \int_{\alpha}^{\beta} f(\Phi(t)) \cdot \|\phi'(t)\| dt$$

(Integral nach der Bogenlänge)

(d) Die Definition ist unabhängig von der Parameterdarstellung von $\mathcal{F}$:

Seien $\Phi: D \rightarrow \mathcal{F}$ und $\Psi: \Delta \rightarrow \mathcal{F}$ Parameterdarstellungen von $\mathcal{F}$.

Es gilt: $\Phi(u) = \Psi(h(u))$, mit $h: D \rightarrow \Delta$ diffeomorph.

Damit ist dann

$$\begin{aligned} \Phi'(u) &= \Psi'(h(u)) \cdot h'(u) \\ \text{gr}(\Phi'(u)) &= \text{gr}(\Psi'(h(u)) \cdot h'(u)) \\ &= \text{gr}(\Psi'(h(u))) \cdot (\det h'(u))^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \int_D f(\Phi(u)) \sqrt{\text{gr}(\Phi'(u))} du &= \int_D f(\Psi(h(u))) \sqrt{\text{gr}(\Psi'(h(u)))} \cdot |\det h'(u)| du \\ &\stackrel{\text{Trafo}}{=} \int_{\Delta} f(\Psi(s)) \sqrt{\text{gr}(\Psi'(s))} ds \end{aligned}$$

(e) Zur Motivation: Sei

$$D = \{u \in \mathbb{R}^p : 0 < u_j < 1 \text{ für } 1 \leq j \leq p\}$$

und $\Phi(u) = A \cdot u$ mit der $n \times p$ -Matrix $A = (a^1, a^2, \dots, a^p)$.

Damit ist $\Phi' = A$ und

$$\mathcal{F} = \Phi(D) = \left\{ \sum_{j=1}^p u_j a^j : 0 < u_j < 1 \text{ für } j = 1, \dots, p \right\}$$

In der Geometrie des $\mathbb{R}^n$ setzt man dann

$$|\mathcal{F}| = \text{Inhalt von } \mathcal{F} = \sqrt{\text{gr}(A)} = \int_D \sqrt{\text{gr}(A)} du$$

Im Fall $n = 3, p = 2$ ist dann $|\mathcal{F}|$ die Oberfläche des im Raum stehenden Flächenstückes $\mathcal{F}$.

11.7.6 Beispiel: Inhalt der n -dimensionalen Einheitskugel

Die n -dimensionale Einheitskugel ist

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = 1\}.$$

Suche eine explizite Darstellung für

$$S_+^{n-1} = X^{n-1} \cap \{x: x_n > 0\}$$

Es ist $x_n = \varphi(x_1, \dots, x_{n-1})$, genauer:

$$\Phi(u) = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ \varphi(u) \end{pmatrix}, \quad \text{mit } u \in \mathbb{R}^{n-1}, \|u\| < 1$$

Damit ist

$$\Phi'(u) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ \varphi_{u_1} & \cdots & \varphi_{u_{n-1}} \end{pmatrix}$$

$$\text{gr}(\Phi'(u)) = 1 + \|\varphi'\|^2$$

und

$$\Delta_{n-1} = \{u: \|u\| < 1, u \in \mathbb{R}^{n-1}\}$$

Also ist

$$|S^{n-1}| = \omega_n = 2 \cdot |S_+^{n-1}| = 2 \int_{\Delta_{n-1}} \frac{du}{\sqrt{1 - \|u\|^2}}$$

Außerdem ist

$$\varphi(u) = \sqrt{1 - \|u\|^2} = \sqrt{1 - u_1^2 - \cdots - u_{n-1}^2}$$

$$\varphi'(u) = -\frac{1}{2\sqrt{1 - \|u\|^2}} \cdot (-2u_1, -2u_2, \dots, -2u_{n-1})$$

$$\|\varphi'\|^2 = \frac{1}{1 - \|u\|^2} \|u\|^2$$

$$1 + \|\varphi'\|^2 = \frac{1}{1 - \|u\|^2}$$

1. Sei nun $n = 2$:

$$\omega_2 = 2 \cdot \int_{-1}^1 \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = 2\pi$$

2. und nun $n \mapsto n + 1$:

$$\omega_{n+1} = 2 \cdot \int_{\Delta_n} \frac{dx}{\sqrt{1 - \|x\|^2}} = \left| \begin{array}{l} \text{mit} \\ y = (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \\ r = x_n \in \mathbb{R} \\ -1 < r < 1 \\ \|y\|^2 < 1 - r^2 \\ \text{und Fubini} \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^1 \int_{\|y\| < \sqrt{1-r^2}} \frac{dy}{\sqrt{1-r^2 - \|y\|^2}} dr = \left[\begin{array}{l} \text{Transformation:} \\ y = \sqrt{1-r^2} \xi \\ dy = (1-r^2)^{(n-1)/2} d\xi \\ \|y\|^2 = (1-r^2) \|\xi\|^2 \end{array} \right] \\
&= 2 \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \left(\int_{\Delta_{n-1}} \frac{(1-r^2)^{(n-1)/2}}{\sqrt{1-\|\xi\|^2}} d\xi \right) dr \\
&= 2 \int_{-1}^1 (1-r^2)^{(n/2)-1} dr \int_{\Delta_{n-1}} \frac{d\xi}{\sqrt{1-\|\xi\|^2}}
\end{aligned}$$

Daraus folgt also:

$$\omega_{n+1} = \omega_n \cdot 2 \int_0^1 (1-r^2)^{\frac{n}{2}-1} dr$$

Wenn nun substituiert wird mit $r = \sin t$, $dr = \cos t dt$, dann gilt folgende Rekursionsformel:

$$\omega_{n+1} = \left[2 \int_0^{2\pi} (\cos t)^{n-1} dt \right] \cdot \omega_n$$

mit $\omega_2 = 2\pi$.

11.7.7 Gaußscher Integralsatz oder Divergenzsatz [klassische Form]

Sei $G \subseteq \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, ∂G sei der topologische Rand von G . G wird aufgefaßt als n -Fläche, ∂G als $(n-1)$ -Mannigfaltigkeit.

Sei nun w ein Vektorfeld, stetig differenzierbar in einer offenen Menge $\supseteq \bar{G}$. Dann gilt:

$$\int_G \operatorname{div} w \, dx = \int_{\partial G} w \cdot \nu \, do$$

Dabei ist

$$\operatorname{div} w = \frac{\partial w_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial w_n}{\partial x_n},$$

ν ist die „äußere“ Normale: $\nu \in \mathbb{R}^n$, $\|\nu\| = 1$, $\nu(x) \perp T_x \partial G$.

„äußere“ heißt: $x - t\nu(x) \in G$ für $0 < t < \delta$, „ ν zeigt nach außen“.

Beweis (Idee): Mit Hilfe des Satzes von Stokes für $p = n$:

Für

$$\omega = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} w_j \, dx_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{dx}_j \wedge \cdots \wedge dx_n$$

wird

$$\int_G d\omega = \int_{\partial G} \omega$$

auszurechnen sein.

12 Fourierreihen und -Transformationen¹

12.1 L^p -Räume

12.1.1 Vorbemerkungen

Generell sei $E \subseteq \mathbb{R}^n$ meßbar und

$$f: E \rightarrow \mathbb{C}, \quad f = u + iv, \quad u, v: E \rightarrow \mathbb{R}$$

f heißt meßbar [integrierbar], wenn u und v meßbar [integrierbar] sind.

Man setzt

$$\int_E f(x) dx := \int_E u(x) dx + i \int_E v(x) dx$$

Es gelten die üblichen Regeln, insbesondere (wie bei Riemann):

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|$$

12.1.2 Definition: Der L^p -Raum

(a) Für $1 \leq p < \infty$ ist

$$L^p = L^p(E) := \{f: E \rightarrow \mathbb{C} \text{ meßbar, } |f|^p \text{ integrierbar}\}$$

(b)

$$L^\infty = L^\infty(E) := \left\{ f: E \rightarrow \mathbb{C} \text{ meßbar, es ex. eine Nullmenge } N \text{ mit } \sup\{|f(x)|: x \in E \setminus N\} < \infty \right\}$$

Man setzt

$$\|f\|_p := \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

und

$$\|f\|_\infty := \inf\{A > 0: |f(x)| \leq A \text{ in } E \setminus N, N \text{ Nullmenge}\}$$

12.1.3 Bemerkungen und Beispiele

(a) Für $m(E) < \infty$ und $p < q \leq \infty$ gilt: $L^q \subsetneq L^p$

Beweis: Für $q = \infty$: Dann ist f und damit auch $|f|^p$ beschränkt, zusammen mit $m(E) < \infty$ folgt dann:

$$\int |f|^p \text{ existiert.}$$

Sei nun $p < q < \infty$, $f \in L^q$: Es ist dann

$$\|f\|^p \leq 1 + \|f\|^q \text{ (Majorante).}$$

Daraus folgt: $f \in L^p$.

---

¹Version 179 vom 13. Februar 2006

(b) **Beispiel:** Sei

$$E = \{x: \|x\| < 1\}, \quad f(x) = \|x\|^{-\alpha} \text{ für } \alpha > 0.$$

Damit ist ($\otimes$: Kugelkoordinaten)

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^p dx &= \int_E \|x\|^{-\alpha p} dx \\ &\stackrel{\otimes}{=} \text{const} \cdot \int_0^1 r^{-\alpha p + n - 1} dr \end{aligned}$$

Dieses Integral existiert genau dann, wenn

$$-\alpha p + n - 1 > -1 \iff \alpha p < n$$

(c) Für $m(E) = +\infty$ existiert keine Relation zwischen L^p und L^q (siehe Beispiel unter (d)).

(d) **Beispiel:** Sei

$$E = \{x: \|x\| > 1\}, \quad f(x) = \|x\|^{-\alpha}.$$

Damit ist

$$f \in L^p \iff \alpha p > n$$

12.1.4 Höldersche und Minkowskische Ungleichung

(a) Seien $1 < p < \infty$, $1 < q < \infty$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (Konjugierte Zahlen).

Dann gilt für $f \in L^p$, $g \in L^q$:

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \tag{12.1}$$

(Höldersche Ungleichung)

(b) Für $f \in L^1$, $g \in L^\infty$ gilt (12.1) ebenfalls. ($p = 1$, $q = \infty$)

(c) Sei $f \in L^p$, $g \in L^p$ mit $1 \leq p \leq +\infty$. Dann gilt

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Beweis:

(a) Die Gleichung (12.1) ist richtig, falls $f(x) \cdot g(x) = 0$ f. ü., sonst sei

$$\|f\|_p = A > 0, \quad \|g\|_q = B > 0.$$

Setze

$$F(x) = \frac{|f(x)|}{A}, \quad G(x) = \frac{|g(x)|}{B}.$$

Sei x fest: Es ist $F(x) > 0$, $G(x) > 0$.

Dann gilt

$$\begin{aligned} F(x) &= e^{s/p}, & (s &= p \log F(x)) \\ G(x) &= e^{t/q}, & (t &= q \log G(x)) \end{aligned}$$

Mit $\oplus$ als Aufgabe gilt dann:

$$\begin{aligned} F(x)G(x) &= e^{s/p+t/q} \\ &\stackrel{\oplus}{\leq} \frac{1}{p}e^s + \frac{1}{q}e^t \\ &= \frac{1}{p}(F(x))^p + \frac{1}{q}(G(x))^q \end{aligned}$$

Zusammen ist dann

$$\begin{aligned} \int_E F(x)G(x) dx &\leq \frac{1}{p} \underbrace{\int_E (F(x))^p dx}_{=1} + \frac{1}{q} \underbrace{\int_E (G(x))^q dx}_{=1} = 1 \\ &\iff \frac{1}{AB} \int_e |f(x)g(x)| dx \leq 1 \\ &\iff \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \end{aligned}$$

(b) Es ist

$$|f(x)g(x)| \leq |f(x)| \cdot \|g\|_\infty \text{ f. ü.}$$

also

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_\infty$$

(c) Beweis hier nur für $1 < p < \infty$. ($p = 1, \infty$ als Aufgabe.)

Wähle q so, daß $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Es ist

$$\begin{aligned} |f+g|^p &\leq (|f|+|g|)^p = (|f|+|g|)(|f|+|g|)^{p-1} \\ \int \underbrace{|f|}_{\in L^p} \underbrace{(|f|+|g|)^{p-1}}_{\in L^{q??}} &\leq \|f\|_p \cdot \|(|f|+|g|)^{p-1}\|_q \end{aligned}$$

Hierbei ist

$$\|(|f|+|g|)^{p-1}\|_q = \left(\int (|f|+|g|)^{(p-1)q} \right)^{1/q}$$

Aus $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ folgt $(p-1)q = p$. Damit ist dann

$$\|(|f|+|g|)^{p-1}\|_q = \left(\int (|f|+|g|)^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

Zusammen folgt:

$$\int (|f|+|g|)^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \left(\int (|f|+|g|)^p \right)^{\frac{1}{q}}$$

Mit $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ folgt

$$\begin{aligned} \|(|f|+|g|)\|_p &\leq \|f\|_p + \|g\|_p \\ \Rightarrow \|f+g\|_p &\leq \| |f|+|g| \|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \end{aligned}$$

Jetzt bleibt noch zu zeigen: Ist $(|f|+|g|)^{p-1} \in L^q$?

$$(|f|+|g|)^{(p-1)q} = (|f|+|g|)^p \leq 2^p \underbrace{\max(|f|^p, |g|^p)}_{\in L^1} \in L^1$$

12.1.5 Bemerkung

Für $p = 2$ ist in Gleichung (12.1) $q = 2$ und sie lautet dann

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2$$

$$\left| \int_E f(x)g(x) dx \right|^2 \leq \left(\int_E |f(x)g(x)| dx \right)^2 \leq \left(\int_E |f(x)|^2 dx \right) \cdot \left(\int_E |g(x)|^2 dx \right)$$

Dies ist die *Cauchy-Schwarzsche Ungleichung*. Normalerweise wird sie auf der linken Seite mit $\overline{g(x)}$ statt $g(x)$ geschrieben.

12.1.6 Satz: L^p ist ein Vektorraum

L^p ist ein Vektorraum über $\mathbb{C}$, und $\|\cdot\|_p$ hat die Eigenschaften

(1) $\|f\|_p \geq 0$, „= 0“, genau dann, wenn $f(x) = 0$ f. ü.

(2) $\|\lambda f\|_p = |\lambda| \|f\|_p$

(3) $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

12.1.7 Bemerkung

Wegen (1) ist $\|\cdot\|_p$ keine Norm, heißt aber p -Norm oder L^p -Norm.

12.1.8 Definition: Konvergenz im L^p

Eine Folge (f_k) in L^p heißt *konvergent in L^p* gegen $f \in L^p$, wenn $\|f_k - f\|_p \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$.

kurz: $f_k \rightarrow f$ oder $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$.

Achtung: $f_k \rightarrow f$ ist etwas anderes als $f_k(x) \rightarrow f(x)$ für $x \in E$.

12.1.9 Satz von Riesz-Fischer

L^p ist vollständig, d. h. jede Cauchyfolge in L^p konvergiert in L^p .

(Cauchyfolge bedeutet: Zu jedem $\varepsilon > 0$ ex. ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit $\|f_k - f_l\| < \varepsilon$ für alle $k > l \geq k_0$.)

Beweis: Bemerkung: Aus $f_k \rightarrow f$ in L^p folgt, daß (f_k) wie immer eine Cauchyfolge ist.

Sei (f_k) Cauchyfolge in L^p mit $1 \leq p < \infty$ ($p = \infty$ als Aufgabe).

Setze nun $\varepsilon = 2^{-j}$. Finde dazu ein k_j mit

$$\|f_k - f_l\|_p < 2^{-j} \text{ für } k > l > k_j, \quad (j = 1, 2, \dots)$$

OBdA sei $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$.

Sei nun E meßbar und $F \subseteq E$ mit endlichem $m(F)$:

$$\begin{aligned} \int_F 1 \cdot |f_k(x) - f_l(x)| dx &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} (m(F))^{1/q} \cdot \left(\int_F |f_k(x) - f_l(x)|^p dx \right)^{1/p} \\ &\leq (m(F))^{1/q} \|f_k - f_l\|_p \\ &\leq (m(F))^{1/q} \cdot 2^{-j}, \text{ falls } k > l \geq k_j \end{aligned}$$

Mit Beppo-Levi folgt dann:

$$\sum_{j=1}^{\infty} (f_{k_{j+1}}(x) - f_{k_j}(x))$$

konvergiert fast überall in F , also fast überall in

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{E \cap [-k, k]^n}_{=: F_k \text{ mit } m(F_k) < \infty}.$$

Setze nun

$$f(x) := f_{k_1}(x) + \sum_{j=1}^{\infty} (f_{k_{j+1}}(x) - f_{k_j}(x)) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_j}(x) \text{ f. ü.}$$

(sonst setze $f(x) = 0$.)

Da $\|f_k\|_p \leq \text{const}$ (Wie bei jeder Cauchyfolge).

$f \in L^p$: Lemma von Fatou:

$$\int_E |f(x)|^p dx \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E |f_{k_j}(x)|^p dx < \infty$$

Zeige nun, daß $f_{k_j} \rightarrow f$ in L^p :

$$\int_E |f(x) - f_{k_j}(x)|^p dx \leq \liminf_{l \rightarrow \infty} \int_E |f_{k_l}(x) - f_{k_j}(x)|^p dx$$

d. h.:

$$\|f - f_{k_j}\|_p \leq \liminf_{l \rightarrow \infty} \|f_{k_l} - f_{k_j}\|_p \leq 2^{-j}$$

Also konvergiert die Teilfolge (f_{k_j}) gegen f in L^p .

Sei nun $k > k_j$. Dann gilt:

$$\|f - f_k\|_p \leq \underbrace{\|f - f_{k_j}\|_p}_{\leq 2^{-j}} + \underbrace{\|f_{k_j} - f_k\|_p}_{\substack{< 2^{-j} \\ \text{nach Def. von } k_j}} < 2^{-j+1}$$

Also: $f_k \rightarrow f$ in L^p .

12.1.10 Zusatz

Konvergiert die Folge (f_k) gegen f in L^p , so gibt es eine Teilfolge (f_{k_j}) mit $f_{k_j}(x) \rightarrow f(x)$ f. ü. für $j \rightarrow \infty$.

12.1.11 Beispiel

Betrachtet wird der Raum $L^2([0, 2\pi])$.

Sei (c_k) eine Folge in $\mathbb{C}$ mit $k = -\infty, \dots, \infty$ und die Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

konvergiere. Setze dann

$$f_n(x) := \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \quad (\text{trigonometrisches Polynom})$$

Zeige: (f_n) ist Cauchyfolge: Sei $n > m$ und $\varepsilon > 0$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f_n - f_m\|_2^2 &= \left\| \sum_{m < |k| \leq n} c_k e^{ikx} \right\|_2^2 = \int_0^{2\pi} \left| \sum_{m < |k| \leq n} c_k e^{ikx} \right|^2 dx \\ &= \int_0^{2\pi} \sum_{m < |k|, |j| \leq n} c_k \bar{c}_j e^{i(k-j)x} dx \\ &= \sum_{m < |k| \leq n} |c_k|^2 \cdot 2\pi \\ &\leq 2\pi \sum_{|k| > m} |c_k|^2 < \varepsilon^2 \text{ für } m \geq n_0 \end{aligned}$$

Somit gilt also: $f_n \rightarrow f$ in $L^2([0, 2\pi))$.

Abkürzung: Setze

$$(f, g) := \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$$

Für $-n \leq j \leq n$ gilt dann:

$$(f_n, e^{ijx}) = \int_0^{2\pi} \sum_{k=-n}^n c_k e^{i(k-j)x} dx = 2\pi \cdot c_j$$

Daraus folgt für c_j , den j -ten Fourierkoeffizienten von f_n :

$$c_j = \frac{1}{2\pi} (f_n, e^{ijx})$$

Für die Funktion f gilt:

$$(f, e^{ijx}) = (f_n, e^{ijx}) + (f - f_n, e^{ijx}).$$

Daraus folgt dann:

$$\begin{aligned} |(f, e^{ijx}) - \underbrace{(f_n, e^{ijx})}_{=c_j}| &= |(f - f_n, e^{ijx})| \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|f - f_n\|_2 \cdot 2\pi \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

Es ist

$$\begin{aligned} c_j &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ijx} dx \\ c_j &= \hat{f}_j \quad (\text{Analysis I}) \end{aligned}$$

Die Folge c_j erzeugt $f \in L^2$, c_j sind die Fourierkoeffizienten von f .

Ziel:

$$2\pi \|f\|_2 = \sqrt{\sum |c_k|^2}$$

($\geq$ schon bewiesen mit der Besselschen Ungleichung, siehe 6.5.6 auf Seite 144).

12.1.12 Approximation durch stetige Funktionen

Zu beliebigem $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, gibt es eine Folge (g_k) von stetigen Funktionen im $\mathbb{R}^n$ mit $g_k \rightarrow f$ in L^p , sowie $g_k(x) = 0$ für $\|x\| \geq R_k$.

Beweis:

(1) Es existieren Treppenfunktionen φ_k mit

$$\varphi_k(x) \rightarrow f(x) \text{ f. ü.}, \quad |\varphi_k(x)| \leq |f(x)| \text{ f. ü.}$$

(Aufgabe).

Da

$$|\varphi_k(x) - f(x)|^p \leq 2^p |f(x)|^p,$$

ist der Satz von Lebesgue über die majorisierte Konvergenz anwendbar und es gilt für $k \rightarrow \infty$

$$\int \|f - \varphi_k\|_p \rightarrow 0.$$

(2) Approximation von $\varphi = \varphi_k$ durch stetige Funktionen $g = g_k$:

Sei OBdA

$$\varphi(x) \begin{cases} 1 & \text{in } I = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n) \\ 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \setminus \bar{I} \end{cases}$$

In das Intervall I , in dem die Treppenfunktion φ gleich 1 ist, wird nun ein zweites Intervall J gelegt, dessen Ränder den Abstand δ zum Rand von I haben. Setze nun

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{in } J \\ \frac{1}{\delta} \text{dist}(x, \partial I) & \text{sonst} \\ 0 & \text{in } \mathbb{R}^n \setminus \bar{I} \end{cases}$$

Dabei ist

$$\text{dist}(x, \partial I) = \min\{\|x - y\| : y \in \partial I\}$$

g ist stetig in $\mathbb{R}^n$, $g(x) = 0$ für $\|x\| \geq R$.

Es gilt damit dann

$$\begin{aligned} \|\varphi - g\|_p^p &= \int_{I \setminus J} \underbrace{|\varphi(x) - g(x)|^p}_{\leq 1} dx \\ &\leq 1 \cdot m(I \setminus J) < \frac{1}{k^p} \text{ für kleines } \delta > 0. \end{aligned}$$

Somit folgt dann:

$$\|\varphi_k - g_k\|_p < \frac{1}{k}, \quad \|g_k - f\| \rightarrow 0 \text{ für } k \rightarrow \infty$$

12.1.13 Erinnerung an Analysis I

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine 2π -periodische Funktion und Riemann-integrierbar über dem Intervall $[0, 2\pi]$. Definiere dann den *Fourierkoeffizienten* $\hat{f}_k$:

$$\hat{f}_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

Seien

$$S_n(x) := \sum_{k=-n}^n \hat{f}_k e^{ikx}$$

$$T_n(x) := \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \quad (c_k \in \mathbb{C})$$

Trigonometrische Polynome. Dann wird definiert:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx =: (f, g),$$

insbesondere

$$\sqrt{(f, f)} = \|f\|_2$$

und es gelten:

(a)

$$\|f - S_n\|_2 \leq \|f - T_n\|_2 \quad \forall T_n$$

(b)

$$\|f - S_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2$$

(c) die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2 \leq 2\pi \|f\|_2^2$$

12.1.14 Definition

Definiere

$$L_{2\pi}^2 := L^2([0, 2\pi))$$

Funktionen $f \in L_{2\pi}^2$ werden 2π -periodisch fortgesetzt, d. h. es gilt

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

Unter diesen Bedingungen gelten (a), (b) und (c) weiter.

12.1.15 Bemerkung

Sei

$$l^2 := \left\{ (c_k)_{k=-\infty}^{\infty} : \sum_k |c_k|^2 \text{ ist konvergent} \right\}$$

Auf diesem Raum wird die folgende Norm definiert:

$$\|(c_k)\|_2 := \sqrt{\sum_k |c_k|^2}$$

Das Skalarprodukt ist:

$$((c_k), (d_k)) = \sum_k c_k \overline{d_k}$$

Die Abbildung

$$\begin{cases} l^2 & \longrightarrow L^2_{2\pi} \\ (c_k) & \longmapsto \sum_k c_k e^{ikx} \quad (\text{konv. in } L^2) \end{cases}$$

ist bijektiv und normerhaltend.

L. Carleson zeigte 1963: Für $f \in L^2_{2\pi}$ gilt:

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx} \quad \text{f.ü.}$$

12.1.16 Satz

Für $f \in L^2_{2\pi}$ gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}_k e^{ikx} &= f \quad \text{im } L^2\text{-Sinn, d.h.} \\ \|S_n - f\| &\longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

und es gilt die *Parsevalsche Gleichung*:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2 = 2\pi \|f\|_2^2$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Dann existiert:

1. eine stetige Funktion $g: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$\|f - g\|_2 < \varepsilon$$

OBdA sei $g(2\pi) = g(0)$. Falls nicht, ändere g im Intervall $[2\pi - \delta, \delta]$ so, daß $\hat{g}$ hier linear ist. Dabei ist $\hat{g}(2\pi - \delta) := g(2\pi - \delta)$ und $\hat{g}(2\pi) := g(0)$.

2. ein trigonometrisches Polynom T_m mit

$$|g(x) - T_m(x)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}} \quad \text{in } [0, 2\pi]$$

(Weierstraßscher Approximationssatz)

Sei nun $n \geq m$: Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f - S_n\|_2 &\leq \|f - T_m\|_2 \\ &\leq \|f - g\|_2 + \|g - T_m\|_2 \\ &< \varepsilon + \sqrt{\int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2}{2\pi} dx} = 2\varepsilon \end{aligned}$$

d. h. $S_n \rightarrow f$ in $L^2_{2\pi}$.

Aus (b) folgt:

$$\begin{aligned} \sum_{k=-n}^n |\hat{f}_k|^2 &= 2\pi \|f\|_2^2 - 2\pi \underbrace{\|S_n - f\|_2^2}_{\rightarrow 0 \text{ (} n \rightarrow \infty)} \\ \Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}_k|^2 &= 2\pi \|f\|_2^2 \end{aligned}$$

12.1.17 Bemerkung

Für

$$\ell_k(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}$$

und $f \in L^2_{2\pi}$ gilt:

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{\ell_k(x)} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (f, \ell_k)$$

und

$$f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_k (f, \ell_k) \ell_k \quad \text{in } L^2_{2\pi}$$

Zudem ist:

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |(f, \ell_k)|^2 = 2\pi \|f\|_2^2$$

und

$$(\ell_k, \ell_n) = \begin{cases} 1 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$$

12.2 Die Fouriertransformation**12.2.1 Definition**Für $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ heißt

$$\hat{f}(x) := (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-i\xi \cdot x} d\xi$$

Fourier-transformierte von f (Dabei ist $\xi \cdot x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$ das Skalarprodukt im $\mathbb{R}^n$).
Dabei wird die Abbildung $\hat{\cdot}: f \mapsto \hat{f}$ definiert. Die Existenzbedingung für $\hat{f}$ ist:

$$|f(\xi) e^{-i\xi \cdot x}| = |f(\xi)|$$

12.2.2 Beispiele(1) Sei für $\lambda > 0$

$$f(\xi) = e^{-\lambda \|\xi\|_1} = e^{-\lambda(|\xi_1| + \dots + |\xi_n|)}$$

Dann ist

$$\begin{aligned} (2\pi)^{n/2} \hat{f}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\sum_{k=1}^n (-\lambda|\xi_k| - i\xi_k x_k)\right) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\prod_{k=1}^n e^{-\lambda|\xi_k| - i\xi_k x_k}\right) d\xi \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \prod_{k=1}^n h(x_k) \end{aligned}$$

mit

$$h(x_k) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda|\xi_k| - i\xi_k x_k} d\xi_k$$

Berechne nun

$$\begin{aligned} h(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda|t|-itu} dt = \int_{-\infty}^0 \underbrace{e^{\lambda t - itu}}_{\substack{s=-t \\ ds=-dt}} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t - itu} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-\lambda s + isu} ds + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t - itu} dt \\ &= \frac{1}{\lambda + iu} + \frac{1}{\lambda - iu} = \frac{2\lambda}{\lambda^2 + u^2} \end{aligned}$$

Also ist dann:

$$\hat{f}(x) = (2\pi)^{-n/2} \cdot (2\lambda)^n \cdot \prod_{k=1}^n \frac{1}{\lambda^2 + x_k^2} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \prod_{k=1}^n \frac{\lambda}{\lambda^2 + x_k^2}$$

(2) Sei

$$f(\xi) = e^{-\lambda\|\xi\|^2}$$

mit

$$\|\xi\|^2 = \sum_{k=1}^n \xi_k^2.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} (2\pi)^{n/2} \hat{f}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{k=1}^n \lambda \xi_k^2 + i \xi_k x_k\right) d\xi \\ &= \prod_{k=1}^n h(x_k) \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} h(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda t^2 - itu} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\lambda \left(t + \frac{iu}{2\lambda}\right)^2 - \frac{u^2}{4\lambda}\right) dt \\ &= \exp\left(-\frac{u^2}{4\lambda}\right) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\lambda \left(t + \frac{iu}{2\lambda}\right)^2\right) dt \\ &= \left| \begin{array}{l} t + i\frac{u}{2\lambda} = s \\ \text{Funktionentheorie I} \end{array} \right| \\ &= e^{-u^2/4\lambda} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda s^2} ds \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} e^{-u^2/4\lambda} \end{aligned}$$

Also ist

$$\hat{f}(x) = (2\lambda)^{-n/2} \cdot e^{-\|x\|^2/4\lambda}$$

12.2.3 Einfache Eigenschaften der Fouriertransformation

(1)

$$|\hat{f}(x)| \leq (2\pi)^{-n/2} \|f\|_1$$

(2) Die Abbildung

$$\begin{cases} L^1 & \longrightarrow L^\infty \\ f & \longmapsto \hat{f} \end{cases}$$

ist linear, d.h.

$$\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g},$$

und es gilt

$$\|\hat{f}\|_\infty \leq (2\pi)^{-n/2} \|f\|_1$$

(3) (a) Für $a \in \mathbb{R}^n$ und $g(\xi) = e^{ia\xi} f(\xi)$ ist

$$\hat{g}(x) = \hat{f}(x - a)$$

(b) Für $a \in \mathbb{R}^n$ und $g(\xi) = f(\xi - a)$ ist

$$\hat{g}(x) = \hat{f}(x) \cdot e^{-iax}$$

(c) Für eine reguläre $n \times n$ -Matrix A und $g(\xi) = f(A^{-1}\xi)$ ist

$$\hat{g}(x) = |\det A| \cdot \hat{f}(A^T x)$$

(d) Für $g(\xi) = \overline{f(\xi)}$ ist

$$\hat{g}(x) = \overline{\hat{f}(-x)}$$

(e) Für $g(\xi) = f(-\xi)$ ist

$$\hat{g}(x) = \hat{f}(-x)$$

Beweis: Auf dem Aufgabenblatt.

12.2.4 Satz von Plancherel

Für $f, g \in L^1$ sind $\hat{f}g, f\hat{g} \in L^1$ und es gilt:

$$\int \hat{f}g = \int f\hat{g}$$

Beweis: Es ist

$$\begin{aligned} (2\pi)^{n/2} \int \hat{f}(x) \cdot g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) e^{-i\xi x} d\xi \right) g(x) dx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{-i\xi x} dx \right)}_{=\hat{g}(\xi) \cdot (2\pi)^{n/2}} f(\xi) d\xi \\ &= (2\pi)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{g}(\xi) \cdot f(\xi) d\xi \end{aligned}$$

Außerdem gilt:

$$|(\hat{f}g)(x)| \leq \underbrace{(2\pi)^{-n/2} \|f\|_\infty \cdot |g(x)|}_{\in L^1(\mathbb{R}^n)}$$

Also gilt: $\hat{f}g \in L^1$.

Wieso ist oben der Satz von Fubini anwendbar?

Nach dem Satz von Tonelli gilt:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(\xi) e^{-i\xi \cdot x} \cdot g(x)| \, d\xi \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| \int_{\mathbb{R}^n} |f(\xi)| \, d\xi \, dx \text{ existiert.}$$

12.2.5 Satz: Stetigkeit und Differenzierbarkeit von $\hat{f}$

(a) $\hat{f} \in C(\mathbb{R}^n)$, d.h. $\hat{f}$ ist stetig.

(b) Falls $f(\xi) \|\xi\|^m$ in L^1 ist, so ist $\hat{f} \in C^m(\mathbb{R}^n)$ und für $|\alpha| \leq m$ gilt:

$$D^\alpha \hat{f}(x) = (-i)^{|\alpha|} \widehat{\xi^\alpha f}.$$

Dabei ist

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

und

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}, \quad \xi^\alpha = \xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \dots \xi_n^{\alpha_n}$$

z.B. ist für $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$:

$$\hat{f}_{x_1}(x) = -i \cdot (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \xi_1 f(\xi) e^{-i\xi \cdot x} \, d\xi$$

Beweis:

(a) Setze

$$F(x, \xi) := f(\xi) e^{-i\xi \cdot x}$$

$F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$.

Ist ξ fest, dann ist $x \mapsto F(x, \xi)$ stetig.

Ist x fest, dann ist $|F(x, \xi)| \leq |f(\xi)|$, integrierbar unabhängig von x .

Zusammen ist

$$\hat{f}(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} F(x, \xi) \, d\xi$$

als Parameterintegral stetig.

(b) Beweis durch Induktion nach m :

$\mathbf{m} = \mathbf{1}$: ($\|\xi\| \cdot f(\xi)$ integrierbar) Sei z.B. $\alpha = (1, 0, \dots, 0)$.

Ist ξ fest, so ist $x \mapsto F(x, \xi)$ stetig differenzierbar nach x_1

$$F_{x_1}(x, \xi) = -i\xi_1 f(\xi) e^{-i\xi \cdot x}.$$

Ist x fest, so gilt:

$$|F_{x_1}(x, \xi)| \leq \underbrace{\|\xi\| \cdot |f(\xi)|}_{\text{integrierbare Majorante}}$$

$\Rightarrow f_{x_1}$ ist stetig, f Parameterintegral, Formel gilt.

12.2.6 Satz

Für $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ist $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$, d. h. $\hat{f}$ ist stetig und

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \hat{f}(x) = 0.$$

Insbesondere ist $\hat{f}$ gleichmäßig stetig.

Beweis: Siehe 12.2.8 auf Seite 375.

12.2.7 Hilfssatz

Für $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ sei $f_{(y)}(x) := f(x - y)$. Dann ist

$$h(y) := \|f - f_{(y)}\|_p$$

gleichmäßig stetig ($h: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$)

Beweis: Es ist:

$$\begin{aligned} |h(y) - h(z)| &= \left| \|f - f_{(y)}\|_p - \|f - f_{(z)}\|_p \right| \leq \|f_{(y)} - f_{(z)}\|_p \\ &= \left(\int |f(x - y) - f(x - z)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \left| \begin{array}{c} x = y + \xi \\ \text{Transformationsformel} \end{array} \right| \\ &= \left(\int |f(\xi) - f(\xi - (z - y))|^p d\xi \right)^{\frac{1}{p}} = h(z - y) - h(0) \end{aligned}$$

d.h.: Zu zeigen ist die Stetigkeit im Punkt 0.

Sei also $\varepsilon > 0$. Dazu existiert eine stetige Funktion g mit $\|f - g\|_p < \varepsilon$, $g(x) = 0$ für $\|x\| \geq R (= R_\varepsilon)$. Es existiert also ein $\delta > 0$, so daß für $\|y\| < \delta < R$ gilt:

$$|g(x) - g(x - y)| \leq \begin{cases} \varepsilon (\Omega_n(2R)^n)^{-1/p} & \text{für } \|x\| < 2R \\ 0 & \text{für } \|x\| \geq 2R \end{cases}$$

Damit ist dann

$$\begin{aligned} |h(y) - h(0)| &= \|f - f_{(y)}\|_p = \|f - g + g - g_{(y)} + g_{(y)} - f_{(y)}\|_p \\ &< \varepsilon + \left(\int_{\|x\| \leq 2R} \underbrace{|g(x) - g(x - y)|^p}_{< \varepsilon^p (\Omega_n(2R)^n)^{-1}} dx \right)^{\frac{1}{p}} + \varepsilon \\ &< \varepsilon + \varepsilon (\Omega_n(2R)^n)^{-1/p} \cdot (\Omega_n(2R)^n)^{1/p} + \varepsilon \\ &= 3\varepsilon \quad \text{für } \|y\| < \delta. \end{aligned}$$

12.2.8 Beweis von 12.2.6

Es ist

$$\begin{aligned} (2\pi)^{n/2} \hat{f}(x) &= \int f(\xi) e^{-i\xi \cdot x} d\xi \\ &= \left| \begin{array}{c} \text{Subst.} \\ \xi = \eta - \pi \frac{x}{\|x\|^2} \end{array} \right| \\ &= \int f\left(\eta - \pi \frac{x}{\|x\|^2}\right) e^{-i\eta \cdot x} \underbrace{e^{i\pi}}_{=-1} d\eta \end{aligned}$$

Nach Addition ergibt sich:

$$\begin{aligned} \left| (2\pi)^{n/2} 2\hat{f}(x) \right| &= \left| \int \left[f(\xi) - f\left(\xi - \pi \frac{x}{\|x\|^2}\right) \right] e^{-i\xi \cdot x} d\xi \right| \\ &\leq \int \left| f(\xi) - f\left(\xi - \pi \frac{x}{\|x\|^2}\right) \right| d\xi \\ &= \left\| f - f\left(\pi \frac{x}{\|x\|^2}\right) \right\|_1 \end{aligned}$$

Zu $\varepsilon > 0$ existiert ein $\delta > 0$ mit

$$|\hat{f}(x)| < \text{const} \cdot \left\| f - f\left(\pi \frac{x}{\|x\|^2}\right) \right\|_1 < \varepsilon \quad \text{für} \quad \left\| \pi \frac{x}{\|x\|^2} \right\| < \delta,$$

also für $\|x\| > \frac{\pi}{\delta}$.

$$\Rightarrow \lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \hat{f}(x) = 0$$

$\Rightarrow \hat{f}$ ist gleichmäßig stetig.

12.2.9 Ziel: Die Umkehrformel

Im weiteren soll hier gezeigt werden, daß fast überall die Umkehrformel gilt:

$$f(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \hat{f}(x) e^{ix \cdot \xi} dx$$

12.2.10 Definition: Faltung

Für $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ heißt

$$f * g(x) := (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy$$

Faltung von f mit g .

12.2.11 Satz: Einfache Eigenschaften der Faltung

Für $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ existiert $f * g$ für fast alle x und es gilt:

$$f * g = g * f \in L^1(\mathbb{R}^n)$$

und

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$$

Beweis: Setze für $F: \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(x, y) := f(x - y)g(y)$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \int \left(\int |F(x, y)| dx \right) dy &= \iint |f(x - y)| \cdot |g(y)| dx dy \\ &= \int |g(y)| \underbrace{\left(\int |f(x - y)| dx \right)}_{=\|f\|_1} dy \\ &= \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 \end{aligned}$$

Nach dem Satz von Tonelli-Fubini gilt:

$$2(\pi)^{n/2} \cdot (f * g)(x) = \int F(x, y) dy$$

existiert für fast alle x , und $f * g \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

$$\begin{aligned} (2\pi)^n \widehat{f * g}(x) &= (2\pi)^{n/2} \int (f * g)(\xi) e^{-i\xi \cdot x} d\xi \\ &= \iint f(\xi - y)g(y) e^{-i\xi \cdot x} dy d\xi \\ &= \iint f(\xi - y) e^{-i(\xi - y) \cdot x} \cdot g(y) e^{-iy \cdot x} dy d\xi \\ &= \int \left[\int f(\xi - y) e^{-i(\xi - y) \cdot x} d\xi \right] g(y) e^{-iy \cdot x} dy \\ &= (2\pi)^n \hat{f}(x) \cdot \hat{g}(x) \end{aligned}$$

(Mit der Transformation $\xi - y = u$ in der vorletzten Zeile.)

12.2.12 Beispiel 1

Sei $n = 1$ und

$$f(x) = e^{-|x|}, \quad g(x) = \begin{cases} 1 & \text{in } [a, b] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann ist

$$\sqrt{2\pi}(f * g)(x) = \int_a^b e^{-|x-y|} \cdot 1 dy$$

Das ergibt 3 Fälle:

1. $x \leq a$:

$$\int_a^b e^{-y+x} dy = -e^{-y+x} \Big|_a^b = e^{x-a} - e^{x-b}$$

2. $x \geq b$:

$$\int_a^b e^{y-x} dy = e^{y-x} \Big|_a^b = e^{b-x} - e^{a-x}$$

3. $a < x < b$:

$$\int_a^b e^{y-x} dy + \int_x^b e^{x-y} dy = 1 - e^{a-x} + 1 - e^{x-b}$$

12.2.13 Beispiel 2

Sei

$$H(\xi) := e^{-\|\xi\|_1} = e^{-|\xi_1| - \dots - |\xi_n|}, \quad \lambda > 0$$

Dann gelten folgende Aussagen:

(1)

$$h_\lambda(x) := (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) e^{i\xi \cdot x} d\xi = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \prod_{\nu=1}^n \frac{\lambda}{\lambda^2 + x_\nu^2}$$

(2)

$$\int_{\mathbb{R}^n} h_\lambda(x) dx = (2\pi)^{n/2}$$

(3) Für $f \in L^1$ gilt:

$$f * h_\lambda(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) \hat{f}(\xi) e^{i\xi \cdot x} d\xi$$

(4) Wenn $f \in L^\infty$ und stetig im Punkt x ist, dann gilt:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * h_\lambda(x) = f(x)$$

Beweis:

1. Wie in Beispiel 1, [12.2.12](#)

2. Es ist

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} h_\lambda(x) dx &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\lambda}{\lambda^2 + t^2} dt \right)^n \\ &= \left| \begin{array}{l} t = \lambda s \\ dt = \lambda ds \end{array} \right| \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + \lambda^2 s^2} ds \right)^n \\ &= \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \cdot \pi^n \\ &= (2\pi)^{n/2} \end{aligned}$$

3. Es ist

$$\begin{aligned}
 (2\pi)^{n/2} f * h_\lambda(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \left[(2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) e^{i\xi \cdot y} d\xi \right] dy \\
 &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) f(x-y) e^{-i(x-y) \cdot \xi} dy e^{ix \cdot \xi} d\xi \\
 &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) e^{-i(x-y) \cdot \xi} dy \right)}_{\substack{\text{Transf.:} \\ u=x-y \\ dy=du}} e^{ix \cdot \xi} d\xi \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) \hat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi
 \end{aligned}$$

4. Ist $f * h_\lambda$ definiert? Es ist $|f(x-y)h_\lambda(y)| \leq \|f\|_\infty$ fast überall, $h_\lambda(y) \in L^1$, also ist $f * h_\lambda$ definiert. Es gilt:

$$\begin{aligned}
 |f * h_\lambda(x) - f(x)| &= \left| (2\pi)^{-n/2} \int [f(x-y) - f(x)] h_\lambda(y) dy \right| \\
 &\leq (2\pi)^{-n/2} \int |f(x-y) - f(x)| h_\lambda(y) dy \\
 &= \left| \begin{array}{l} y = \lambda\xi \\ dy = \lambda^n \xi \end{array} \right| \\
 &= (2\pi)^{-n/2} \int |f(x - \lambda\xi) - f(x)| \cdot \underbrace{\lambda^n \cdot h_\lambda(\lambda\xi)}_{=h_1(\xi)} d\xi
 \end{aligned}$$

Für $\lambda_k \searrow 0$ gilt

1)

$$|f(x - \lambda_k \xi) - f(x)| h_1(\xi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \text{ punktweise}$$

2)

$$|f(x - \lambda_k \xi) - f(x)| h_1(\xi) \leq (\|f\|_\infty + |f(x)|) \cdot h_1(\xi) \text{ f.ü.}$$

ist integrierbare Majorante.

Mit dem Satz von Lebesgue gilt dann:

$$h_{\lambda_k} * f(x) - f(x) \rightarrow 0 \quad \text{für } k \rightarrow \infty$$

12.2.14 Umkehrsatz

Ist $f \in L^1$ und $\hat{f} \in L^1$, dann gilt überall dort, wo f stetig ist:

$$f(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) e^{ix \cdot \xi} dx$$

fast überall, wenn f stetig ist. Außerdem gilt:

$$f(-\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) e^{-ix \cdot \xi} dx = \hat{f}(\xi)$$

Beweis: Die rechte Seite sei $g(\xi)$, $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$. Es ist

$$f * h_\lambda(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) \hat{f}(\xi) e^{i\xi \cdot x} d\xi, \text{ vgl. HS}$$

mit

$$H(\lambda\xi) = e^{-\lambda\|\xi\|_1}$$

Hier gilt

1.)

$$H(\lambda\xi) \hat{f}(\xi) e^{i\xi \cdot x} \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \hat{f}(\xi) e^{i\xi \cdot x}$$

und

2.)

$$|H(\lambda\xi) \hat{f}(\xi) e^{i\xi \cdot x}| \leq 1 \cdot |\hat{f}(\xi)| \cdot t$$

hat eine integrierbare Majorante.

Nach dem Satz von Lebesgue (angewandt auf $f * h_{\lambda_k}$, $\lambda_k \rightarrow 0$) gilt dann:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * h_\lambda(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) \cdot e^{i\xi \cdot x} d\xi = g(x)$$

Da f stetig in x ist und $f \in L^\infty$ gilt:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} f * h_\lambda(x) = f(x)$$

Es ist

$$\begin{aligned} \|f * h_\lambda - f\|_1 &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) \cdot h_\lambda(y) dy \right| dx \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{\leq} (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| \cdot h_\lambda(y) dx \right) dy \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} h_\lambda(y) \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| dx \right)}_{=\|f_{(\cdot-y)} - f\|_1 =: \varphi(y) \text{ stetig}} dy \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) h_\lambda(y) dy \\ &= \varphi * h_\lambda(0) \\ &\xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} \varphi(0) \\ &= \|f_{(0)} - f\|_1 = \|f - f\| = 0 \end{aligned}$$

Also:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|f * h_\lambda - f\|_1 = 0,$$

insbesondere gilt $f * h_{\lambda_k} \rightarrow f$ in L^1 für jede Folge $\lambda_k \rightarrow 0$. Es existiert eine Folge $\lambda_k \searrow 0$ mit:

$$\underbrace{f * h_{\lambda_k}(x) \rightarrow f(x)}_{(*)} \quad (k \rightarrow \infty) \text{ f.ü.}$$

Wo (*) gilt, ist:

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f * h_{\lambda_k}(x) = g(x)$$

12.2.15 Bemerkungen

(a) Ist $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, so existiert ein $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ mit $f(x) = g(x)$ f.ü.

(b) Für die Abbildung $\hat{\cdot}: L^1(\mathbb{R}^n) \rightarrow C_0(\mathbb{R}^n)$. Die Klasse S besteht aus allen Funktionen $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ mit

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|x\|^m \cdot |D^\alpha f(x)| < \infty$$

für alle $m \in \mathbb{N}_0$ und alle $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$.

Ein typisches Beispiel ist $f(x) = e^{-\|x\|^2}$. Denn es ist

$$f_{x_1} = -2x_1 f, \dots$$

12.2.16 Satz

Die Fouriertransformation bildet S bijektiv auf sich ab.

Beweis: Es ist $S \subseteq L^1 \cap C_0$ und $D^\alpha f \in S$ für $f \in S$.

(1) $f \in S$. Zeige, daß daraus folgt: $\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Sei $m \in \mathbb{N}_0$. $\|\xi\|^m \cdot f(\xi)$ ist integrierbar, also ist $\hat{f} \in C^m(\mathbb{R}^n)$, d.h. $\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

(2) Sei $f \in S$, $m \in \mathbb{N}_0$. Zeige:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|x\|^m \cdot |\hat{f}(x)| < \infty$$

Es ist

$$\begin{aligned} -ix_1 \hat{f}(x) &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \underbrace{\left(-ix_1 e^{-ix \cdot \xi}\right)}_{\frac{\partial}{\partial \xi_1} e^{-ix \cdot \xi}} d\xi \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{Schreibe nun:} \\ \xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \bar{\xi} \end{pmatrix}, \bar{\xi} \in \mathbb{R}^{n-1} \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi_1, \bar{\xi}) \frac{\partial}{\partial \xi_1} e^{-i(\xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n)} d\xi_1 \right) d\bar{\xi} \end{aligned}$$

Das innere Integral ist:

$$\underbrace{f(\xi_1, \bar{\xi}) \cdot e^{-i\xi \cdot x}}_{=0} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial}{\partial \xi_1} f(\xi_1, \bar{\xi}) \right) e^{-i\xi \cdot x} d\xi_1$$

Also gilt zusammen:

$$ix_1 \hat{f}(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f_{\xi_1}(\xi) e^{-i\xi \cdot x} d\xi = \widehat{f_{\xi_1}}(x)$$

Per Induktion nach $|\alpha|$ zeigt man:

$$(ix)^\alpha \hat{f}(x) = \widehat{D^\alpha f}(x)$$

Sei x fest und k so, daß

$$\max_{j=1}^n |x_j| = |x_k|, \quad \text{d.h. } \|x\| \leq n \cdot |x_k|$$

Wähle $\alpha = (0, \dots, 0, m, 0, \dots, 0)$ mit m an der k -ten Stelle. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{n}\right)^m \|x\|^m \cdot |\hat{f}(x)| &\leq |x_k|^m \cdot |\hat{f}(x)| \\ &\leq \left| \widehat{D^\alpha f}(x) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha|=m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|x\|^m |\widehat{D^\alpha f}(x)| \\ &\stackrel{?}{<} \infty ??? \end{aligned}$$

Wenn das „?“ gilt, gilt die Behauptung (2).

Beweis hiervon im Hilfssatz [12.2.17](#)

(3) Sei $\beta \in \mathbb{N}_0^n$: Betrachte (2) mit $D^\beta f \in S$:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \|x\|^m |D^\beta \hat{f}(x)| < \infty$$

für alle m . Daraus folgt: $\hat{f} \in S$.

(4) Zeige: $\hat{\cdot}$ ist injektiv:

Sei $\hat{f} = 0$. Daraus folgt mit dem Umkehrsatz, daß $f(x) = 0$ f.ü.. Da f stetig ist, gilt $f(x) = 0$, d.h. $\hat{\cdot}$ ist injektiv.

(5) Zeige: $\hat{\cdot}$ ist surjektiv. Sei $g \in S$,

$$f(x) := (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{i\xi \cdot x} d\xi \in S$$

und es ist $\hat{f} = g$, d.h. $\hat{\cdot}$ ist surjektiv.

Zusammen mit (4) gilt dann: $\hat{\cdot}$ ist bijektiv.

12.2.17 Hilfssatz

Sei $m \in \mathbb{N}_0$, $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$ und $f \in S$. Dann gilt:

$$\sup \|x\|^m \left| \widehat{D^\alpha f}(x) \right| < \infty$$

Beweis: Es genügt, dies für $\alpha = (0, 0, \dots, 0)$ zu zeigen. Es ist

$$\hat{f}(x) = (2\pi)^{-n/2} \int f(\xi) e^{-i\xi \cdot x} d\xi$$

und

$$\begin{aligned} |(ix_k)^m \hat{f}(x)| &= (2\pi)^{-n/2} \left| \int \left(\frac{\partial^m}{\partial \xi_k^m} f(\xi) \right) e^{-i\xi \cdot x} d\xi \right| \\ &\leq (2\pi)^{-n/2} \int \left| \frac{\partial^m}{\partial \xi_k^m} f(\xi) \right| d\xi \\ &= c_{m,k} \leq c_m \end{aligned}$$

Also gilt für alle $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\left(\frac{1}{n} \right)^m \|x\|^m \cdot |\hat{f}(x)| \leq c_m$$

(Dies gilt auch für $D^\alpha f \in S$, d. h. für beliebiges α)

12.2.18 Die Wärmeleitungsgleichung

Sei $u(x, t)$ für $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$, die Temperatur im Punkt x zum Zeitpunkt t . Sei nun $u_t = \Delta u$:

$$u_t(x, t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}(x, t)$$

Zu lösen ist das *Cauchyproblem*: $u_t = \Delta u$ für $t > 0$, $x \in \mathbb{R}^n$ und den „Anfangswerten“ $u(x, 0) = f(x)$.

Ansatz:

$$u(x, t) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}(\xi, t) e^{i\xi \cdot x} d\xi$$

Formale Rechnung liefert:

$$\begin{aligned} u_t &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}_t(\xi, t) e^{i\xi \cdot x} d\xi \\ u_{x_k x_k} &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} (-\xi_k^2) \hat{u}(\xi, t) e^{i\xi \cdot x} d\xi \end{aligned}$$

Damit ist dann

$$\begin{aligned} u_t - \Delta u &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} [\hat{u}_t(\xi, t) + \|\xi\|^2 \hat{u}(\xi, t)] e^{i\xi \cdot x} d\xi \\ &= 0, \text{ falls } [\dots] = 0 \end{aligned}$$

Dadurch entsteht ein Problem für $\hat{u}$:

$$\begin{aligned} \hat{u}(\xi, t) &= -\|\xi\|^2 \hat{u}(\xi, t) \\ \hat{u}(\xi, 0) &= \hat{f}(\xi) \end{aligned}$$

Die Lösung hiervon ist:

$$\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) e^{-\|\xi\|^2 t}$$

Daraus folgt dann für $u(x, t)$:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(y) \cdot e^{-i\xi \cdot y} dy \right] \cdot e^{-\|\xi\|^2 t} e^{i\xi \cdot x} d\xi \\ &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|\xi\|^2 t} e^{-i\xi \cdot (y-x)} d\xi \right] \cdot f(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} K(y-x, t) f(y) dy \end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned} K(w, t) &= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|\xi\|^2 t} e^{-i\xi \cdot w} d\xi \\ &= (2\pi t)^{-n/2} e^{-\|w\|^2/4t} \end{aligned}$$

Damit ist dann

$$u(x, t) = (2\pi t)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x-y\|^2/4t} \cdot f(y) dy. \quad (12.2)$$

Der Nachweis der Richtigkeit geschieht folgendermaßen:

1. Alles ist erlaubt, falls $f \in S$ ist, oder
2. Verifiziere alles an (12.2). (Dies gilt, falls f stetig ist und $|f(x)| \leq C_\varepsilon e^{\varepsilon\|x\|^2}$ für $\varepsilon > 0$.)

12.2.19 Bisherige Eigenschaften der Fouriertransformation

Bisher haben wir gezeigt, daß für die Fouriertransformation die folgenden beiden Aussagen gelten:

$$\begin{aligned} \hat{\cdot} &: L^1 \rightarrow C_0 \\ \hat{\cdot} &: S \rightarrow S \end{aligned}$$

Nun wollen wir zeigen, daß auch

$$\hat{\cdot} : L^2 \rightarrow L^2$$

gilt (nicht formelmäßig).

12.2.20 Hilfssatz

Für $f \in L^1 \cap L^2$ ist $\hat{f} \in L^2$ und $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$.

Beweis: Setze

$$\tilde{f}(x) = \overline{f(-x)} \quad \text{und} \quad g = f * \tilde{f}$$

Damit ist

$$\begin{aligned} g(x) &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(-x+y) \cdot \overline{f(y)} dy \\ &= (2\pi)^{-n/2} (f(x), f) \end{aligned}$$

1.

$$|g(x)| \stackrel{\text{CSU}}{\leq} (2\pi)^{-n/2} \|f(x)\|_2 \cdot \|f\|_2 = (2\pi)^{-n/2} \|f\|_2^2$$

2. $g \in L^1$

3. g ist gleichmäßig stetig:

$$\begin{aligned} (2\pi)^{n/2} |g(x) - g(z)| &= |(f(x) - f(z), f)| \\ &\stackrel{\text{CSU}}{\leq} \|f(x) - f(z)\|_2 \cdot \|f\|_2 \\ &= \|f_{(x-z)} - f\|_2 \|f\|_2 \\ &\rightarrow 0 \text{ für } \|x - z\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Es ist

$$g * h_\lambda(0) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} H(\lambda\xi) \hat{g}(\xi) d\xi \tag{12.3}$$

mit $H(\xi) = e^{-\|\xi\|_1}$.

Da g stetig ist, gilt:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} g * h_\lambda(0) = g(0) = \|f\|_2^2.$$

Rechts in (12.3) ist für $\lambda \rightarrow 0$: $H(\lambda\xi) \nearrow 1$: $\lambda_k \searrow 0 \Rightarrow H(\lambda_k \xi) \hat{g}(\xi) \nearrow |\hat{f}(\xi)|^2$, also

$$\hat{g}(\xi) = |\hat{f}(\xi)|^2 \geq 0$$

Mit dem Satz von Beppo-Levi ist dann

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \text{rechts} &= (2\pi)^{-n/2} \int |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= (2\pi)^{-n/2} \|\hat{f}\|_2^2 \end{aligned}$$

12.2.21 Satz, Parsevalsche Gleichung

Die Fouriertransformation $\hat{\cdot}$ läßt sich zu einer „linearen“ und „bijektiven“ Abbildung $\hat{\cdot}: L^2 \rightarrow L^2$ mit

$$\|\hat{f}\|_2^2 = \|f\|_2^2 \quad \text{„Parsevalsche Gleichung“}$$

fortsetzen.

Bemerkung: Dabei soll heißen:

„linear“

$$\widehat{\alpha f + \beta g}(x) = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g} \text{ f. ü.}$$

„injektiv“

$$\hat{\hat{f}}(x) = \hat{g}(x) \Rightarrow f(x) = g(x) \text{ f. ü.}$$

„surjektiv“

$$g \in L^2 \Rightarrow \text{es ex. } f \in L^2: \hat{f}(x) = g(x) \text{ f. ü.}$$

Beweis:

(a) Fortsetzung: Sei $f \in L^2$. Setze

$$f_k(x) = \begin{cases} f(x) & \text{in } [-k, k]^n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Es ist $f_k \rightarrow f$ in L^2 . Außerdem ist $f_k \in L^1 \cap L^2$, also ist $\hat{f}_k$ definiert und $\hat{f}_k \in L^2$. $(\hat{f}_k)$ ist Cauchyfolge in L^2 , da

$$\|\hat{f}_k - \hat{f}_l\|_2 = \|f_k - f_l\|_2$$

$\Rightarrow \hat{f}_k$ konvergiert in L^2 , setze

$$\hat{f} := \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{f}_k$$

(b) Die Fortsetzung ist unabhängig von (f_k) :

Gelte $g_k \rightarrow f$ in L^2 , $g_k \in L^1 \cap L^2$:

$$\|\hat{f}_k - \hat{g}_k\|_2 = \|f_k - g_k\|_2 \rightarrow 0$$

Also ist für $k \rightarrow \infty$:

$$\hat{f}_k \rightarrow \hat{f} = \hat{g} \leftarrow \hat{g}_k$$

Die Linearität wird als Aufgabe gestellt.

Zeige nun die Normerhaltung:

$$\|\hat{f}\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\hat{f}_k\|_2 \stackrel{\text{HS}}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_2 = \|f\|_2$$

„injektiv“ Sei $\hat{f} = 0$ (d.h. $\hat{f}(x) = 0$ f.ü.): Für $k \rightarrow \infty$ gilt:

$$\left. \begin{array}{l} f_k \rightarrow f \quad \|f_k\|_2 \rightarrow \|f\|_2 \\ \hat{f}_k \rightarrow \hat{f} \Rightarrow \|\hat{f}_k\|_2 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty) \end{array} \right\} f(x) = 0 \text{ f.ü.}$$

„surjektiv“ (teilweise)

$\widehat{L^1 \cap L^2}$ ist dicht in L^2 , d.h.:

Zu jedem $g \in L^2$ gibt es $f_k \in L^1 \cap L^2$ mit

$$\hat{f}_k \rightarrow g \text{ in } L^2$$

Dann gibt es zu $g \in L^2$ eine Folge (f_k) in $L^1 \cap L^2$ mit $\hat{f}_k \rightarrow g$.

(f_k) ist eine Cauchyfolge in L^2 , da $(\hat{f}_k)$ Cauchyfolge ist, also $f_k \rightarrow f \in L^2$. Also gilt:

$$\hat{f} = \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{f}_k = g \text{ in } L^2$$

also $\hat{f}(x) = g(x)$.

Beweisskizze: Skizze, daß $\widehat{L^1 \cap L^2}$ dicht in L^2 ist (Funktionalanalysis):
Sei $g \in L^2$ und setze

$$A = \inf \left\{ \|g - \hat{f}\|_2 : f \in L^1 \cap L^2 \right\}$$

Dann existieren $f_k \in L^1 \cap L^2$ mit

$$\|g - \hat{f}_k\|_2 \rightarrow A$$

(1) (f_k) ist Cauchyfolge [$\|u + v\|_2^2 + \|u - v\|_2^2 = 2\|u\|_2^2 + 2\|v\|_2^2$], $\hat{f}_k \rightarrow \hat{f}$.

(2) Es ist $(g - \hat{f}, \hat{h}) = 0$ für alle $h \in L^1 \cap L^2$.

Idee:

$$\|g - \hat{f}\|_2^2 \leq \|g - \hat{f} - \varepsilon e^{i\alpha} \hat{h}\|_2^2 \dots$$

$$\operatorname{Re} e^{i\alpha} (g - \hat{f}, \hat{h}) \leq 0$$

$$\Rightarrow (g - \hat{f}, \hat{h}) = 0$$

(3) Setze nun $\hat{h}(x) = h_\lambda(x - a)$ für $a \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda > 0$. Dann ist für fast alle a :

$$h_\lambda * \overline{(g - \hat{f})}(a) = \dots = 0$$

$$\Rightarrow g - \hat{f} = 0 \text{ f. ü.}$$

$$\Rightarrow A = \|\hat{f} - g\|_2 = 0.$$